

Zelfs in een goed onderzocht gebied als Europa komen nog veranderingen voor in de lijst met waargenomen libellensoorten. In dit artikel worden de soorten beschreven die kunnen worden toegevoegd.

Marcel Wasscher

Nieuwe Europese soorten

In de ODON-tabel staat als bijlage een lijst met soorten die samen met de in de tabel genoemde soorten de 116 libellesoorten van Europa vormen. Je zou misschien verwachten dat de libellenfauna van een van de drukst bewoonde delen van deze wereld (en tevens de plaats waar de taxonomische beschrijvingen van libellen met Linnaeus in 1758 begonnen) wel helemaal bekend zou zijn. Er zijn desondanks de afgelopen jaren enkele veranderingen in de libellenlijst van Europa opgetreden. De volgende soorten kunnen hieraan namelijk worden toegevoegd:

- *Lestes (Chalcolestes) parvidens* Artobevski, 1929
Dit was een ondersoort van *L. viridis* die nu de soort status is gegeven; voorkomend o.a. Italië en meer naar het oosten.
- *Ischnura fontainei* Morton, 1905
Een Afrikaanse soort, waargenomen in uiterste zuiden van Europa: het eiland Pantellaria, Italië.
- *Coenagrion ponticum* Bartenev, 1929
ssp. *intermedium* Lohmann, 1990
Een nieuw beschreven ondersoort van een Aziatische soort voorkomend op Kreta, Griekenland.
- *Somatochlora meridionale* Nielsen, 1935
Dit was een ondersoort van *S. metallica* die nu de soortstatus heeft gekregen, voorkomend in o.a. Italië, Joegoslavië.
- *Sympetrum sinaïticum* Dumont, 1977

ssp. *tarraconensis* Jödicke, 1994

Het complex van *Sympetrum*-soorten uit Spanje is onlangs door Reinhard Jödicke ontward, met deze ondersoort van een Afrikaanse soort als een van de resultaten.

Daarnaast gaat er mogelijk ook een soort van de Europese lijst afgevoerd worden: *Orthetrum ramburi* Selys, 1848 (ook wel: *O. anceps* Schneider, 1845 genaamd) is waarschijnlijk dezelfde soort als *Orthetrum coerulescens* (Fabricius, 1798). Hierover werd van de zomer een voordracht gehouden op het dertiende SIO Congres in Essen. Een artikel (en acceptatie door de libellen-gemeenschap) zal uiteindelijk uitwijzen of de beide soorten inderdaad één zijn met geleidelijke overgangen van de kenmerken.

Op dit moment zijn er dus 120 soorten uit Europa bekend en de toekomst zal het uitwijzen of dit er misschien eigenlijk slechts 119 zijn. Zo zie je maar dat de taxonomische gespecialiseerde libellespecialisten nog steeds het een en ander om handen hebben, zelfs van de libellen in Europa. Ook in de toekomst zal er nog wel steeds het een en ander blijven veranderen. Wanneer zal het *Sympecma braueri/annulata/paedisca/striata* probleem bijvoorbeeld eens worden opgelost?