

Ruilabonnements

Periodicals in exchange

Kopieën van in de rubriek 'ruilabonnements' genoemde artikelen kunnen worden opgevraagd bij Nick van der Ham, Luttik Oudorp 46, 1811 MX Alkmaar (072) 120190. Porto en kopieerkosten zijn voor rekening van de aanvrager.

BOLETIN GRUPO IBÉRICO DE AVES MARINAS (GLAM),
Nº 9, primavera 1990.

Alvarez Lao C.M. 1990. COLORACIONES EN CORMORAN MOÑUDO. *Bol. GLAM* 9: 1-2

Hierin wordt de kleurvariatie besproken van de naakte delen van juveniele Kuifaalscholvers aan de Spaans-Atlantische noordkust. Een aanzienlijk aandeel van deze vogels vertoont geelachtige poten in plaats van de voor de ondersoort *aristotelis* beschreven zwarte poten. Ofschoon dit een kenmerk is van de mediterrane ondersoort *desmarestii*, acht de auteur het waarschijnlijker dat er sprake is van individuele variatie dan van de verschijning van mediterrane vogels aan de Atlantische kust.

Costas R. 1990. SOBRE LA PRESENCIA DE AVES MARINAS ACCIDENTALES, PROCEDENTES DEL HEMISFERIO SUR, EN LAS COSTAS IBÉRICAS. *Bol. GLAM* 9: 2-3.

Deze bijdrage geeft een kort verslag van de resultaten van een enquête onder zeelieden in Galicië (NW-Spanje) omtrent het vangen en meenemen van zeevogels door zeelieden. Hieruit kwam naar voren dat diverse soorten, vooral albatrossen, jan van genten en pijlstormvogels, vrij fanatiek worden gevangen ter voeding, maar ook ter vermaak van de mannen. Vaak komt het voor dat dergelijke vogels in leven worden gehouden en als een soort mascotte worden meegenomen naar huis, alwaar ze voor de Iberische kust weer worden vrijgelaten. De auteur noemt dit als voornaamste argument voor zijn theorie dat de grote meerderheid van de waarnemingen van zeevogels uit de zuidelijke oceanen in het Noordatlantisch gebied (voor zover ze niet gebruikelijkerwijs hierheen trekken) alleen dankzij menselijke activiteit hier hebben kunnen aankomen.

BOSCO & Dies Jambrino I. 1990. EL INCREMENTO DE GAVIOTA CABECINEGRA EN LA ALBUFERA DE VALENCIA. *Bol. GLAM* 9: 3-4.

Zwartkopmeeuwen overwinteren in groten getale aan de Noordspaanse Middellandse Zeekust (zo'n 50,000 vogels). Niettemin was de soort verder zuidwaarts

schaars en kwam zij in de regio van Valencia tot voor kort uitsluitend voor in de provincie Castellón in het noorden. In de Albufera de Valencia werd de soort vòòr 1985 nimmer gezien. Hierna is het aantal waarnemingen sterk toegenomen, tot zo'n 300 regelmatige overwinteraars in recente jaren.

Alvarez Lao C.M. 1990. DATOS SOBRE EDADES DE ALCIDOS EN ASTURIAS. *Bol. GLAM* 9: 4.

Aan de hand van veldwaarnemingen en onderzoek van kadavers stelde de auteur vast dat in de winter aan de noordkust van Spanje van 40 waargenomen Zeekoeten 87.5% en van 49 Alken 91.8% onvolwassen was. Bij Papegaaiduikers leek hetzelfde beeld te bestaan, maar de steekproef was te gering om dit hard te maken.

SEEVÖGEL, Band 11, Heft 2, Juni 1990.

De Vries R. 1990. BRUTVOGELBESTANDE AN DER DEUTSCHEN NORDSEEKÜSTE IM JAHRE 1988 - DRITTE ERFASSUNG DURCH DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT "SEEVÖGELSCHUTZ". *Seevögel* 11: 21-26.

De werkgroep "Seevogelschutz" voerde in 1988 een integrale broedvogeltelling uit van de Duitse Noordzeekust, inclusief de eilanden. Enkele interessante resultaten zijn: 2540 paar Bergeend, 1230 paar Eidereend, 16 paar Middelste Zaagbek, 22022 paar Scholekster, 6205 paar Kluut, 19 paar Bonte Strandloper, 48703 paar Kokmeeuw, 2897 paar Stormmeeuw, 2123 paar Kleine Mantelmeeuw, 34123 paar Zilvermeeuw, 49 paar Lachstern, 8220 paar Grote Stern, 8029 paar Visdief, 3550 paar Noordse Stern, 3894 paar 'noordse dief' en 514 paar Dwergstern.

Hartwig E., Schrey K. & Schrey E. 1990. ZUR NAHRUNG DER LACH-MÖWE (*LARUS RIDIBUNDUS*) IM NIEDERELBERAUM. *Seevögel* 11: 27-31.

Op basis van 112 maaganalyses van adulte Kokmeeuwen, verzameld in het natuurreervaat "NSG Hullen" werden drie hoofvoedselgebieden onderscheiden: velden/weilanden, wadvlakten/sloten en vuilstortplaatsen. Het bleek dat veel vogels van de wadvlakten/sloten gebruik maakten, met bv. visresten in 86.8% van de magen. Spiering was de meest gegeten vissoort. De categorie velden/weiden kwam op de tweede plaats. Van het dierlijk voedsel waren insecten (vooral kevers) het belangrijkste (56.3% van de magen). Ook werden in 58.0% van de magen plantenresten aangetroffen. Afval was een onbelangrijke voedselbron.

SEEVÖGEL, Band 11, Heft 3, September 1990.

Müller H.H. 1990. ORNITHOLOGISCHE NOTIZEN VON DEN FALKLAND ISLANDS. *Seevögel* 11: 41-46.

Tijdens een bezoek in maart 1987 nam de auteur 79 vogelsoorten waar op de Falklands, meest zeevogels (o.a. 17 soorten Procellariiformes). Curiosa waren Chinstrap Penguin *Pygoscelis antarcticus*, concentraties van Grote Pijlstormvogel *Puffinus gravis* en Noordse Pijlstormvogel *P. puffinus* en van Noordse Stern *Sterna paradisaea*.

Hartwig E., Stühmer F. & Clemens T. 1990. ZUR ERNÄHRUNGSÖKOLOGIE DER KÜSTENSEESCHWALBE (*STERNA PARADISAEA*) AUF SCHARHÖRN. *Seevögel* 11: 53-59.

De jongen van Noordse Sterns op Scharhörn werden voornamelijk gevoerd met clupeiden (waaronder Sprot) en zandspieringen. De kwaliteit van het voedsel nam toe met de leeftijd van de jongen. Er werden 1.3 voedingen per nest per uur geregistreerd, waarin beide ouders participeerden. De voedingsfrequentie was hoger bij eb dan bij vloed en ook nam voedingsfrequentie toe met de leeftijd van de jongen. Het voedsel werd door de jongen slechts bij hoge uitzondering geweigerd. Er werd gefourageerd op de vaargeul van de Elbe (de meest productieve plek) en op de wadvlakten ten noorden van Scharhörn. De maximale actieradius bedroeg 4 km.