

Dwergmeeuwen in augustus 1991: een rectificatie

Little Gulls in August 1991: a correction

Tijdens de augustus-telling van het biologisch monitoring programma van de Dienst Getijdewateren kwam verspreid op zee veel drijvend wier voor. Groepjes van 10-50 kleine, meeuwachtige vogels fourageerden in en rond dit wier, zowel zwemmend als er boven vliegend, op een wijze gebruikelijk bij fourageren op oppervlakteplankton. In het begin van de tocht zijn enkele Dwergmeeuwen *Larus minutus* gezien. Na deze waarneming was het 'zoekbeeld' gericht op deze soort, terwijl op dat moment niet werd onderkend dat er ook veel jonge Visdieven *Sterna hirundo* en Noordse Sterns *S. paradisaea* voor de kust aanwezig waren, die een zelfde gedrag vertoonden en die vanuit de lucht een vergelijkbaar beeld gaven. Al deze vogels zijn als 'Dwergmeeuw' in de computer ingevoerd. De verspreidingskaart zoals gepubliceerd in Recent Reports in Sula 5(3) moet worden beschouwd als de verspreiding van Dwergmeeuw, juveniele Visdief en juveniele Noordse Stern te zamen.

Summary A map, published in Sula's Recent Reports 5(3), said to show the distribution of Little Gulls in the Dutch sector of the North Sea, should be regarded as a map of Little Gull and immature 'commic' terns together. By mistake, similar looking birds were all identified as Little Gulls, overlooking considerable numbers of immature terns.

Henk Baptist, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Grenadierweg 31, 4338 PG Middelburg