

## Waarnemingen van zeezoogdieren


MAART - MEI 1993 In totaal werden 74 waarnemingen van walvisachtigen ontvangen en daarbij ging het om 230 exemplaren en 4 verschillende soorten. Het meest spectaculair was de waarneming van 6 Potvissen *Physeter macrocephalus* bij Ameland (zie elders in dit nummer). Daarnaast werden behalve 2 groepjes ongedetermineerde dolfinen (totaal 7 exemplaren), 4 meldingen van Dwergvinvissen *Balaenoptera acutorostrata* (4 exemplaren), 32 meldingen van Witsnuitdolfijnen *Lagenorhynchus albirostris* (140 exemplaren) en 33 meldingen van Bruinvissen *Phocoena phocoena* (71 exemplaren) ontvangen (figuur 2). Wanneer de in figuur 2 uitgezette waarnemingen worden vergeleken met de uitgezette waarnemingsinspanning in figuur 1, ontstaat een goede indruk van de plaatsen waar wel en niet veelvuldig zeezoogdieren konden worden gezien. Op grote afstand van de kust werden in de westelijke helft van de Noordzee beduidend meer zeezoogdieren opgemerkt dan ten oosten van 2°OL, de transecten in de Zuidelijke Bocht leverden vrijwel niets op, en de tellingen in de Duitse Bocht waren vooral succesvol ter hoogte van het Duitse Waddeneiland Sylt. Ofschoon dit patroon enigszins geflatteerd is door verschillende weersomstandigheden, is het in grote lijnen een bevestiging van eerdere bevindingen.

Dwergvinvissen werden uitsluitend gezien in een klein, dolfinenrijk gebied ten oosten van de Noordoostengelse kust. Ook de meeste Witsnuitdolfijnen werden in dit gebiedje aangetroffen (5 mei 1993, RV *Tridens*, HO, HvB). In een half uur tijd werden hier 21 kleine troepjes Witsnuitdolfijnen aangetroffen (2-10 exemplaren bijeen). Veel van deze groepjes benaderden het schip om even bij de boeg mee te zwemmen en daarbij konden fraaie foto's worden gemaakt (HO). De op deze dieren vrij veel voorkomende witte littekens op vooral kop en rugvin konden zo worden vastgelegd ter vergelijking met latere ontmoetingen. Verschillende keren werden groepjes Witsnuitdolfijnen waargenomen die werden vergezeld door zeevogels. Meestal ging het daarbij om kleine troepjes meevliegende Drieteenmeeuwen, soms om Jan van Genten of beide soorten te zamen. Sommige groepjes dolfinen werden op enige afstand van het schip gezien waar ze hoog uit het water opsprongen.

De meest verbreide soort was de Bruinvis. Opvallend waren een melding van een Bruinvis in het Molengat bij Texel (KvdS) en een waarneming in het zeegat van Truschelling (NdH). Zeetrekwaarnemers bij Camperduin (1 maart, NvdH) en op Ameland (18 maart, MV) namen eveneens een Bruinvis waar. Een groot aantal waarnemingen van Bruinvissen bij Sylt bevestigt het belang van dit deel van de Duitse Bocht voor deze kleine walvisachtige (MFL).

**Informatie van:** NZG/Marine mammal database, H. van den Berg, H. van Berkel, M. Buckens, J. Bijleveld, N.F. van der Ham, N. den Hollander, B. Knegtering, M.F. Leopold, H. Offringa, T. Postma, P.J.H. Reijnders, K. van der Star, M. Verluys, C. Winter

CJC



*Figuur 2. Waarnemingen van walvisachtigen, maart-mei 1993.*  
*Figure 2. Sightings of cetaceans, Mar-May 1993.*