


Zeevogelwaarnemingen op zee

SEPTEMBER 1994 - NOVEMBER 1994 Het onderzoeksschip *RV Tridens* werd tijdens drie tochten bemand door vogelwaarnemers. Van 19 tot en met 23 september vond een haringlarven-survey plaats langs de oostkust van Engeland, waarna van 24 oktober tot en met 4 november de '*International Bottom Trawl Survey*' werd uitgevoerd op het zuidelijk deel van de Noordzee. Tenslotte bevoer de *Tridens* van 8 tot en met 24 november ten behoeve van de '*Southern Shelf Survey*' het Kanaal, de Western Approaches en de Keltische Zee.



Figuur 2. Transect-tellingen in de Keltische Zee, november 1994.


Figure 2. Strip-transect counts in the Celtic Sea, November 1994.

Met bijna 1800 exemplaren was de Noordse Stormvogel in september een van de meest algemene soorten onder de Engelse oostkust. Verder werden tijdens deze week met rustig najaarsweer ruim 500 Jan van Genten, 300 Kleine Mantelmeeuwen en bijna 700 Drieteenmeeuwen geteld. Dat ook de zeekoeten hier nog steeds voedsel konden vinden (in augustus werden er in deze contreien eveneens ruim 8000 genoteerd) bleek uit het waargenomen aantal; meer dan 2200. Het aantal Grote Jagers bleef steken op 25, het aantal Papegaaiduikers op 92. De laatste Visdieven van dit najaar werden op de 20 september gezien.

Ondanks de afnemende wind werd tijdens de laatste week van november van geen enkele soort een noemenswaardig aantal geteld, wel opvallend was de terugkeer van de Zilvermeeuw overal op de zuidelijke Noordzee, die daarmee de plaats van de Kleine Mantelmeeuw innam achter vissersboten. Ondanks de harde wind konden de eerste week van november bijna 1600 Zeekoeten worden genoteerd. In het Doggersbank gebied werden concentraties fouragerende Zeekoeten aangetroffen in een zone met scholen jonge haring. Op plaatsen waar de haring dicht aan de oppervlakte voorkwam (echo-survey) kwamen Drieteenmeeuwen en Zeekoeten samen fouragerend voor. Drieteenmeeuwen profiteerden van de door de duikende Zeekoeten naar de oppervlakte gejaagde vis. Dat het aantal Noordse Stormvogels niet boven de 300 uitkwam was waarschijnlijk te wijten aan het zuidelijke vaarschema. Deze week waren een aantal lijsterachtigen, in tegenstelling tot de meeste zeevogelsoorten, in flinke aantallen aanwezig. Zo werden naast honderden Spreeuwen ondermeer 93 Merels, 55 Kramsvogels en 75 Koperwieken geteld.

Tijdens de 'exotische' laatste tocht van 1994 naar de Keltische Zee en Golf van

Biskaje bepaalden de Jan van Gent (1134), de Grote Jager (295), Grote Mantelmeeuwen (512) en Drie-teenmeeuwen (3679) het beeld op zee. Opvallend waren de grote aantallen Noordse Stormvogels (692) in deze wateren. Kleine Mantelmeeuwen, die begin november al uit de Noordzee waren verdwenen, werden hier 141 exemplaren vastgesteld. Eén Grote Pijlstormvogel, twee Vale Pijlstormvogels en elf Stormvogeltjes completeerden het geheel. Bijzondere waarnemingen vanaf de schepen waren een Bladkoning op 21 september, een adulte Ijsduiker midden op de Noordzee op 2 november en een erg late Visarend op 9 november onder Cornwall.



Figuur 3. Transect-tellingen in de Noordzee, sep-nov 1994.
Figure 3. Striptransects in the North Sea, Sep-Nov 1994.

CW

Informatie van: NZG werkgroep offshore; C.J. Camphuysen, I. Hoogendoorn, E. Koopman, C.J.N. Winter