

Vergeleken met de grote zwermen steltlopers die in het voorjaar langs de Hollandse kust vliegen, zijn de aantallen die langs het Noordzeestrand van de Waddeneilanden te zien zijn onbeduidend. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de stroom steltlopers via de Waddenzee verder in noordoostelijke richting trekt en zodoende aan de Noordzezijde van de eilanden niet wordt opgemerkt.

Een vraag die alle waarnemers zich elk jaar weer stellen is : waar zijn de steltlopers die langs de Hollandse kust vaak in grote aantallen worden gezien, gestart ? Men zou kunnen veronderstellen dat deze vogels van het Delta-gebied op weg zijn naar de Waddenzee. De telresultaten bij Schouwen, door W.J.Wolff gepubliceerd in Limosa 46, maken dit voor veel soorten niet duidelijk. Slechts voor enkele soorten (bv. Rossegrutto, Kanoet) valt een piekje op Schouwen samen met de piek in onze tellingen. Bij andere soorten (bv. Tureluur en Groenpoot) lijken de resultaten zelfs moeilijk met elkaar te rijmen. Misschien dat veel steltlopers die wij langs de Hollandse kust zien passeren, afkomstig zijn uit de Britse estuaria . Bij hun noordoost gerichte trek zouden ze door onze kust gestuwd kunnen worden.

TABEL 3 . Steltlopers langs de Hollandse kust.

soort	totaal→ N	aantal uren waarin 50 % van het totaal.	aantal uren waarin de soort gezien is.	presentie percentage
Scholekster	2647	35	280	70
Kievit	2301	1	37	9
Goudplevier	180	4	19	5
Zilverplevier	1711	18	121	30
Bontbekplevier	118	7	38	10
Kleine plevier	2	1	2	-
Steenloper	712	12	95	24
Wulp	1450	11	134	34
Regenwulp	384	8	84	21
Posse grutto	12641	15	157	40
Grutto	285	4	35	9
Watersnip	26	3	11	3
Houtsnip	2	1	2	-
Oeverloper	21	3	9	2
Tureluur	2675	8	153	39
Zwarte ruit	48	2	10	3
Groenpoot	224	5	33	8
Kanoetstrandl.	799	3	52	13
Bonte Strandl.	8412	10	129	32
Paarse Strandl.	42	1	2	-
Drieteenstrandl.	233	8	44	11
Kemphaan	61	2	12	3
Kluut	439	3	36	9

Enkele opmerkingen per soort :

Bonte Strandloper

De grote stroom niet gedetermineerde steltlopers van 14 maart (2948 ex. in 8 uur) hebben vermoedelijk betrekking op deze soort(zie verslag voorjaar 1973). De andere topdagen waren 30 en 31 maart en 1 en 2 april. In totaal waren er 17 uren met meer dan 150 ex. De grootste uurtotalen waren : 30-3 :10-11u : 805 Hbz. en 30-3: 9-10u: 545 Hbz. 1-4 : 11-12u. :563 ex. IJmuiden.

Evenals vorig jaar werden op overeenkomstige uren aan de Hondsbossche iets grotere aantallen genoteerd dan bij IJmuiden. Wat de spreiding over de dag betreft, kan worden opgemerkt dat deze soort vaak tot na 11 u. flink doortrekt, maar na 17 u. vrijwel niet meer gezien wordt. Langs het Noordzeestrand van de Waddeneilanden werden 138 ex. geteld.

Wulp

Op 14-3 tussen 14 en 15 u. werd het grootste uurtotaal genoteerd, nl. 100. (Schoorl) Deze soort werd in de namiddag wel regelmatig waargenomen, hoewel de aantallen zelden die van de ochtenduren overtreffen. Bij Schier werden boven zee 328 ex, gezien, waarvan 195 ex. in één uur: 16-4 : 16-17 u.

Zilverplevier

Deze soort werd in het voorjaar van 1974 niet zo plotseling massaal trekkend waargenomen, als in beide voorafgaande jaren. Wellicht werd de top meer gespreid door de aanhoudende noordoostelijke wind. Zo was de gemiddelde presentie in april en mei 1973 21 %, maar in 1974 was dit 54 %. De uurmaxima van dit voorjaar zijn ook veel lager dan die van voorafgaande jaren : 9 mei: 17-18u :112 ex. Noordwijk;16 mei: 7-8u : 69 ex. Katwijk. Deze soort werd in de namiddag heel weinig waargenomen, al doet de avond van 9 mei anders vermoeden.

Tureluur

Dit voorjaar werden in de uren na 17 u. geen opvallende aantallen Tureluurs gezien. De enorme piek in periode 17 werd veroorzaakt door slechts één dag nl. 28 april. Van 6u. tot 13 u. werden te Noordwijk de volgende uurtotalen genoteerd : 392-497-302-167-157-231. Het was een regenachtige , iets nevelige ochtend met wind NO 5B.

Rosse Grutto

Veel niet gedetermineerde grote steltlopers hebben waarschijnlijk betrekking op deze soort. Gedurende de topdagen 25 april t/m 1 mei werd deze soort op alle uren van de dag in behoorlijke aantallen waargenomen. In het geheel waren er 31 uren met meer dan 100 ex. Het grootste aantal per uur werd te Scheveningen op 30 april geteld : 11-12 u : 525 ex. Op Schier was 1 mei (met daar westelijke wind) de beste dag. Totaal Waddengebied: 291ex.

Kanoetstrandloper

Ook in het verslag over de voorjaarestrek in 1973 kon reeds worden gezegd, dat deze soort er een zeer opvallend trekpatroon op na houdt. Evenals in andere jaren is er een sterke trek te bespeuren in de tweede mei-decade. In 1974 was er eigenlijk alleen op 16 mei van behoorlijke trek sprake. In 7 uren werden 545 ex. geteld. Deze soort trekt vooral in de eerste ochtenduren en vrijwel niet meer na 12 uur.

Rosse franjepoot

17 april : 1 ex.→ 0 Schier (Bijlsma) ; 13-4 "franjepoot" → 0 Schier (v.Diermen)