

FUTEN

	Hollandse kust			Waddengebied			TOTAAL
	→ Z	→ N	t.p.	→ W	→ O	t.p.	
"fuut"	8	9	7	6	14	-	44
Fuut	39	98	68	22	14	3	244
Roodhalsfuut	2	8	1	14	14	-	39
"kleine fuut"	1	5	1	2	15	-	24
Geoorde fuut	-	-	-	-	2	-	2
Kuifduiker	-	1	2	1	3	-	7
Dodaars	-	1	2	-	1	-	4

In januari en februari werden op zee geen opvallende concentraties Futen gezien. De bijzonder zachte winter zal hiermee wel in verband gebracht kunnen worden. Meer dan in genoemde wintermaanden werden in de eerste helft van mei Futen op zee aangetroffen. Alle posten langs de Hollandse kust noteerden in die periode fouragerende Futen. De aantallen waren echter bescheiden : max. 5 ex. bij IJmuiden. In het Waddengebied werd slechts driemaal een Fuut ter plaatse opgemerkt.

De grootste uurtotalen werden genoteerd op :

16 febr. 5 ex. zuid - Noordwijk
26 maart 4 ex. west- Schiermonnikoog
5 juli 6 ex. zuid- Noordwijk

Verdeling van uurfrequenties voor Fuut :

	0	1	2 - 5	6 - 10	10 +
Hollandse kust	751	67	40	2	-
Waddengebied	249	24	7	-	-

Roodhalsfuten werden langs de Hollandse kust in 9 uren opgemerkt. Alle waarnemingen vielen tussen 14 febr. en 28 april. In het Waddengebied werd deze soort in 24 uren gezien. Alle waarnemingen werden gedaan tussen 19 maart en 11 april. Er werden nooit meer dan 2 ex. in één uur geteld.

Niet gedetermineerde kleine futen werden vooral op 21 maart op Schier opgemerkt (9 ex. oost.) Op 3 april werden op Schier 4 ex. oost in één uur gezien.

Geoorde futen werden gezien op 21 maart en 4 april op Schier; beide dagen 1 ex. oost. Kuifduiker :

19 maart 2 ex. oost - Schier 1 april 1 ex. noord - Maasvlakte
21 maart 1 ex. oost - Schier 26 april 2 ex. t.p. - IJmuiden
3 april 1 ex. west - Schier

Stormvogeltje

2 april - 1 ex. west - Schiermonnikoog

Noordse Stormvogel

In figuur 2 zijn de vondsten opgenomen. Het gestippelde deel is het aandeel van het Waddengebied hierbij. Bij deze figuur moet wel bedacht worden, dat hieraan geen systematische tellingen ten grondslag liggen. Bij hun komst op het strand zagen de waarnemers een dood ex. liggen, wat in vele gevallen leidde tot een wandeling van enkele kilometers. Een telling langs de gehele kust zou veel grotere aantallen te zien geven. Dit blijkt bv. uit de volgende opgaven :

13 april - 9 ex. op 7 km- Schoorl
19 april - 11 ex. op 5 km. Hbz.
4 mei - 25 ex. op 6 km. - Zandvoort
5 mei - 12 ex. op 5 km. - Noordwijk

Al deze vondsten hadden betrekking op dieren van de lichte fase die niet of nauwelijks met olieresten in aanraking waren geweest.

Nog verrassender dan de vondsten waren in 1975 de waarnemingen. Gaan de waarnemingen in het najaar vrijwel altijd gepaard met stormachtige winden uit west tot noordwest, in het voorjaar van 1975 werdende Noordse Stormvogels bij vrijwel elke richting waargenomen. Toch vlogen alle vogels die langs de Hollandse kust werden gezien in noordelijke richting. In totaal werden langs de Hollandse kust 23 ex. gezien. Hierbij waren soms merkwaardige dingen te zien. Zo werd op 4 juni bij Noordwijk gezien hoe een Noordse Stormvogel recht uit zee kwam en op het strand neerstreek. Bij de Hondsbossche werd op 30 juni een ex. gezien dat ook recht uit zee kwam, daarna ongeveer 5 minuten wat boven de duinen ging vliegen en daarna weer in westelijke richting verdween.

In het Waddengebied werden 5 waarnemingen gedaan, waaronder een waarneming van een donker ex. op 24 maart bij Schiermonnikoog.

De waarnemingen zijn als volgt over de maanden te verdelen :

maart: 2 dagen- 2 waarnemingen juni : 6 dagen - 13 waarnemingen
april: 6 dagen- 6 waarnemingen begin juli : 3 dagen - 3 waarnemingen
mei : 1 dag - 1 waarneming

Noordse Pijlstormvogel

3 april - 1 ex. west - Schiermonnikoog - zwakke westelijke wind

21 juni - 1 ex. noord - Noordwijk - matige NO wind

Jan van Gent

	Hollandse kust			Waddengebied			Totaal
	→ Z	→ N	t.p.	→ W	→ O	t.p.	
1 ^e winterkl.	3	13	1	3	1	-	21
overgangskl.	2	94	5	4	1	-	106
adult	5	62	5	58	13	-	143
totaal	10	169	11	65	15	-	270

Vondsten werden gedaan op 12 jan., 26 jan., 1 april, en 10 april resp. bij Hondsbossche, Noordwijk en tweemaal Vlieland.

Uit de figuren 4 en 5 blijkt dat het voorkomen van deze soort in mei en juni, zoals dat eigenlijk in 1974 voor het eerst werd waargenomen, geen eenmalige gebeurtenis is geweest. Nu er in juni en begin juli veel meer is waargenomen dan in voorgaande jaren, blijkt deze tijd van het jaar een goede tijd te zijn voor het waarnemen van Jan van Genten voor onze kust. Opvallend is ook dat bij deze late trek alle vogels in de "goede" richting vlogen. Ook bij deze soort had de windrichting weinig invloed op de trekrichting.

In mei vindt er een belangrijke wijziging plaats in de leeftijdsopbouw van de doortrekkende Jan van Genten :

Waddengebied - waarnemingen van 24 maart t/m 4 mei : 89 % adult

Hollandse kust - tot 1 mei : 56 % adult.

week 18 : 67 % adult	week 23 : 20 % adult
week 19 : 50 % adult	week 24 : 45 % adult
week 20 : 60 % adult	week 25 : 12 % adult
week 21 : 42 % adult	week 26 : 13 % adult
week 22 : 48 % adult	week 27 : 16 % adult

De grootste uurtotalen werden genoteerd op :

30 maart - 5 ex. west en 3 ex. oost - Schiermonnikoog

1 juni - 16 ex. noord van 4 tot 5 uur - Hondsbossche

5 juni - 11 ex. noord van 6 tot 7 uur - Noordwijk

In tegenstelling met de najaarstrek werden nu geen opvallende verschillen waargenomen tussen Noordwijk en de Hondsbossche . Wel kan gezegd worden dat de Maasvlakte door de Jan van Genten enigszins gemeden wordt. Op dagen dat zowel bij Noordwijk als de Hbz. noordwaarts vliegende vogels werden gezien, werd op de Maasvlakte geen enkele Jan van Gent waargenomen.

Aalscholver

In figuur 11 zijn de uurgemiddelden per periode voor deze soort weergegeven. Bijna de helft van alle waargenomen Aalscholvers werd in week 16 gezien. De beste dag was 22 april met 12 ex. in één uur te Noordwijk.

Kuifaalscholver






Bij IJmuiden werden vanaf begin januari tot 9 mei vrijwel dagelijks Kuifaalscholvers waargenomen. Op 19 januari en 26 april zelfs 4 ex. bij elkaar. De meeste waarnemers zagen daar twee of drie ex. Op 30 april werden voor het laatst 2 ex. bij elkaar gezien. Slechts éénmaal werd een adult ex. gemeld.


De andere waarnemingen :

27 maart - 1 ex. juv. t.p. - Scheveningen - P.L.Meininger

28 maart - 1 ex. juv. t.p. - op oude bunker bij Voorne - J.Ruinaard en R.G.Bijlsma

8 mei - 2 ex. juv. noord- Maasvlakte - R.G.Bijlsma





Figuur 6. Uurgemiddelden per periode voor enkele Anatidae

Witte Pelikaan

22 mei - 1 ex. noord - Noordwijk

Lepelaar

25 mei - 1 ex. -Noordwijk

26 mei - 5 ex. noord - Noordwijk

27 mei - 1 ex. noord - Noordwijk

1 juni - 1 ex. noord - Hondsbossche

Blauwe Reiger

Tussen 1 maart en 14 juli werden boven zee Blauwe Reigers gezien. Van de 75 ex. vlogen 15 ex. in zuidelijke richting. De meeste ex. werden gezien op 21 maart, toen bij Katwijk 14 ex. in één uur passeerden.