



STELTLOPERS

Vergeleken met het voorjaar van 1974 zijn enkele soorten veel minder talrijk geweest in 1975. Met name geldt dit voor Rosse Grutto en Tureluur, soorten die vooral in de laatste week van april doortrekken. Ook de trek van sterns was in die tijd niet zo geweldig, maar enkele dagen daarna maakte veel goed. Deze trek golf van sterns ging echter niet gepaard met sterke trek van steltlopers.



Figuur 22 . Uurgemiddelden voor Steltlopers



Figuur 23 Uurgemiddelden voor Steltlopers

De beste steltloperdag was ongetwijfeld 17 mei, toen na het voorbijtrekken van een onweersfront een geweldige trek losbarstte. Bij een zwakke NO wind en slecht zicht werden duizenden steltlopers, voornamelijk Kanoeten, maar ook veel Zilverplevieren en Tureluurs, gezien. Ook trokken in die uren duizendenzwaluwen over. Pas op 25 mei als de wind weer NO geworden is, begint een regelmatige steltloper-trek die tot in juni blijft voortduren.

Tabel IV Steltlopers langs de Hollandse kust

Soort	totaal → Z	totaal → N	aantal uren waarin de soort is gezien	maximale presentie en periode waarin deze wordt bereikt
Scholekster	1603	4133	636	97 % - 22
Kievit	642	485	72	52 % - 27
Zilverplevier	1	4336	199	71 % - 21
Goudplevier	4	51	11	7 % - 12
Bontbekplevier	3	938	85	59 % - 22
Kleine plevier	-	19	11	6 % - 20
Strandplevier	-	20	12	6 % - 27
Steenloper	4	320	121	51 % - 20
Watersnip	1	2	3	4 % - 16
Wulp	73	1025	169	50 % - 12
Regenwulp	35	410	105	38 % - 20
Grutto	3	131	19	10 % - 12
Rosse grutto	43	3911	78	84 % - 17
Witgatje	-	1	1	1 % - 19
Bosruiter	-	6	3	3 % - 19
Oeverloper	2	32	16	10 % - 19
Tureluur	33	947	174	79 % - 26
Zwarte ruiter	-	8	4	2 % - 20
Groenpootruiter	-	93	35	18 % - 20
Kanoetstrandloper	23	10952	94	58 % - 20
Paarse strandloper	-	-	21	- - -
Kleine strandloper	-	3	1	3 % - 21
Bonte strandloper	41	8772	233	70 % - 13
Drieteenstrandl.	157	1196	161	72 % - 11
Kemphaan	-	38	8	11 % - 11
Kluut	7	382	47	16 % - 13

Enkele opmerkingen per soort :

Scholekster

De grootste uurtotalen werden door een korte winterperiode veroorzaakt : 13 febr. 235 ex. zuid Schoorl en 16 febr. 162 ex. noord Hbz. De meeste trek wordt op 28 mei waargenomen met te Noordwijk 89 ex. in één uur en bij IJmuiden van 6 tot 9 uur : 68+57+73 noord.

Zilverplevier

De trek van deze soort komt pas in de tweede helft van mei goed op gang. Op 16 mei al 169 ex. in één uur te Noordwijk en op 17 mei 582 ex. in 6 uur te IJmuiden. Daarna zijn 25 t/m 29 mei goede trekdagen voor deze soort (steeds NO wind). Deze periode wordt ook in het "Handbuch der Vögel Mitteleuropas" als de beste tijd genoemd. In juni wordt de Zilverplevier nog op 15 dagen en in begin juli nog op 3 dagen waargenomen, steeds echter in zeer kleine aantallen. Op Schier was vooral 28 mei een goede dag met een uurtotaal van 154 ex.

Bontbekplevier

Tot 17 mei worden langs de Hollandse kust zeer kleine aantallen waargenomen, op enkele uitzonderingen na, zoals 3 mei : 36 ex. noord in 3 uur aan de Hbz. Ook voor deze soort begint op 17 mei een verrassend sterke trek op gang te komen : Noordwijk 80 ex. in 2 uur. Op 28 mei is de trek het sterkst met 88 ex. in één uur te Katwijk. Natuurlijk worden er van deze soort nog al wat ex. gemist als de groepjes verder uit de kust gaan vliegen. Waarschijnlijk behoren deze donkere Bontbekjes tot de ondersoort *Charadrius hiaticula tundrae*. Ook in Sleeswijk-Holstein vindt in de laatste week van mei doorgaans sterke trek van deze ondersoort plaats.

Steenloper

In de wintermaande worden aan de Hondsbossche en bij IJmuiden vrijwel dagelijks groepjes Steenlopers gezien. Duidelijk gerichte trek begint pas op 30 april, hoewel de aantallen laag blijven. Eerst op 17 mei worden er meer dan 10 ex. in een uur genoteerd : Noordwijk 30 ex. Na 17 mei worden er nauwelijks meer Steenlopers gezien.

Wulp

Deze soort wordt langs de kust vrijwel nooit massaal trekkend waargenomen. Zo was er in het voorjaar van 1975 slechts één uur met meer dan 50 ex. : Hbz. 12 april 51 ex. Wel wordt deze soort in vergelijking met andere steltlopers over een lange periode waargenomen.

Regenwulp

Op 3 april passert bij Noordwijk het eerste ex. Verder blijft deze soort in april bijzonder schaars (slechts 15 ex!). De beste dagen zijn 8, 9 en 17 mei. De uurtotalen blijven steeds onder de 25 ex. In de eerste helft van juli wordt de Regenwulp al weer in 24 uren, verspreid over 11 dagen waargenomen. Dit komt geheel overeen met de omschrijving in de Avifauna van Nederland .

Rosse Grutto

Ook in 1975 viel het hoogtepunt van de trek in week 17 en week 18. De trek was echter veel minder sterk dan in 1974. De grootste uurtotalen waren nu : 26 april : 6½-7½ u - 260 ex. IJmuiden en 28 april : 7½-8½ u - 131 ex. Noordwijk Alleen op 3 mei worden nog aardige aantallen gezien zoals 133 ex. tussen 9 en 10 te IJmuiden. De wegtrek uit het Waddengebied werd dit jaar wel opgemerkt. Nadat op 27 mei de wind van NO naar NW gedraaid was, begon op Schier een geweldige trek. Van 17 tot 20 u werden de volgende totalen genoteerd : 1826 - 1580 - 1740. De vogels vlogen in lange linies en V-vluchten op ongeveer 100 tot 300 meter hoogte en verdwenen in NO richting.

Tureluur

In het Waddengebied wordt op 2 dagen aardige trek van Tureluurs waargenomen : op 5 april van 7 tot 18 u de volgende totalen : 2-35-52-31-77-65-33-20-4-7. en op 19 april 101 ex. in 5 uur, beide dagen op Schier.

Langs de Hollandse kust zien we een flinke uitschieter op 17 mei : 213 ex. in één uur te Noordwijk . Voor die datum stelde de trek niet zoveel voor, dit in tegenstelling tot 1974 toen de piek in de laatste week van april viel.

Kanoetstrandloper

Uit het gedeelte over de trek in het "Handbuch der Vögel Mitteleuropas" blijkt niet direct dat de tweede helft van mei de beste tijd voor de Kanoet is. Toch is het frappant dat ook in 1975 voor half mei vrijwel geen Kanoet wordt opgemerkt. Op 15 mei komen de eerste tientallen door, maar de ongeëvenaarde trek golf vindt plaats op 17 mei na de passage van een zwaar onweer : IJmuiden van 8 tot 13 u : 3557 - 1267 - 91 - 66 - 6 . Daar het zicht op die dag niet meer dan 1 km. bedroeg, zal het werkelijke aantal voorbijsnellende Kanoeten wel veel groter zijn geweest. Sterke trek met honderden ex. per uur wordt ook nog waargenomen op 26 t/m 29 mei.

Drieteenstrandloper

Het opvallende trekpatroon met twee pieken wordt in het "Handbuch" ook genoemd voor Bretagne. In Duitsland is de tweede helft van mei steeds de beste doortrektijd. De trek langs de Hollandse kust is het sterkst op 27 en 28 mei. Uurmaximum : 66 ex. te IJmuiden op 29 mei. De laatste waarneming valt op 23 juni : 2 ex. noord aan de Hondsbossche .

Bonte Strandloper

Ook dit jaar was de sterkste trek weer einde maart- begin april te zien. De beste dag was 28 maart met tussen 7 en 9 uur te IJmuiden : 1093 en 1246 ex.

Paarse Strandloper

Slechts driemaal werd een langstreckende Paarse Strandloper opgemerkt. Over het niet zien van deze soort bij zeetrekellingen verscheen een stukje in het vierde Seabird Report blz. 93 : "Purple sandpipers - offshore migrants ?"

Bij Hoek van Holland, Scheveningen en op de pieren van IJmuiden werden tot in april steeds groepjes Paarse Strandlopers gezien (maximaal 25 ex.). Het laatste ex. werd op 16 mei langstreckend bij Noordwijk gezien.

Klutt

De eerste Kluten werden op 18 maart bij Schoorl gezien. De meeste ex. werden op 6 april gezien : 124 ex. noord - Katwijk/Noordwijk.