


7. Overige figuren


7.1. Toelichting

In de volgende figuren wordt van een aantal soorten een indruk gegeven van de doortrek van adulte en onvolwassen vogels. Hierbij is per zeven-daagse periode het percentage van het totaal aantal adulte resp. onvolw. berekend. Zo is uit de figuur 7.3. af te lezen dat in periode 20 ruim 15 % van alle adulte Jan van Genten doortrok en dat in periode 23 ruim 21 % van alle onvolwassen Jan van Genten werd geregistreerd.


In figuur 7.2. wordt een dergelijke berekening uitgevoerd voor de gedetermineerde duikers. Het betrof hier steeds ex. die al geheel of gedeeltelijk in zomerkleed waren. In figuur 7.8. wordt een indruk gegeven van de trek van Noordse stern en Visdiefje.




7.2. Gedetermineerde duikers (alleen Hondsbossche zeeoering)




7.3. Jan van Gent - Sula bassana




7.4. Grote Mantelmeeuw - Larus marinus (alleen Hondsbossche zeeoering)




7.5. Kokmeeuw - *Larus ridibundus*
 (alleen Hondsbossche)



7.6. Dwergmeeuw - *Larus minutus*



7.7. Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*



7.8. Gedetermineerde sterns
 (alleen Hondsbossche)