



5. PRESENTIEPERCENTAGES


5.1. Toelichting

Bij de berekening van het presentiepercentage speelt het aantal exemplaren dat in het desbetreffende uur werd genoteerd geen rol, meer. Per zevendaagse periode (1 t/m 26) is het aantal uurtotaalkaarten geteld waarop de soort genoteerd stond. In dit geval inclusief de ter plaatse (tp.) verblijvende vogels.


Het aantal uren, waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de desbetreffende periode.




5.2. Duikers - Gaviidae




5.3. Fuut - Podiceps cristatus



5.4. Noordse stormvogel - Fulmarus glacialis




5.5. Jan van Gent - Sula bassana




5.6. Zwarte zeezeend - Melanitta nigra

5.7. Middelste zaagbek - Mergus serrator


- presentiepercentages -




5.8. Bergeend - *Tadorna tadorna*




5.9. Dwergmeeuw - *Larus minutus*




5.10. Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*




5.11. Grote stern - *S. sandvicensis*




5.12. Noordse/dief - *Sterna hundo/paradisaea*



5.13. Dwergstern - *S. albifrons*




5.14. Zilverplevier - *P. squatarola*




5.15. Rosse grutto *Limosa lapponica*


- presentiepercentages -




5.16. Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*



5.17. Kanoetstrandloper - *Calidris canutus*



5.18. Bonte strandloper - *Calidris alpina*



5.19. Drieteenstrandloper - *Calidris alba*