

3. TOTAALSTATEN.

3.1. Duikers-Alkachtigen (excl. steltlopers) N., Z. Holland en Waddenkust.

SOORT	Zuid Holl.+IJm.			Hondsbossche Z.			Waddenkust			TOTAAL
	← Z	→ N	↓ tp	← Z	→ N	↓ tp	← W	→ O	↓ tp	
.arctica	9	2	3	2	5	1	3	1	-	26
.stellata	32	4	8	4	18	5	57	5	4	137
.immer/adamsii	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
avia totaal	611	149	25	498	412	19	263	19	5	2001
.cristatus	5032	229	1179	799	741	152	150	32	11	8325
.griseigena	34	4	3	24	45	3	12	-	2	127
.auritus	-	-	3	1	1	12	2	-	3	22
.nigricollis	6	-	3	2	5	2	-	-	1	19
.aurit./nigric.	10	3	7	3	14	23	11	9	4	84
.ruficollis	-	-	16	-	-	1	1	-	-	18
.glacialis	57	16	59	212	357	6	142	263	28	1140
.leuc./W.pelag.	9	-	-	1	-	-	9	-	-	19
.leucorrhoea	100	6	1	30	31	5	24	-	-	197
.pelagicus	2	-	-	-	1	-	1	-	-	3
.puffinus	102	11	1	58	32	-	15	2	-	221
.griseus	288	11	-	224	63	-	547	7	-	1140
.gravis	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4
.grav./diomed.	4	-	-	2	4	-	-	-	-	10
.species	12	2	-	4	2	-	8	-	-	28
.bassana tot.	934	474	26	1673	2973	616	2850	461	449	10456
1 winter	209	134	4	275	448	38	528	73	53	1762
overg.kl.	316	211	6	612	1454	105	657	179	83	3623
adult	292	72	1	753	975	176	1665	187	32	4153
.carbo	181	106	1	30	34	3	96	2	1	454
.aristotelis	9	5	4	2	1	-	-	-	-	21
.cinerea	236	24	5	45	6	-	3	4	-	323
.purpurea	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
.leucorodia	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
.ruber (?)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.ciconia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
.olor	23	27	4	19	22	-	-	9	-	104
.bewickii	1	6	-	33	-	-	-	-	-	34
.cygnus	13	-	-	7	5	-	-	-	-	25
.bernicla	4296	11	8	6777	246	-	848	8	5	12199
.leucopsis	92	55	-	1	13	-	-	-	-	161
.anser	365	7	-	13	4	-	-	-	-	389
.albifrons	626	17	-	48	-	12	-	-	-	703
.fabalis	122	-	-	19	-	-	-	-	-	141
.f.brachyrh.	19	69	-	23	27	-	-	-	-	138
.l.aegyptiacus	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
.tadorna	1550	1158	-	263	1809	12	84	219	-	5095
.platyrhynch.	3131	109	11	981	440	1661	56	10	10	6409
.strepera	25	32	-	15	14	9	11	-	-	106
.crecca	795	186	19	281	428	62	260	22	1	2054
.querquedula	1	-	-	1	4	-	3	-	-	9
.penelope	30837	79	110	3434	627	343	41	13	-	35484
.acuta	2557	125	-	20	56	1	8	-	-	2767
.clypeata	241	72	1	119	70	87	68	3	1	662

(3.1.)

SOORT	Zuid Holl.+IJm.			Hondsboasche Z.			Waddenkust			TOTAAL
	← Z	→ N	↓ tp	← Z	→ N	↓ tp	← W	→ O	↓ tp	
A. marila	88	45	5	111	169	-	15	-	-	433
A. fuligula	220	134	10	126	62	20	46	4	-	622
A. ferina	1273	170	3	97	30	-	1	7	-	1581
B. clangula	164	6	1	98	26	4	8	1	-	308
C. hyemalis	3	2	-	7	16	5	2	-	-	35
M. fusca	50	39	18	136	316	11	157	28	10	953
M. nigra	15970	5017	750	30929	17735	10865	32943	2904	599	117712
S. mollissima	291	266	421	342	1633	268	6780	470	198	10669
M. merganser	153	30	1	93	64	-	-	-	-	341
M. serrator	888	48	22	356	320	2	221	29	1	1887
M. albellus	6	-	-	16	4	-	-	-	-	26
Stercorarius sp.	65	17	9	12	20	2	41	6	2	174
S. skua	39	18	9	35	32	8	29	-	4	174
S. pomarinus	40	10	1	21	20	-	17	-	2	111
S. parasiticus										
totaal	1501	426	119	556	687	65	290	56	34	3734
lichte fase	274	85	20	86	118	9	37	6	-	635
donkere fase	99	19	7	29	30	1	35	8	1	229
juveniel	165	15	11	66	73	6	7	2	-	345
S. longicaudus	-	-	-	2	1	2	2	-	1	8
L. hyperboreus	2	-	1	-	3	-	1	-	-	7
L. melanocephalus	4	2	5	4	5	-	-	-	-	20
X. sabini	5	-	-	1	3	-	-	-	-	9
L. minutus totaal	1676	164	150	1850	454	17	842	31	4	5188
juveniel	350	61	65	137	78	8	45	7	3	754
adult	1314	103	82	1708	376	9	751	24	1	4368
R. tridactyla										
totaal	3518	829	2181	1694	3133	112	1715	376	5	13563
juveniel	452	129	84	312	416	22	248	152	2	1817
adult	2933	683	454	1370	2715	90	626	221	2	9094
S. hirundo	22815	10580	546	3167	3466	161	2525	333	21	43614
S. paradisaea	1792	84	21	114	123	-	1079	11	-	3224
S. hirundo/parad.	81947	22298	2213	42555	13165	1508	26935	2676	3190	196487
S. sandvicensis	23632	10961	475	20729	11897	493	16803	4578	2925	92493
S. albifrons	937	20	15	696	116	1	499	81	3	2368
G. nilotica	2	-	-	-	1	-	2	-	-	5
H. caspia	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Ch. niger	2015	219	204	458	221	10	1356	118	232	4833
S. dougallii	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A. torda	2	-	2	2	1	2	-	1	-	10
U. aalge	4	1	4	4	13	2	-	-	3	31
A. torda/U. aalge										
totaal	99	11	22	163	245	26	59	25	4	654
F. arctica	4	-	1	1	5	-	-	-	-	11
A. alpe	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C. grylle	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3

Opmerkingen bij tabel 3.1.:

- Bij verschillende soorten is een onderverdeling naar herkenbare kleden gemaakt. Omdat door diverse ongunstige omstandigheden het niet steeds mogelijk is deze kleden te noteren, is in veel gevallen het totaal beduidend hoger dan de som van de aantallen die vermeld zijn kleden.

Voor de optellingen van resp. 'Gavia-soorten', Sterna hirundo/paradisaea en Alca torda/Uria aalge geldt hetzelfde.

(3.1.)

- Bij het 'ter plaatse'-totaal van de Noordse Stormvogel (*F.glacialis*) is een aantal doodvondsten opgeteld. Zie hiervoor Hfdst. 8.
- Bij de Kuifaalscholver (*P.aristotelis*) is voor Zuid Holland het minimum aantal ter plaatse weergegeven op grond van de diverse beschrijvingen.
- Bij de Kleinste Jager (*S.longicaudus*) gaat het voor de Hbz. in twee gevallen om doodvondsten.

3.2. Steltlopers

SOORT	Zuid.Holl.+IJm.			Hondsbossche			Waddenkust			TOTAAL
	← Z	→ N	↓ tp	← Z	→ N	↓ tp	← W	→ O	↓ tp	
<i>H.ostralegus</i>	2550	90	917	1338	1109	2878	182	57	149	9270
<i>V.vanellus</i>	14335	20	5	13008	154	115	182	-	-	27819
<i>P.apricaria</i>	813	2	3	152	9	4	44	3	-	1030
<i>P.squaterola</i>	626	9	6	130	60	6	139	10	4	990
<i>Ch.hiaticula</i>	855	9	71	158	43	14	579	96	9	1834
<i>Ch.dubius</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<i>Ch.alexandrinus</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<i>A.interpres</i>	625	39	595	543	558	1675	119	40	5	4199
<i>G.gallinago</i>	69	2	4	103	4	-	22	10	-	214
<i>S.rusticola</i>	-	-	3	3	-	-	-	-	-	6
<i>Lymn.minima</i>	1	-	-	3	-	-	-	-	-	4
<i>N.arquata</i>	3298	20	-	903	42	11	92	10	-	4376
<i>N.phaeopus</i>	700	20	8	141	11	56	24	2	-	962
<i>L.lapponica</i>	1299	18	4	355	96	9	768	255	138	2942
<i>L.limosa</i>	8	-	4	6	-	-	-	2	-	20
<i>A.hypoleucos</i>	118	8	274	120	7	61	6	-	1	595
<i>T.totanus</i>	2029	190	52	2765	377	242	42	32	-	5729
<i>T.erythropus</i>	5	1	-	6	-	-	1	-	-	13
<i>T.nebularia</i>	46	6	-	17	3	2	6	2	-	82
<i>T.ochropus</i>	4	-	-	7	-	-	5	-	1	17
<i>C.canutus</i>	1425	136	26	658	220	92	172	38	-	2767
<i>C.alpina</i>	2168	32	126	1439	416	16	174	71	28	4470
<i>C.ferruginea</i>	89	-	-	11	-	-	5	-	5	110
<i>C.maritima</i>	62	16	541	5	6	13	7	-	1	651
<i>C.minuta</i>	31	8	5	3	3	2	2	-	-	54
<i>C.alba</i>	737	59	1561	267	122	40	685	165	617	4253
<i>Ph.pugnax</i>	8	-	-	12	-	-	-	-	-	20
<i>R.avosetta</i>	15	-	-	7	6	-	-	-	2	30
<i>F.fulicarius</i>	2	-	4	-	-	-	2	-	-	6

Opmerkingen bij tabel 3.2.:

- Het 'ter plaatse'-totaal voor de Paarse Strandloper (*C.maritima*) in Zuid Holland is de som der dagmaxima.
- Bij de Rosse Franjepoot (*F.fulicarius*) is voor Zuid Holland het minimum aantal ter plaatse weergegeven op grond van de diverse beschrijvingen.

3.3. Zeezoogdieren

SOORT	Zuid Holl.+IJm.			Hondsbossche			Waddenkust			TOTAAL
	← Z	→ N	↓ tp	← Z	→ N	↓ tp	← W	→ O	↓ tp	
<i>Phoca vitulina</i> (Gewone Zeehond)	-	-	2	1	-	1	3	-	-	7
<i>Globicephala malaena</i> (Griend)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Phocoena phocoena</i> (Bruinvis)	-	-	-	-	-	1†	-	-	-	1

3.4. Stootvogels en Uilen

SOORT	Zuid Holl.+IJm.			Hondsboesche			Waddenkust			TOTAAL
	← Z	→ N	↓ tp	← Z	→ N	↓ tp	← W	→ O	↓ tp	
P.haliaetus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pern.apivorus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
M.migrans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M.milvus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C.aeruginosus	5	-	-	3	-	-	1	-	-	9
C.cyaneus	28	-	1	27	-	2	-	1	1	60
A.gentilis	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
A.nisus	47	-	1	13	1	-	1	-	-	63
B.buteo	4	1	-	1	-	-	1	-	-	7
B.lagopus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F.tinnunculus	28	3	2	24	4	28	3	1	2	95
F.columbarius	10	1	-	11	3	3	1	-	2	31
F.subbuteo	4	2	1	1	2	3	-	-	-	13
F.peregrinus	1	-	-	1	-	3	-	-	-	5
Asio otus	-	-	2*	1	-	1	1	-	-	5
Asio flammeus	-	-	3	-	-	-	-	-	9*	12

Opmerking bij tabel 3.4.1

- Alle met een asterisk gemerkte 'ter plaatse'-notaties zijn recht uit zee aanvliegende vogels.