


7. BIJZONDERE FIGUREN.



7.1. Toelichting

Naast de standaardgrafieken (par. 5 & 6) zijn voor een aantal soorten enkele 'bijzondere' grafieken opgenomen. Toelichting per afbeelding en steeds (tenzij anders vermeld) de zuidvliegende vogels onder de abscis, noordvliegende erboven.




7.2. Vaal Stormvogeltje - *Oceanodroma leucorhoa*
Absolute aantallen per periode

v.v. bijzondere figuren




7.3. Grauwe Pijlstormvogel - *Puffinus griseus*

Absolute aantallen per periode




Zuid-Holland + IJmuiden
(1,7 exx. per uur)



Hondsbossche
(2,8 exx. per uur)


7.4. Grauwe Pijlstormvogel - *Puffinus griseus*

Absolute aantallen per dag, periode 37 (d.i. 10-16 september)



7.5. Jan van Gent - *Sula bassana*

Leeftijdsproporties per periode, uitsluitend Hondsbossche
Vliegrichting speelt uiteraard geen enkele rol meer.




7.6. Jan van Gent - *Sula bassana*
(uitsluitend Hondsbossche)

v.v. bijzondere figuren


In figuur 7.6. wordt van de Jan van Gent een indruk gegeven van de doortrek van adulte en onvolwassen vogels. Hierbij is per zevendaagse periode het percentage van het totaal aantal adulte, resp. overgangskleed, resp. eerste winter, vogels berekend. Zo valt bijvoorbeeld af te lezen dat in periode 37 bijna 35% van de eerste winter-vogels doortrok, dat in periode 42 ruim 35% van de adulte vogels werd geregistreerd, enz.

De grafieken 7.9. en 7.8. geven hetzelfde weer van de doortrek aan Noordse Sterns/Visdiefen en de Dwergmeeuw.




7.7. Zwarte Zeezeend - *Melanitta nigra* Sexratio (uitsluitend Hondsbossche)

In figuur 7.7. is het aantal ♂♂ Zwarte Zeezeenden uitgezet tegen 1♀ (x♂ : 1♀), per periode



7.8. Dwergmeeuw - *Larus minutus* (uitsluitend Hondsbossche) zie tekst bij graf. 7.6.



7.9. Noordse Stern - *Sterna paradisaea* Visdiefje - *S. hirundo* (uitsluitend Zuid-Holland + IJmuiden) zie tekst bij graf. 7.6.