


5. Presentiepercentages


5.1. Toelichting

Bij de berekening van presentiepercentages speelt het aantal exemplaren dat in het desbetreffende uur werd genoteerd, geen rol meer. Per zevendaagse periode is het aantal uurtotaalkaarten waarop de soort genoteerd staat, geteld. Ook de ter plaatse aanwezige vogels worden in deze berekening betrokken. Het aantal uren waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage. Voorbeeld : In week 10 (5-11 mrt) werden op 14 uurtotaalkaarten afkomstig van de kust van Zuid-Holland één of meer duikers genoteerd. In die week 10 werd in Z-Holland 20 uren zeetrek geteld. Deze aantallen leiden tot het presentiepercentage van 70.


In onderstaande figuren is het presentiepercentage van Noord-Holland Noord gestippeld, terwijl Z-Holland+IJm. met een gesloten lijn aangegeven is.




5.2. Duikers - Gaviidae




5.3. Fuut - Podiceps cristatus



5.4. Toppereend- Aythya marila



5.5. Brilduiker- Bucephala clangula




5.6. Eidereend- S. mollissima




5.7. Zwarte Zeeëend - Melanitta nigra







5.8. Grote Zeeëend - *M. fusca*




5.9. Grote Zaagbek - *M. merganser*




5.10. Middelste zaagbek - *M. serrator*




5.11. Alk+Zeekoet - *A. torda*+*U. aalge*




5.12. Scholekster - *H. ostralegus*



5.13. Wulp - *Numenius arquata*



5.14. Tureluur - *Tringa totanus*



5.15. Bonte strandloper - *C. alpina*