

Bijlage

Overzicht van de vondsten gedurende de strenge winter van 1979

Getelde kilometers strand :

deelgebied	tellingen	km
I Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden	6	50
II Hoek van Holland - IJmuiden	17	128
III IJmuiden - Den Helder	29	129 $\frac{1}{2}$
IV Texel en Vlieland	9	54 $\frac{1}{2}$
V Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog	3	15 $\frac{1}{2}$
totaal	64	377 $\frac{1}{2}$

Soort	Aantal	Oliebevuiling	deelgebied				
			I	II	III	IV	V
duiker spec.	2	100 %	-	1	-	-	1
Roodkeelduiker	56	65-85 %	6	11	19	18	1
Parelduiker	11	100 %	5	5	1	-	-
Geelsnavelduiker	1	100 %	-	1	-	-	-
IJsduiker	1	?	-	-	-	1	-
Fuut	593	25-55 %	65	308	161	47	12
Roodhalsfuut	98	28-60 %	4	38	34	19	3
Kuifduiker	9	10-65 %	-	8	1	-	-
Geoorde Fuut	5	40 %	-	1	2	2	-
Dodaars	8	63 %	2	3	2	1	-
Noordse Stormvogel	33	65-80 %	2	17	4	9	1
Jan van Gent	10	60-70 %	2	3	3	2	-

soort	aantal	oliebevuiling	deelgebied				
			I	II	III	IV	V
Aalscholver	3	67 %	1	2	-	-	-
zwaan spec.	1	?	-	-	-	-	1
Knobbelzwaan	6	33 %	2	1	2	1	-
gans spec.	1	100 %	-	1	-	-	-
Rotgans	31	13-35 %	5	3	10	13	-
Grauwe Gans	1	0 %	-	1	-	-	-
Rietgans	4	0 %	-	-	3	1	-
Kolgans	4	50 %	-	1	3	-	-
Brandgans	2	0 %	-	-	2	-	-
Wilde Bend	56	25-50 %	8	16	19	3	10
Bastaardeend	3	33-67 %	-	2	-	1	-
Wintertaling	2	0 %	-	-	1	1	-
Smient	12	25-40 %	2	6	3	1	-
Krakeend	4	25 %	-	2	1	-	1
Pijlstaart	2	0 %	2	-	-	-	-
Slobeend	3	33-100%	-	-	2	-	1
duikeend spec.	2	0 %	1	-	-	1	-
Toppereend	30	30-60 %	3	3	13	11	-
Kuifeend	67	30-40 %	21	21	17	6	2
Tafeleend	12	75-85 %	6	3	2	-	1
Brilduiker	44	15-40 %	8	3	21	12	-
Eidereend	52	25-50 %	4	6	8	27	7
Zwarte Zeeëend	339	45-65 %	77	59	127	55	21
Grote Zeeëend	41	35-45%	12	11	14	4	-
Grote Zaagbek	7	14 %	2	2	3	-	-
Middelste Zaagbek	89	20-44 %	5	12	26	41	5
Bergeend	154	20-30 %	16	14	44	44	36
Nijlgans	1	0 %	-	1	-	-	-
Meerkoet	919	tenminste 12%	146	424	294	45	10
Scholekster	254	7-20 %	35	30	138	42	9
Kievit	6	0 %	2	-	2	2	-
Zilverplevier	2	0 %	-	1	-	1	-
Goudplevier	1	?	-	1	-	-	-
Steenloper	33	6-18 %	5	9	13	6	-
Wulp	85	6-22 %	16	14	32	5	19
Rosse Grutto	3	0 %	1	-	-	2	-
Watersnip	2	0 %	1	-	1	-	-
Houtsnip	13	15-45 %	-	7	1	3	2
Tureluur	183	tenminste 2%	5	44	109	24	2
Kanoetstrandloper	12	8-17 %	2	-	8	2	-
Bonte Strandloper	27	0 %	8	9	7	2	1
Drieteenstrandloper	8	0 %	-	4	3	1	-
Paarse Strandloper	1	0 %	-	-	1	-	-
Grote Jager	1	100 %	-	-	-	-	1
Grote Mantelmeeuw	80	24-43 %	21	17	23	18	1
Kleine Mantelmeeuw	9	22 %	5	3	-	-	1
Zilvermeeuw	301	20-60 %	50	109	103	30	9
Stormmeeuw	233	24-64 %	26	105	63	21	18
Kokmeeuw	164	25-40 %	21	88	36	17	2
Dwergmeeuw	1	100 %	-	1	-	-	-
Drieteenmeeuw	69	38-72 %	1	23	38	6	1
Alk / Zeekoet	10	70-80 %	-	6	2	1	1
Alk :	53	75-85 %	4	8	16	24	1
Zeekoet	124	68-86 %	4	39	37	41	3
Dikbekzeekoet	1	?	1	-	-	-	-
Kleine Alk	2	50-100 %	-	-	2	-	-
Papegaaiduiker	4	50-100 %	-	2	1	-	1

Enkele opmerkingen :

- het kilometergemiddelde bedroeg 11,7. Dit is zeer hoog, vooral als men bedenkt dat diversen als lijsters, postduiven, waterrallen en spreeuwen niet zijn meegeteld.
- niet alle tellers hebben nauwkeurig opgegeven of hun vondsten met olie besmeurd waren. Hierdoor is een minimum en een maximum percentage opgenomen.
- het percentage met olie bewuilde vogels is onverwacht hoog.
- Pas nadat de aanslag op de conditie van de vogels hardnekkig bleek (febr./maart) liepen de aantallen op. Niet zelden werden toen 40 of meer vogels per kilometer gevonden!
- Aantallen in verhouding tot andere jaren :
 - niet abnormaal :
Noordse Stormvogel , Jan van Gent, Drieteenmeeuw, Alk en Zeekoet
 - tamelijk groot :
Eidereend , Grote Mantelmeeuw , Zilvermeeuw, Kokmeeuw
 - groot :
duikers , ganzen, zwemeenden, duikeenden , Grote Zeeëend, Grote Zaagbek, Middelste Zaagbek , alle steltlopers , Stormmeeuw
 - zeer groot :
alle futen , Zwarte Zeeëend , Meerkoet
- Bij de Tureluur werd bij een drietal vondsten de ondersoort bepaald : 3 x de IJslandse Tureluur *Tringa totanus robusta*
- Bij twee vondsten van de Zeekoet werd de ondersoort bepaald : 2 x *Uria aalge albionis*
- De ondersoort voor de Alk werd in één geval bepaald : *Alca torda islandica*
- Voor zover vermeld ging het bij de Noordse Stormvogel steeds om de lichte fase.
- Alle vondsten van dwaalgasten zijn gecontroleerd /gedetermineerd door deskundigen van het Zoölogische Museum Amsterdam.
- Gegevens als kleeftijd, geslacht zijn in vrij uitgebreide vorm voorhanden, maar hier niet verwerkt .

C.J.Camphuysen
postbus 53153
AMSTERDAM
tel. 020 - 446053