


5. Presentiepercentages.


Per zevendaagse periode is het aantal uurkaarten geteld waarop de soort genoteerd staat. Ook de ter plaatse aanwezige vogels worden in deze berekening betrokken. Het aantal uren waarin de soort present was, wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingsuren in de betreffende periode. Bij alle bewerkte soorten werd in één figuur uitgezet de Noordhollandse (middels een stippellijn) en de Zuidhollandse (strakke lijn) kust. Bij een aantal soorten werd ook de Waddenkust uitgezet in een apart figuur (met strakke lijn). Bij deze laatste figuren is de plaats vermeld.




5.2. Duikers - *Gavia spec.*




Duikers - *Gavia spec.*, Wadden.




5.3. Fuut - *Podiceps cristatus*




5.4. Noordse Stormvogel - *Fulmarus glacialis*




5.5. Jan van Gent - *Sula bassana*




5.6. Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*




5.7. Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*




5.8. Bergeend - *Tadorna tadorna*




5.9. Dwergmeeuw - *Larus minutus*




5.10. Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*




5.11. Noordse/dief - *Sterna paradisaea*




5.12. Grote Stern - *Sterna sandvicensis*




5.13. Dwergstern - *Sterna albifrons*




5.14. Zilverplevier - *Pluvialis squatarola*




5.15. Wulp - *Numenius arquata*




5.16. Rosse Grutto - *Limosa phaeopus*




5.17. Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*



5.18. Tureluur - *Tringa totanus*



5.19. Bonte Strandloper - *Calidris alpina*



5.20. Drieteenstrandloper - *Calidris alba*