




7. Bijzondere figuren.

7.1. Toelichting:

In de volgende figuren wordt van een aantal soorten een indruk gegeven van de doortrek van adulte en onvolwassen vogels, mannetjes en vrouwtjes van een soort e.d. Hierbij is per zevendaagse periode het percentage van het totaal aantal per onderverdeling berekend. Zo is uit figuur 7.3. af te lezen dat in periode 14 bijna 20 % van alle mannetjes Zwarte Zeeëend doortrok en dat in periode 18 25 % van alle vrouwtjes werd geregistreerd. Soortgelijke figuren zijn ook gemaakt voor de verhouding Roodkeel:Parelduiker (fig. 7.2.) en Visdief:Noordse Stern (7.8.). In de laatste figuur is de leeftijdsverhouding van de Jan van Gent in een staafdiagram uitgezet.



Mergus serrator
 male —
 female - - -




fig. 7.5. Grote Mantelmeeuw, leeftijdsverhouding, Hondsbossche

Larus marinus
adult —
imm. - - -




fig. 7.6. Kokmeeuw, Leeftijdsverhouding, Hondsbossche

Larus ridibundus
adult —
imm. - - -




fig. 7.7. Dwergmeeuw, Leeftijdsverhouding, Nederlandse kust

Larus minutus
adult —
imm. - - -




fig. 7.8. Noordse Stern en Visdief, Nederlandse kust.

n= 1.310

n= 17.352

Sterna hirundo ---
S.paradisaea —

fig. 7.9. Jan van Gent, leeftijdsverhouding, Nederlandse kust.

In deze figuur werden alleen de verhoudingen uitgezet indien tenminste 10 Jan van Genten in het betreffende tijdvak werden gemeld en op leeftijd gedetermineerd. Onder 'onv.' worden het tweede, derde en vierde jaars kleed verstaan.

