

8. Bespreking per soort.

8.1. Duikers - Gaviidae

★Roodkeelduiker/Parelduiker - *Gavia stellata/arctica*

De gestage toename van het aantal 'duikers' de afgelopen jaren, lijkt in het voorjaar van 1982 zijn hoogtepunt bereikt te hebben. Hoewel enige voorzichtigheid geboden is, kan toch gesteld worden dat een totaal van ruim 10.000 exemplaren niet licht verbeterd zal worden.

In januari en februari moeten zich voor de kust bijzonder veel 'duikers' opgehouden hebben. Een direkte verklaring voor de aanwezigheid van deze vogels is moeilijk te geven, mogelijk speelden twee strenge vorstperiodes in de winter van '81-'82 hierbij een rol. Verplaatsingen zoals die in dit tijdvak opgemerkt werden hebben vermoedelijk betrekking op foerageervluchten over korte afstand:

8 jan	9-11u	270+142 Z	Schev.	13 feb	8-10u	294+65 Z	Texel
12 jan	242 N in 1 uur	Hbz		14 feb	519 Z, 143 N in 5 uur		Texel
1 feb	9-11u	214+127 Z	Hbz.	15 feb	8-10u	132+125 Z	Texel

Opvallend is dat bij Scheveningen in februari 'duikers' sterk in aantal afnamen, terwijl juist dan bij Texel en de Hbz. de aantallen het grootst zijn. Op Texel bleven tot half maart veel 'duikers' naar zuid vliegen.

Gerichte trek naar noord begon op 21 maart met: 153 N in 8 uur Hbz. en 128 N in 6 uur Texel. Ook in maart en april kon soms omvangrijke voorjaarestrek waargenomen worden:

26 mrt	254 N in 12 uur	Hbz.
14 apr	7-10u	24+30+10 N Hbz.
	6- 9u	45+41+39 N Texel

De laatste 'duiker' werd gezien op 18 mei (texel 1 N).

Parelduikers werden in de wintermaanden regelmatig waargenomen, meestal bleef het tot één of enkelingen beperkt, maar op 23 januari waren bij de Maasvlakte 5 exemplaren aanwezig, terwijl daar op 6 februari zelfs 8 exemplaren verbleven. Vanaf begin april passeerden Parelduikers, veelal in prachtkleed, de Noordhollandse en Texelse kust, tot max. 5 exx. in 1 uur (29 apr. Castricum). Op 15 mei vlogen de laatste Parelduikers langs (3 N Hbz.).

Het grootste deel van de op soort gebracht 'duikers' was echter Roodkeelduiker. de vele 'duikers' die in januari en februari voor Texel verbleven behoorden vrijwel alle tot deze soort (o.m. op 14 feb. 137 Z in 4 uur). Ook tijdens de voorjaarestrek werden hier veel Roodkeelduikers (nu aan het prachtkleed) herkend (14 apr. 66 N in 4 uur). Bij de overige telposten was het aandeel gedetermineerde Roodkeelduikers veel geringer. De laatste Roodkeelduikers passeerden op 12 mei (3 N Texel).

★IJdsduiker/Geelsnavelduiker - *Gavia immer/adamsii*

8 jan	1 N	Hbz.	23 feb	1 N	Hbz.	28 apr	1 N	Texel
9 jan	1 Z	Hbz.	23 apr	1 N	Huisduinen			
21 feb	1 Z	Texel	24 apr	1 N	Huisduinen			

IJdsduiker -

3 jan	1 tp	Hbz (in behandeling CDNA)	23 jan	1tp	M'vlakte (niet aanvaard)
8 jan	1 tp	Hbz (niet aanvaard)	6 feb	1tp	M'vlakte (niet aanvaard)

8.2. Futen - Podicipidae

★Dodaars - *Tachybaptus ruficollis*

De meeste meldingen kwamen uit januari, met op 11 jan 15 tp Huisduinen. Voorts 1 melding uit februari (Hbz.) en 5 uit maart (Hbz. 4, Castr. 1), waarvan op 4 maart 4 exemplaren Hbz.

★Fuut - *Podiceps cristatus*

Net als bij de 'duikers' werd ook voor de Fuut een recordaantal vastgesteld. De invallende vorst moet een zeer sterke uitwerking hebben gehad op de Fuut. De grootste aantallen werden zoals altijd gezien aan de Zuidhollandse kust, half februari echter hielden zich ook voor de Hbz. enorme groepen Futen op. Bij de telposten bezuiden IJmuiden verschenen rond de tweede week van januari reeds veel Futen op de Noordzee (15 jan 5000 tp IJm.). Zuidwaartse trek vond plaats op 16 januari:

Hbz. 1205 Z in 2 uur

IJm. 3903 Z, 2700 tp in 4 uur

Zandvoort: naar schatting 4000 Z, tijdens strandtelling

De dag erop bereikte deze trek golf ook Scheveningen met: 2805 Z in 2 uur.

Op 14 februari zwommen voor de Hbz. de meeste Futen: 5000 tp. Tot begin maart bleven daar tot 250 exemplaren aanwezig. Aan de Zuidhollandse kust waren eind februari de meeste Futen alweer verdwenen.

★Roodhalsfuut - *Podiceps grisegena*

Opnieuw een soort waarvan er meer gezien werden dan tot dusver het geval was. In tegenstelling tot de Fuut leverde Texel de grootste bijdrage aan het totaal Roodhalsfuten. Mogelijke oorzaak hiervoor kan het gedeeltelijk dichtvriezen van de Waddenzee in januari zijn geweest. In deze maand en in februari werden de meeste exemplaren gezien:

10 jan 10 tp Texel : 17 jan 16 Z Schev.(3 uur) 1 feb 15 Z Texel (2 uur)

16 jan 17 Z Schev.(3 uur) 24 jan 15 Z Texel (2 uur) 14 feb 19 Z Texel (3 uur)

In april en mei vlogen aan de Hbz. en Texel af en toe Roodhalsfuten langs naar noord (tot 10 exx. op 11 apr. Hbz.). De laatste waarneming werd gedaan op 30 mei (1 Z Texel).

★Kuifduiker - *Podiceps auritus*

Kuifduikers werden voornamelijk ter plaatse rondzwemmend waargenomen, maar geen enkele keer meer dan 4 exemplaren tegelijk. Op 4 april daarentegen vlogen bij Petten 5 Kuifduikers noord.

★Geoorde Fuut - *Podiceps nigricollis*

Meldingen van deze soort kwamen uit januari (9), maart (1) en april (6), waarvan alleen de 8 exemplaren op 3 april bij IJmuiden opvielen. Het aantal ongedetermineerde 'kleine fuutjes' was dit keer zeer gering.

8.3. Stormvogels - *Procellariidae*

★Noordse Stormvogel - *Fulmarus glacialis*

Een periode met aanhoudende harde noordwesten wind die op 8 april begon, bracht aanzienlijke aantallen Noordse Stormvogels voor de kust. Voor het zover was, werden op Texel op 6 maart al 172 exemplaren achter een kotter gesignaleerd. Maar de meeste Noordse Stormvogels passeerden tussen 9 en 16 april:

9 apr 8-11u 31+112+48 N Texel

88 N Hbz.

12 apr 7-11u 30+30+92+51 N Texel

7-13u 12+10+61+4+5+38 N en 14-16u 63+27 N Hbz.

Op 15 april bij Texel (130 exx.) en op 16 april bij Huisduinen (142 exx.) en IJmuiden (86) waren weliswaar nog veel Noordse Stormvogels te zien, de aanwezigheid van deze vogels werd echter veroorzaakt door kotters. Tijdens de genoemde periode werden aan de Zuidhollandse kust slechts 10 Noordse Stormvogels opgemerkt.

Nadat in de eerste week van mei bij Texel en de Hbz. nog flink wat Noordse Stormvogels langsvlogen, nam het aantal waarnemingen sterk af.

★Grote Pijlstormvogel - *Puffinus gravis*

10 apr 1 N Hbz. (in behandeling CDNA)

★8.4. Jan van Gent - *Sula bassana*

De Jan van Gent was zeker niet talrijk in de eerste helft van 1982. Vooral juni, een maand waarin anders veel Jan van Genten te zien zijn, bleef onder de maat. Nu werden de meeste vogels waargenomen tijdens de stormperiode in april.

Na verschillende meldingen uit januari en februari, werden op 13 maart op Texel al flink wat Jan van Genten gezien: 33 Z in 2 uur (diezelfde dag aan de Hbz. 2 N). In april vlogen de meeste exemplaren echter wel langs de Hbz.:

9 apr 81 N Hbz. (9 uur)

11 apr 92 N Hbz. (12 uur)

13 Z, 21 N Texel (4 uur)

Hierna was alleen 2 mei aan de Hbz. nog de moeite waard: 47 N in 3 uur.

8.5. Aalscholvers - *Phalacrocoracidae*

★Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*

Aan de Zuidhollandse kust vlogen traditioneel de meeste Aalscholvers langs, de beste dag was: 19 april 46 N Scheveningen. Bovendien werd op 12 mei bij Scheveningen een groep van 16 Aalscholvers gezien, welke een uur later ook Noordwijk aandeed.

★Kuifaalscholver - *Phalacrocorax aristotelis*

16,17 jan 1 tp IJmuiden 21 apr 2 N Huisduinen 24 apr 1 N Noordwijk

8.6. Reigers en Lepelaars - *Ardeidae* en *Plataleidae*

★Roerdomp - *Botaurus stellaris*

8 jan 1Z, 1 N (dezelfde?) Hbz.

★Blauwe Reiger - *Ardea cinerea*

Alleen aan de Zuidhollandse kust vlogen vrij regelmatig Blauwe Reigers voorbij. Echter nimmer meer dan 10 exemplaren in 1 uur.

★Purperreiger - *Ardea purpurea*

14 apr 1 vermoedelijk ex. N Schev.

★Lepelaar - *Platalea leucorodea*

24 apr 1 N Huisduinen 14 mei 8 N Schev. . 19 jun 1 N Hbz.

8.7. Zwanen, Ganzen en Eenden - *Anatidae*

★Knobbelzwaan - *Cygnus olor*

Bij Scheveningen werd deze soort het meest gezien, vooral in juni (11 Z, 63 N)

★Wilde Zwaan - *Cygnus cygnus*

8 jan 4 Z Schev.

31 jan 11 Z Schev.

★Kleine Zwaan - *Cygnus columbianus bewickii*

7 feb 34 N Texel

24 feb 25 N Texel

★Grauwe Gans - *Anser anser*

Bij Zandvoort vloog op 16 januari een groep van 150 Grauwe Ganzen langs, terwijl bij andere posten aan de Zuidhollandse kust in februari de meeste exemplaren te zien waren:

21 feb 176 N in 2 uur Schev 22 feb 325 N in 2 uur Schev. + '96 N in 1 uur N'wijk
Aan de Hbz. vlogen pas in april de grootste aantallen langs (15 apr 92 N in 2 uur)

★Kolganzen - *Anser albifrons*

De grootste groepen Kolganzen werden gezien in januari:

1 jan 42 Z, 42 N en 37 W in 2 uur Schev. 23 jan 70 N Texel
16 jan 1185 N in 4 uur IJmuiden

★Rietgans - *Anser fabalis*

Op 13 dagen in januari passeerden Rietganzen (tot 200 N bij Zandvoort). De laatste waarneming werd gedaan op 4 april: 8 N Scheveningen.

★Kleine Rietgans - *Anser brachyrhynchos*

Alle waarnemingen kwamen uit januari en februari, de grootste groepen op:

8 jan 21 N Schev. en 36 Z Hbz. 5 feb 40 N Schev.
23 jan 130 N Texel

★Rotgans - *Branta bernicla*

Al in januari en februari vlogen bij veel telposten, maar vooral bij de Hbz, groepjes Rotganzen langs; de vliegrichting was overwegend noord. Bij Huisduinen verbleef op 18 januari een groep van 1100 Rotganzen. Aan de Hbz. waren in maart een aantal weinig omvangrijke trekgolven te zien, die van periode 9 was het sterkst met op: 1 mrt 9-11u 730+305 N 2 mrt 9-11u 143+465 N

Het aantal Rotganzen dat dit voorjaar de kust van Zuid-Holland passeerde was bijzonder laag. Op 29 mei werden aan de Hbz. (73 N) de laatste Rotganzen waargenomen. Behalve de nominaatvorm (B.b.bernicla) werden ook Witbuikrotganzen (B.B.hrota) opgemerkt: 8 jan 7 N Hbz 10-17 jan 2 tp IJm 22 jan 15 N Hbz.
10 jan 2 Z Schev. 18 jan 5 tp H'duinen 13 mrt 1 N Castr.

★Brandgans - *Branta leucopsis*

De grootste aantallen werden gezien in januari (13 jan 480 N Schev. en op 16 jan 269 N IJmuiden). De laatste waarneming kwam van 21 maart (1 tp Hbz. en 1 N Texel).

★Canadese Gans - *Branta canadensis*

16 apr 1 N Schev.

★Nijlgans - *Alopochen aegyptiata*

2 feb 2 tp Hbz. 16 apr 9 N Schev. 12 mei 2 N Schev.
5 apr 10 uit zee Schev. 11 mei 2 O H'duinen

★Casarca - *Casarca ferruginea*

19 apr 1 N Huisduinen

★Bergeend - *Tadorna tadorna*

De Bergeend trok nogal gespreid door, al vanaf begin februari vlogen kleine groepjes langs. Zelden komend tot hoge uurtotalen. Dit beeld zette zich het hele voorjaar door. Op de volgende dagen lagen de aantallen iets boven modaal:

22 mrt 58 N in 1 uur N'wijk 20 apr 81 N in 3 uur Hbz.
23 mrt 114 N in 3 uur Schev. 29 apr 67 N in 2 uur H'duinen
79 N in 2 uur Hbz.

★Smient - *Anas penelope*

Begin januari vond vorsttrek van enige omvang plaats aan de Hbz.: 8 jan 890 Z in 7 uur. Ook nadien vlogen hier vrij veel Smienten langs en op 19 januari verbleven ongeveer 1500 exemplaren ter plaatse. Een andere grote groep was op 14 maart op de Maasvlakte aanwezig: 1000 tp. Noordwaartse trek was het sterkst aan de Hbz:
8 apr 418 N in 5 uur.

★Krakeend - *Anas strepera*

Voor het eerst werd ook van deze soort noordwaartse trek van betekenis waargenomen. Weliswaar geconcentreerd op 1 dag: 5 apr 107 N Hbz. Behalve deze topdag vlogen af en toe Krakeenden langs (sexratio ♂:♀= 1:0.9)

★Wintertaling - *Anas crecca*

Tussen begin maart en de voorlaatste week van april trokken aan de Hbz. veel Wintertalingen langs. Deze passage ging de Zuidhollandse kust volledig voorbij. Op Texel daarentegen was hiervan wel een en ander waar te nemen. Dagen met sterke trek waren o.m.: 27 mrt 730 N in 2 uur Hbz. 8 apr 702 N in 2 uur Hbz.
5 apr 7-10u 725+904+209 N Hbz 10 apr 243 N in 3 uur Texel

★Wilde Eend - *Anas platyrhynchos*

Op 8 januari vlogen aan de Hbz. nogal wat Wilde Eenden zuidwaarts: 150 Z in 6 uur. Een maand later was de vliegrichting alweer overwegend noord (1 feb 118N in 3 uur Hbz.). Uit maart kwamen de meeste waarnemingen van veelal noordwaarts trekkende vogels, maar op 27 mrt zwommen bij Catsricum ook 87 exx. op zee.

★Pijlstaart - *Anas acuta*

Gespreid over februari, maart en april trokken soms kleine groepjes Pijlstaarten langs, de meeste op 7 maart: 28 N Texel (1 uur) en 5 april 46 N Hbz. (3 uur).

★Slobeend - *Anas clypeata*

Gelijktijdig begon doortrek van Slobeend bij Scheveningen, Castricum en de Hbz: (27 mrt resp. 48,59 en 74 N). De trek was het sterkst op 5 april:
156 N in 5 uur Schev. 101 N in 2 uur N'wijk 205 N in 3 uur Hbz.

★Zomertaling - *Anas querquedula*

De eerste Zomertaling werd gezien bij Scheveningen op 14 maart (6 Z). Pas in mei passeerden de meeste exemplaren (4 mei 9 N Schev. en 13 N Hbz. en op 5 mei 21 N Hbz.) Sexratio 1♂ : 0.7♀

★Tafeleend - *Aythya ferina*

Een bijzonder omvangrijke coldrush van Tafeleenden vond plaats op 13 januari bij Scheveningen: 10-13u 93+2180+646 Z. Ook op andere dagen in januari konden hier en bij IJmuiden tot max. 295 Tafeleenden in een uur gezien worden. Langs de kust van Noord-Holland passeerden pas in februari de meeste exemplaren:
14 feb 238 N in 1 uur Castricum

★Toppereend - *Aythya marila*

In tegenstelling tot de Tafeleend verschenen de meeste Toppers voor de Noordhollandse kust. De hoogste uurtotalen werden bereikt in februari en maart:
14 feb 284 N in 3 uur Hbz. 21 mrt 411 N in 3 uur Hbz.
Bij Scheveningen vlogen de meeste Toppereenden echter wel in januari langs:
14 jan 235 Z in 3 uur.

★Kuifeend - *Aythya fuligula*

Net als bij de Tafeleenden trokken grote groepen Kuifeenden zuidwaarts in januari bij Scheveningen en IJmuiden: 13 jan 10-13u 243+988+348 Z Schev.
16 jan 700 Z in 4 uur IJm. en 542 Z in 2 uur Schev.
17 jan 667 Z in 3 uur Schev.
Elders langs de kust was 17 januari de beste dag met 121 N in 1 uur bij Castricum.

★ Eidereend - *Somateria mollissima*

Op een tweetal dagen in januari hielden zich bij Texel vrij veel Eidereenden op. 8 jan 205 Z (112♀ en 68♂), 121 N (49♀ en 72♂) in 1 uur en 9 jan 239 Z (104♀ en 65♂), 117 N (69♀ en 48♂) in 3 uur. Aangezien verder langs de kust toen niet veel Eidereenden gezien werden, moet de aanwezigheid van deze vogels het gevolg zijn van nare omstandigheden (drijfijss) op de Waddenzee achter Texel. Het verblijf van deze Eiders op de Noordzee was van korte duur, daags erna waren de meeste alweer verdwenen.

De groepen Eidereenden te zien bij IJmuiden, Scheveningen en de Maasvlakte beliepen resp. 100 (10 jan), 90 (11 feb) en 176 (10 apr) exemplaren. Aan de Noordhollandse kust vloog het merendeel naar noord, bij Huisduinen de meeste exx. naar Z: 22 apr 162 (109♀ en 53♂) in 3 uur en 11 mei 161 Z (38♀ en 48♂), 126 N (25♀ en 60♂) in 4 uur. Op Texel vlogen de Eiders heen en weer of verbleven ter plaatse. (tot 56 exx.).

★Koningseider - *Somateria spectabilis*

10 jan - 21 feb 1♂ tp IJmuiden (zelfde ex. als Texel dec. '81).

★IJseend - *Clangula hyemalis*

Hoewel ongeveer tweemaal zoveel IJseenden dan gewoonlijk waargenomen werden, betekende dit niet dat de soort een regelmatige verschijning was. Slechts twee dagen leverden meer dan 5 exemplaren op: 15 jan 13 N in 1 uur Hbz. en 31 jan 8 N, 1 Z in 2 uur Texel. Vermeldenswaard zijn verder 4 IJseenden die op 16 april naar noord vlogen op Texel en 2 mei waarnemingen (2e Castricum en 15e Hbz.).

★Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*

Na het zeer magere jaar 1981, herstelde de Zwarte Zeeëend zich dit voorjaar verdienstelijk. Alleen de Zuidhollandse kust deed hieraan niet mee, daar bleven de aantallen op het niveau van vorig jaar steken. In januari en februari vond voor de Waddeneilanden nog steeds zuidwaartse trek plaats. Aan de Hbz. was de situatie vergelijkbaar, hoewel hier het percentage noordwaarts vliegende vogels groter was. Enkele goede dagen uit deze periode:

3 jan 10-13u 2157+2248+1000 W Terschell.

29 jan 2890 Z, 621 N in 2 uur Hbz.

31 jan 9-12u 2383+579+261 Z Texel

20 feb 2140 Z in 2 uur Texel

De voorjaarsstrek bereikte in de periodes 13 en 14 (eind maart/begin april) zijn hoogtepunt en was sterk geconcentreerd op een tweetal dagen:

26 mrt 13-19u 475+775+1468+2561+2316+2187 N Hbz.

13-17u 241+701+1033+2309 N Texel

3 apr 9-13u 1720+4375+3039+823 N Hbz.

11-12u 2254 N Texel

Tot half april passeerden bij deze posten nog regelmatig enkele honderden Zwarte Zeeëenden per uur. Hierna liepen de aantallen wat af en nam ook het aandeel zuidwaarts vliegende vogels weer toe. Op 10 april hielden zich voor de Maasvlakte zo'n 2000 Zwarte Zeeëenden op. Bij Schiermonnikoog waren op de laatste dag van dit voorjaar, 1 juli, eveneens veel Zwarte Zeeëenden te zien, de situatie was lichtelijk chaotisch met: 898 W, 1518 O en 850 tp.

★Brilzeeëend - *Melanitta perspilata*

10 apr 1 ad♂ N Texel (in behandeling CDNA).

★Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*

Bijzonder veel Grote Zeeëenden zijn dit voorjaar de kust gepasseerd. Gewoontegetroouw werden aan de Hbz. de meeste vogels van deze soort gezien. Al in de eerste maanden vlogen zowel bij Texel als bij de Hbz. groepjes Grote Zeeëenden langs. Het hoogste uurtotaal uit die periode was 79 (Z op 22 feb Texel). De eerste tekenen van noordwaartse trek dienden zich aan op:

3 april 9-13u 92+302+412+122 N Hbz.

De grote massa trok langs in periode 15, mogelijk heeft de aanhoudende harde noordwesten wind hierbij een stimulerende rol gespeeld:

10 apr 8-12u 280+256+75+150 en 13-16u 230+101+249 N Hbz.

8-11u 233+123+129 N Castricum

11 apr 10-20u 176+153+185+131+228+164+235+195+176+48 N Hbz.

12-14u 276+236 N Castricum

Een tweede trek golf was zichtbaar eind april en begin mei:

28 apr 288 N, 99 Z en 100 tp in 2 uur Huisduinen

2 mei 6-13u 66+111+122+89+122+50+80 N en 14-16u 405+623 N Hbz.

Tot eind mei werden nog met enige regelmaat Grote Zeeëenden waargenomen; daarnaast kwam eind juni slechts één melding binnen: 21 juni 2 Z Texel.

★Brilduiker - *Bucephala clangula*

In januari bevonden zich relatief veel Brilduikers voor de kust. De hoogste uren totalen werden gehaald aan de Zuidhollandse kust:

10 jan 32 Z in 2 uur IJmuiden

14 jan 55 Z in 4 uur Scheveningen

15 jan 42 Z in 4 uur Scheveningen

Bij Texel vlogen op 2 januari 21 Brilduikers zuid en 9 noord in 2 uur. Noordwaartse trek was alleen te zien aan de Hbz: 27 mrt 16 N (3 uur) en 11 apr 14 N (3 uur).

★Nonnetje - *Mergus albellus*

Na het invallen van de vorst verschenen veel Nonnetjes op de Noordzee. Alleen tijdens de strenge winter van 1979 werden er meer waargenomen. De periode 12-17 januari leverde de meeste vogels op (Schev 538 Z, 159 N en Hbz. 33 Z, 151 N). Bovendien bevond zich op 13 januari voor de Maasvlakte een groep van 150 fouragerende Nonnetjes. De laatste waarneming werd gedaan op 24 april (7 N Huisduinen) Sexratio 1♂:0.6♀.

★Middelste Zaagbek.- *Mergus serrator*

Het zeer grote aantal Middelste Zaagbekken werd mede veroorzaakt door enkele dagen in januari bij Scheveningen en IJmuiden:

15 jan 100 tp IJmuiden

16 jan 313 Z, 31 N in 3 uur Schev. en 222 Z, 347 N en 75 tp in 6 uur IJmuiden.

Ook elders voor de kust verbleven toen veel Middelste Zaagbekken:

10 jan 65 tp Texel 16 jan 148 N in 4 uur Hbz. 17 jan 79 Z, 50 tp in 2 uur Castr.

Eind maart begon tamelijk sterke noordwaartse trek, welke alleen aan de Noordhollandse kust werd waargenomen werd: 26 mrt 202 N in 12 uur Hbz.

3 apr 175 N in 4 uur Hbz.

4 apr 106 N in 3 uur Hbz.

29 apr 89 N in 3 uur Huisduinen

Tot slot werden nog 3 zomerwaarnemingen gedaan: 13 juni 3 Z Texel, 21 juni 2 W Vlieland en 1 juli 1 W Schier.

★Grote Zaagbek - *Mergus merganser*

Net als bij het Nonnetje was het verschijnen van Grote Zaagbekken voor de kust het gevolg van het invallen van strenge vorst. In januari vielen twee trek golven aan te wijzen. De eerste van 15-17 januari (Schev. 336 Z, 28 N en Hbz. 128 Z, 28 N) terwijl de tweede alleen in Noord-Holland opgemerkt werd, tussen 22-24 januari (castricum 118 Z en Hbz. 157 Z, 6 N). Op 12 apr vloog de laatste Grote Zaagbek langs (1 Z Hbz). Sexratio 1♂:1.5 ♀.

8.8. Steltlopers - *Haematopodidae*, *Recurvirostridae* en *Scolopacidae*

★Scholekster - *Haematopus ostralegus*

Grote aantallen Scholekster werden in de eerste twee maanden gezien op Texel en aan de Hbz. Vermoedelijk als gevolg van ijsvorming op de Waddenzee waren deze vogels verdreven naar de Noordzeekust. Enkele opmerkelijke dagen:

8 jan 469 Z, 53 tp in 1 uur Texel

7 feb 995 Z, 158 N in 2 uur Hbz.

16 jan 370 Z, 80 N in 1 uur Texel

14 feb 422 Z, 450 N in 5 uur Hbz.

Het laatste uur met meer dan 100 exemplaren werd genoteerd op 9 maart (142 Z Hbz.). Vanaf eind maart vlogen aan de Noordhollandse kust per uur hooguit enkele 10-tallen Scholeksters noord. Aan de Zuidhollandse kust werden tot ver in maart weinig Scholeksters waargenomen. De beste dag was hier: 23 mrt 226 N in 3 uur Scheveningen. Terwijl hier ook half mei nog vrij veel Scholeksters vlogen naar noord (14 mei 240 N in 8 uur).

★Kluut - *Recurvirostra avosetta*

Na de eerste waarneming op 20 februari aan de Hbz. begon de doortrek van enige betekenis in de eerste week van maart: 6 mrt 37 N in 1 uur IJmuiden. Begin april passeerden echter de meeste Kluten: 4 apr 36 N in 1 uur Hbz.

5 apr 77 N in 4 uur Schev.

63 N in 1 uur N'wijk

Een klein trek golfje half mei werd alleen bij Scheveningen opgemerkt (14 mei 25 N in 5 uur).

★Kleine Plevier - *Charadrius dubius*

1 apr 1 N Texel

11 mei 1 N Schev.

9 mei 1 tp IJmuiden

12 mei 1 N N'wijk

★Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*

Half mei trokken haast uitsluitend aan de Zuidhollandse kust Bontbekplevieren langs:

13 mei 70 N in 1 uur N'wijk

15 mei 137 N in 4 uur Scheveningen

Op 18 maart werden op de Maasvlakte 55 Bontbekjes geteld.

★Standplevier - *Charadrius alexandrinus*

10 apr 96 tp Westplaat/Maasvlakte

15 mei 3 N Schev.

30 apr 2 tp IJmuiden

★Goudplevier - *Pluvialis apricaria*

Slechts 2 uren met opmerkelijke aantallen Goudplevieren:

12 apr 200 N Hbz.

6 mei 125 N Schev.

★Zilverplevier - *Pluvialis squatarola*

Doortrek van deze soort was het sterkst aan de Zuidhollandse kust, half mei passeerden hier de grootste aantallen:

12 mei 293 N in 2 uur Schev.

15 mei 5-10u 19+357+266+43+16 N Schev.

14 mei 447 N in 5 uur Schev.

155 N in 1 uur N'wijk

De beste dag aan de Hbz. leverde aanzienlijk minder Zilverplevieren op:

1 mei 143 N in 2 uur.

★Kievit - *Vanellus vanellus*

Alleen in februari trokken aan de Hbz. aantallen van enige betekenis over:

19 feb 1144 Z in 2 uur.

★Kanoetstrandloper - *Calidris canutus*

In januari hielden zich bij Huisduinen en de Hbz. veel Kanoetstrandlopers op (resp. 3000 (11 jan) en 70 (24 jan)). Doortrek naar noord vond echter niet eerder dan in mei plaats, in welke maand twee min of meer gescheiden trek golfjes aan te wijzen waren: 1 mei 175 N in 2 uur Castr. en 5 mei 17-20u 310+520+490 N Maasvlakte
14 mei 441 N in 5 uur Schev. en 15 mei 529 N in 6 uur Schev.
386 N in 3 uur Hbz.

★Drieteenstrandloper - *Calidris alba*

Op waddeneilanden rende aan het begin van het jaar zeer grote groepen Drieteenstrandlopers over het strand. Op Terschelling op 2 januari zelfs 950 exemplaren. De grootste groep op Texel omvatte 260 exx. op 20 februari. Bij Scheveningen verbleven in januari tot 125 Drieteentjes (op de 13e), terwijl hier op 5 april nog een groep van 103 exx. aanwezig was. Half mei vond langs vrijwel de gehele kust enige doortrek plaats, met op: 13 mei 192 N in 3 uur Huisduinen
15 mei 110 N in 3 uur Hbz.

★Kleine Strandloper - *Calidris minuta*

Drie dubieuze waarnemingen: 8 feb 2 N Hbz., 28 mrt 2 N Hbz. en 13 apr 1 Z Schev.

★Krombekstrandloper - *Calidris ferruginea*

15 mei 3 N Schev.

1 jul 1 W Schier en 1 Z Schev.

★Paarse Strandloper - *Calidris maritima*

Van deze soort werden alleen kleine groepjes op strekdammen en havenhoofden gezien. De groepsmaxima voor de verschillende plaatsen lagen op:

Huisduinen 100 (10 jan)

M'vlakte 30 (30 apr)

IJmuiden 79 (6 apr)

Westkapelle 50 (5 mei)

Scheveningen 52 (4 apr)

Tot 14 mei was bij Huisduinen een onbekend aantal Paarse Strandlopers aanwezig.

★Bonte Strandloper - *Calidris alpina*

De ieder jaar vastgestelde passage van de Bonte Strandloper in maart was dit jaar geconcentreerd op twee goede trekdagen:

26 mrt 13-20u 231+342+266+406+407+429+390 N Hbz.

27 mrt 7-12u 223+213+833+519+144 N en 16-18u 656+297 N Hbz.

10-12u 400+231 N en 16-18u 334+275 N Castr.

Op 5 april volgde nog een restantje met 511 N in 3 uur Hbz.

Ook half mei trokken aan de Noordhollandse kust nog Bonte Strandlopers langs: o.m. 13 mei 152 N in 4 uur Hbz.

★Kemphaan - *Philomagus pugnax*

Eerste waarneming op 15 februari (1 N Hbz.), de meeste exemplaren volgden in april (beste dag 5 april 46 N Schev. en 17 N N'wijk).

★Bokje - *Lymnocyrtus minimus*

23 mrt 1 N Schev.

★Watersnip - *Gallinago gallinago*

Alleen waargenomen in de eerste vier maanden van het jaar, echter geen enkel uur met meer dan 5 exx.

★Grutto - *Limosa limosa*

De eerste waarneming viel op 6 maart (1 Z Schev.). Begin april was enige doortrek waar te nemen met als uitschieter 5 april 61 N, 2 Z Schev. en 47 N, 1 Z N'wijk.

★Rosse Grutto - *Limosa lapponica*

Rosse Grutto's vlogen vanaf eind maart in kleine groepjes langs naar noord. De aantallen steeds wat oplopend en op 18 april kwam voor de eerste keer een uurtotaal boven de 100 (149 N Hbz.). Eind april en begin mei bereikte de trek zijn hoogtepunt:

23 apr	589 N in 3 uur Huisduinen	1 mei	5-8u 523+532+183 N Schev.
24 apr	5-8u 322+447+620 N Schev.	2 mei	5-8u 113+537+394 N Schev.
	6-9u 540+745 N N'wijk		1000 N in 2 uur N'wijk
	1114 N in 6 uur Hbz.	5 mei	1374 N in 4 uur Hbz.
25 apr	835 N in 4 uur Castr.		935 N in 2 uur Castr.

★Regenwulp - *Numenius phaeopus*

Daar er geen gegronde redenen bestaan om twee zeer vroege waarnemingen aan de Hbz. (resp. 31 jan en 6 mrt) als zodanig te accepteren, moet 31 maart (1 N Schev.) als de eerste waarneming van de Regenwulp aangehouden worden. Gedurende april passeerden af en toe groepjes van deze soort, terwijl op 23 apr bij Scheveningen 80 Regenwulpen ter plaatse verbleven. De doortrek was echter het sterkst in mei:

10 mei	39 N in 1 uur Huisduinen	11 mei	46 N in 2 uur Hbz.
11 mei	94 N in 3 uur Schev.		

★Wulp - *Numenius arquata*

Bij zowel de Hbz. als Scheveningen vond op 8 januari een coldrushje van Wulpen naar zuid plaats: 148 Z in 6 uur Hbz. en 327 Z in 3 uur Schev.

Tot begin maart bleven aan de Hollandse kust de meeste Wulpen naar zuid vliegen (19 feb 66 Z in 2 uur Hbz.). Al snel daarop werd de vliegrichting bijna uitsluitend noordwaarts. De trek verliep weinig geconcentreerd en zette door tot diep in mei:

23 mrt	74 N in 3 uur Schev.	16 apr	47 N in 2 uur Huisduinen
--------	----------------------	--------	--------------------------

★Zwarte Ruiter - *Tringa erythropus*

In mei werdende meeste waarnemingen gedaan; bij Huisduinen passeerden de meeste Zwarte Ruiters in één uur: 11 mei 9 N.

★Tureluur - *Tringa totanus*

De voorjaarestrek beperkte zich dit jaar tot de Zuidhollandse kust, waar half mei veel Tureluurs langsvlogen. Aan de Hbz. en op Texel werden alleen in januari wat meer Tureluurs gezien (8 jan 32 Z Texel en 39 Z Hbz.).

De eerste tekenen van gerichte trek waren bij Scheveningen te zien op 4 april: 219 N in 2 uur. Dit trek golfje kreeg pas op 12 mei een vervolg, met een sterke passage van Tureluurst op drie kort aaneen liggende dagen:

12 mei	5- 9u	102+239+165+65 N Schev.
14 mei	5-10u	20+121+65+22+18 N Schev.
15 mei	5-10u	18+220+574+146+15 N Schev.

★Poelruiter - *Tringa stagnalis*

1 mrt 1 N Hbz. (niet als zodanig aanvaard).

★Groenpootruiter - *Tringa nebularia*

Vrijwel alle waarnemingen kwamen uit mei en dan vooral bij Scheveningen; daar vlogen de meeste Groenpootruiters langs op: 12 mei 29 N in 4 uur Schev.

15 mei 28 N in 3 uur Schev.

★Witgatje - *Tringa ochropus*

5 apr 9 N Hbz.

22 apr 1 N Huisduinen

★Oeverloper - *Actilis hypoleucos*

Alleen gezien in mei. De meeste Oeverlopers verbleven op het havenhoofd van Scheveningen, waar zich tot 43 exx (12 mei) ophielden. Op 1 juni waren hier nog 13 Oeverlopers aanwezig.

★Steenloper - *Arenaria interpres*

Groepen Steenlopers bevonden zich op de strekdammen en havenhoofden van Huisduinen, Hbz, IJmuiden en Scheveningen, waar maximaal resp. 169 (22 apr), 410 (13 mei), 100 (16 jan) en 99 (25 feb) exemplaren verbleven. Bij Huisduinen vlogen in april en mei soms grote groepen Steenlopers langs, veelal naar noord, soms echter ook naar zuid, zodat de verplaatsingen hier vermoedelijk betrekking hadden op lokale vogels (getijderitme ?). Gerichte doortrek naar noord werd nergens vastgesteld.

★Rosse Franjepoot - *Phalaropus fulicarius*

19 juni 1 zkl. tp Maasvlakte.

8.9. Jagers - *Stercorariidae*

★Middelste Jager - *Stercorarius pomarinus*

29 apr 1 lejrs N Huisduinen
1 ad.do.fa. N Texel

2 mei 1 ad.li.fa. N Hbz.
17 jun 1 lejrs N Castr.

★Kleine Jager - *Stercorarius parasiticus*

De eerste Kleine Jagers passeerden bij zowel IJmuiden als de Hbz. op 3 april, op Vlieland werd op 7 april het eerste exemplaar genoteerd. Hierna vlogen regelmatig Kleine Jagers langs naar noord. Het hoogste uurtotaal bedroeg 5 exx. (9 apr en 5 mei beide keren aan de Hbz.). De dag met de meeste Kleine Jagers was 9 april: 14 N in 5 uur.

★Grote Jager - *Stercorarius skua*

3 jan 2 N Hbz.

8.10. Meeuwen en Sterns - *Laridae*

★Zwartkopmeeuw - *Larus melanocephalus*

Bij Scheveningen was in elke maand, behalve juni, minstens 1 Zwartkopmeeuw aanwezig. De overige waarnemingen komen van de Maasvlakte (2 ad. tp 14 mrt) en de Hbz (31 jan 1 ad. tp en 13 apr 1 ad. Z).

★Dwergmeeuw - *Larus minutus*

Aan de Hbz. vlogen op 30 januari onverwacht vrij veel Dwergmeeuwen naar noord: 85 N in 4 uur. Buiten deze dag werd deze soort in de eerste 3 maanden zelden opgemerkt. Vanaf begin april trokken in toenemende mate vooral adulte Dwergmeeuwen langs, en in de laatste week van deze maand en de eerste van mei was de trek het sterkst:

28 apr 328 N in 4 uur Huisduinen
151 N in 2 uur M'vlakte
30 apr 5-9u 46+222+148+38 N Hbz.
269 N in 2 uur Huisduinen

1 mei 291 N in 2 uur Hbz.
418 N in 3 uur M'vlakte
2 mei 503 N in 9 uur Hbz.
307 N in 2 uur IJmuiden

Op 1 juli was bij Scheveningen nog of alweer een Dwergmeeuw aanwezig.

De meeste eerstejaars Dwergmeeuwen passeerden ruim een week na de grote trek golf: 13 mei 67 N in 5 uur Hbz.

★Kokmeeuw - *Larus ridibundus*

Na de vorstinval vond op 8 januari aan de Hbz. een vrij omvangrijke passage naar zuid plaats: 1481 Z in 8 uur. Ook bij IJmuiden hielden zich deze maand veel Kokmeeuwen op (tot 3000 tp) terwijl hier op 10 jan 1570 naar zuid vlogen in 1 uur. Rond half februari trokken soms alweer Kokmeeuwen naar noord (14 feb 305 N in 6 uur Hbz. en 252 N in 4 uur Castr.). Een telling van een slaapplek op de Maasvlakte op 14 maart leverde 30.000 exx. op. In april werden veel Kokmeeuwen gezien bij Noord-

wijk (o.m. 4 apr 370 N, 120 Z in 1 uur) en Bergen (1 apr 499 N in 1 uur). Half mei vond doortrek plaats van voor het merendeel eerstejaars vogels:

12 mei 130 N in 1 uur N'wijk (126 lejrs)

15 mei 267 N in 4 uur (142 lejrs)

16 mei 187 N in 2 uur (167 lejrs)

★Stormmeeuw - *Larus canus*

Het reeds bekende beeld van een trek golfje eind maart werd ook dit jaar weer bevestigd. Begin mei vond een omvangrijke passage plaats, waaraan ook eerstejaars Stormmeeuwen meededen. Veel eerstejaars vogels passeerden ook half mei. In juni waren het weer de heen en weer vliegende volwassen Stormmeeuwen die gezien werden.

★Kleine Mantelmeeuw - *Larus fuscus*

Uit januari werd vier keer een Kleine Mantelmeeuw gemeld (alle Hbz.). De eerstvolgende waarneming is die van 11 feb bij Scheveningen. Vanaf maart werden steeds regelmatigere Kleine Mantelmeeuwen gezien, met op 9 april een trek golfje aan de Hbz: 318 N in 10 uur. Bij Scheveningen vlogen toen al de meeste Kleine Mantels naar zuid. In juni werden hier en op de Waddeneilanden veel exemplaren gezien, ongetwijfeld broedvogels. Veruit het grootste deel van de adulte vogels werd genoteerd als L.f..intermedius.

★Zilvermeeuw - *Larus argentatus*

Geen gegevens verzameld.

★Geelpootzilvermeeuw - *Larus argentatus michahellis*

24 jan 1 tp Hbz.

★Kleine Burgemeester - *Larus glaucoides*

7-13 feb 1 tp Hbz. (in behandeling CDNA).

★Grote Burgemeester - *Larus hyperboreus*

Op verschillende plaatsen hielden zich in januari en februari Grote Burgemeesters op: Texel (minstens 1), Scheveningen (minstens 1), IJmuiden en Maasvlakte (beide zeker 3). Twee keer werd een adult exemplaar gemeld (1 jan 1 Z, Schev en 7-8 feb 1 tp Hbz.). Alle andere waarnemingen hadden betrekking op onvolwassen vogels. Verder nog meldingen van Castricum (16 mrt 1 N) en Noordwijk (7 jan 1 Z). De laatste waarneming werd gedaan op 7 mei (1 N Hbz.).

★Grote Mantelmeeuw - *Larus marinus*

De meeste Grote Mantelmeeuwen verbleven in de eerste drie maanden van het jaar voor de Texelse kust (24 jan 94 Z in 2 uur en tijdens een strandtelling op 28 feb 500 tp). Aan de Hollandse kust lagen de aantallen aanzienlijk lager. Na half april nam het aantal Grote Mantelmeeuwen sterk af, terwijl het aandeel onvolwassen vogels steeg.

★Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*

In slechts 1 uur was de Drieteenmeeuw met meer dan 10 exemplaren vertegenwoordigd (5 jan 19 Z Hbz.). Twee andere dagen waarop nog wat Drieteenmeeuwen passeerden waren:

30 jan 15 Z, 6 N-Texel en 16 N Hbz.

2 mei 18 N, 1 Z Hbz.

★Zwarte Stern - *Chlidonias niger*

De eerste Zwarte Sterns werden op 6 april aan de Hbz. waargenomen, bij Scheveningen was dat pas op 18 april het geval. Aan de Zuidhollandse kust passeerden echter wel de grootste aantallen.

Doortrek was het sterkst in de eerste helft van mei:

5 mei 12-20u 14+46+35+35+30+29+61+16 N Maasvlakte

6 mei 5- 8u 80+28+50 N Schev.

★ Noordse Stern/Visdief - *Sterna paradisaea/hirundo*

'Noordse dieven' vlogen het eerste langs bij IJmuiden op 3 april (12 N) en Scheveningen (2 N), dan op 4 april aan de Hbz. (7 N) en tenslotte bij Texel op 5 april (1 N). De trek kwam in de laatste week van april goed op gang en zette door tot ver in mei. De beste dagen uit deze periode:

29 apr 17-20u 481+709+155 N Voorne

30 apr 5- 9u 791+1624+1072+276 N Hbz.

2 mei 6-13u 199+242+474+252+561+473+1595 N en 14-16u 741+548 N Hbz.

5 mei 12-20u 127+130+92+91+84+245+267+204 N M'vlakte

14 mei 5-11u 475+204+72+123+110 N Schev.

Haast traditioneel is het verschil tussen Hbz. en Scheveningen waar het gedetermineerde 'noordse dieven' betreft. Dit jaar werden bij Schev. zelden Noordse Sterns herkend, terwijl bij de Hbz. soms grote aantallen van deze soort passeerden. Opmerkelijk in dit verband is het volgende: op 29 april trokken bij Voorne in de avonduren veel Noordse Sterns langs 17-20 uur: 387+600+155 N. De dag erop vond in de vroege ochtend aan de Hbz. massale doortrek plaats: 5-9u 440+653+585+233 N. Op Texel vlogen pas op 30 mei de meeste Noordse Sterns voorbij: 127 N in 3 uur.

Op de volgende dagen werd het grootste deel van de langsttrekkende 'dieven' als Visdief opgeschreven: 2 mei 277+131+242 +507+425+584 N en 14-16u 735+485 N Hbz

9 mei 605 N in 1 uur Schev.

14 mei 666 N in 2 uur Schev.

15 mei 5-10u 251+137+376+78+65 N Schev.

★ Grote Stern - *Sterna sandvicensis*

De eerste Grote Sterns werden gezien op 8 maart (12 Hbz), 13 maart (1 Z Castr), 21 maart (2 N Texel) en 24 maart (3 N Schev.). Terwijl aan de Hollandse kust de meeste Grote Sterns nog naar noord vlogen, begon op Texel alweer het heen en weer gevlieg van fouragerende Grote Sterns. Regelmatig reikten de uurtotalen op Texel en Vlieland hierbij tot boven de 100 exemplaren: 7 mei 585 Z, 303 N Texel

28 mei 350 Z, 150 N in 1 uur Vlie.

Ook bij Huisduinen was dit het geval, waarschijnlijk waren ook deze vogels afkomstig van de broedkolonie op de Schorren van Texel (23 apr 47 Z, 309 N in 4 uur), terwijl bij Schouwen langsvliegende Grote Sterns (tot 648 N in 2 uur op 29 mei) afkomstig moeten zijn van broedplaatsen in de directe omgeving. Gerichte doortrek van veel geringere omvang werd gezien op: 19 apr 242 N in 5 uur Hbz.

22 apr 174 N in 2uur M'vlakte

★ Dwergstern - *Sterna albifrons*

Nadat de eerste Dwergsterns waren gezien bij de Hbz. (op 12 apr 4 N), Scheveningen (14 apr 4 N) en als laatste Texel (24 apr 1 N), volgde doortrek aan vooral de Noord-hollandse kust op de volgende dagen:

24 apr 8-12u 24+34+49+32 N Hbz.

28 apr 132 N in 2 uur Huisduinen

30 apr 5- 9u 25+101+72+16 N Hbz.

2 mei 6-15u 22+16+15+4+35+64+46 N Hbz.

8.11. Alkachtigen - *Alcidae*

★ Alk/Zeekoet - *Alca torda/Uria aalge*

Aan de Zuidhollandse kust werden in januari behoorlijke aantallen 'alk/zeekoeten' waargenomen. Bij IJmuiden waren op 10 januari 16 Zeekoeten (grotendeels olieslachts-offers) aanwezig. Halverwege deze maand vlogen bij Scheveningen de meeste exemplaren langs: 16 jan 54 Z in 3 uur

17 jan 29 Z in 3 uur

Op Texel en de Hbz. was 30 januari de beste dag:

42 Z, 13 N en 6 tp in 2 uur Texel (en op 31 jan 31 Z, 4 N in 3 uur)

9 Z, 37 N en 17 tp in 5 uur Hbz.

Uit juni werden 'alk/zeekoeten' gemeld van Texel (2x) en de Hbz. (2x).

Alken werden zelden herkend, slechts 6 waarnemingen (jan 4, feb 1 en mrt 1).

★Papegaaiduiker - *Fratercula arctica*

15 jan 1 Z Hbz.

30 jan 5 N Hbz.

★Kleine Alk - *Alle alle*

29 jan 1 tp Hbz.

★Zwarte Zeekoet - *Cheppus grylle*

5 mrt 1 N Hbz. (niet aanvaard)

10 apr 1 N Hbz. (in behandeling CDNA)

8.12. Stootvogels - *Accipitridae*, *Pandionidae*, *Falconidae* en *Strigidae*

★Wespendief - *Pernis apivorus*

4 juni 1 Z Texel

★Rode Wouw - *Milvus milvus*

16 jan 1 Z Hbz (10.30-11.30) en 1 Z IJmuiden (14.30)

★Bruine Kiekendief - *Circus aeruginosus*

Gemeld uit april (10x) en uit mei (26x)

★Blauwe Kiekendief - *Circus cyaneus*

Waarnemingen betreffende 1 exemplaar kwamen uit januari (7), februari (1), maart (1), april (2) en mei (3).

★Sperwer - *Accipiter nisus*

Naast 1 waarneming van Scheveningen (8 mei), 5 maal gezien bij Huisduinen (2 uit april en 3 uit mei (13 mei 2 N)).

★Buizerd - *Buteo buteo*

Drie januari-waarnemingen (Schev., Castr. en Texel), verder steeds 1 melding uit februari, maart, april en mei.

★Ruigpootbuizerd - *Buteo lagopus*

9 jan 1 N Hbz.

★Visarend - *Pandion haliaetus*

30 apr 1 N Hbz (7-8u) en 1 N Texel (15-16u) 15 mei 1 landinwaarts Schev.

★Torenvalk - *Falco tinnunculus*

Gezien in januari, maart, april (5x) en mei.

★Smelleken - *Falco columbarius*

Waarnemingen uit januari (1), maart (1), april (3) en mei (2)

★Boomvalk - *Falco subbuteo*

In april op 3 verschillende dagen steeds 2 exemplaren bij Scheveningen, daarnaast meiwaarnemingen van de Hbz. en Scheveningen.

★Slechtvalk - *Falco peregrinus*

12 mrt 1 tp Maasvlakte

★Ransuil - *Asio otus*

15 apr 1 0 Hbz.

★Velduil - *Asio flammeus*

16 apr 1 0 IJmuiden

★Meerkoet - *Fulica atra*

Tot in maart verbleven er Meerkoeten bij een aantal telposten. Op 20 januari waren bij Scheveningen 113 exx., bij IJmuiden op 16 januari 60 exx. en bij de Hbz. 45 exx. aanwezig.

8.13. Zeezoogdieren - *Phocidae*

★Gewone Zeehond - *Phoca vitulina*

1 jan 1 tp Schev.	15 jan 1 Z, 1 tp Texel	26 feb 1 Z Texel
9 jan 1 tp Texel	7 feb 1 Z Texel	27 feb 1 N Texel
10-24 jan 2 tp IJm.	13 feb 1 tp Texel	28 feb 1 tp Texel
10 jan 1 N Texel	14 feb 1 tp Hbz.	

★Walrus - *Odobenus rosmarus*

23 mrt 1 tp Huisduinen.