

6. Korte bespreking per soort.

6.1. Duikers - Gaviidea

-Roodkeel/Parelduiker - *Gavia stellata/arctica*

In jan en feb vlogen aan de Hbz soms vrij grote aantallen 'duikers' langs; onder meer 5 jan 127 N in 2 uur en 10 feb 155 N in 3 uur. Langs de Zuidhollandse kust werden veel minder duikers gezien, terwijl in het Waddengebied weliswaar vrij veel duikers aanwezig waren (b.v. 25 feb: 31 Z, 48 N en 94 tp. in 1 uur, Texel), maar hier is de eerste twee maanden te weinig geteld om over het voorkomen in dit deelgebied uitspraken te doen.

Noordwaartse trek begon langs de Noordhollandse kust al begin mrt en de beste trekdag werd genoteerd op 11 mrt:

Hbz 210 N in 7 uren

Castr 62 N in 2 uren

In apr lagen de aantallen bij deze telposten lager dan in mrt, de beste dag in apr was de 10e: 51 N in 4 uren, Hbz. Op Texel werd echter in deze maand de sterkste trek vastgesteld: 17 apr 55 N in 2 uren.

Tot in de laatste week van mei trokken nog 'duikers' langs in noordelijke richting bij de Hbz en Texel. Uit jun kwamen nog 6 meldingen van 'duikers' binnen (4 van Hbz, 1 van Huisduinen en van Texel).

De meeste Roodkeelduikers werden gezien bij Texel (b.v. 17 apr 20 N), ook werden hier dit voorjaar de meeste Parelduikers herkend. Het hoogste uurtotaal voor de Parelduiker bedroeg 4 exx. (op 12 apr en 19 mei aan de Hbz en 21 apr op Texel). De laatste Parelduiker werd op 3 jun waargenomen (Hbz) en de laatste Roodkeelduiker op 1 jun bij Texel. De verhouding Parelduiker:Roodkeelduiker was:

Waddengebied 1 : 9,8

Noord-Holland 1 : 3,8

Zuid Holland 1 : 10,4

-IJsduiker - *Gavia immer* (CDNA)

25 jan IJm 1 2ekj tp. 11 feb IJm 1 2ekj tp.

'ijsduiker/geelsnavelduiker' - *Gavia immer/adamsii*

12 jan Hbz 1 Z 19 mrt Castr 1 N

6.2. Futen - *Podiceps*

-Dodaars - *Tachybaptus ruficollis*

13 apr Hbz 2 tp. 29 apr Hbz 1 tp.

23 apr Hbz 2 tp. 07 mei Hbz 1 tp.

-Fuut - *Podiceps cristatus*

De meeste Futen werden waargenomen in jan en feb, met de grootste aantallen ditmaal aan de Noordhollandse kust. Enkele goede dagen waren:

02 jan Hbz 1213 Z in 2 uren

Castr 849 Z in 2 uren

05 jan Schev 619 Z in 1 uur

25 jan IJm 870 N en 250 tp in 1 uur

11 feb Schev 385 N in 2 uren

Hbz 1008 N in 4 uren

Huisduinen 582 N in 2 uren

Nadien liepen de aantallen Futen sterk terug. In mei werden bij IJmuiden nog kleine groepjes Futen gezien (max 16 tp. op 13 mei), die vermoedelijk late doortrekkers betroffen.

-Roodhalsfuut - *Podiceps grisegena*

Langs de hele kust werden tamelijk weinig Roodhalsfuten gezien. Aan de Hbz vond in april enige doortrek plaats: 12 apr Hbz 18 N in 5 uren

Opvallend was verder de groep van 15 Roodhalsfuten in prachtkleed bij IJmuiden op 6 mei; op 13 mei waren daar nog 4 exemplaren aanwezig.

-Kuifduiker - *Podiceps auritus*

De meeste Kuifduikers werden in apr gezien aan de Hbz:

12 apr Hbz 9 N in 3 uren

26 apr Hbz 4 N in 1 uur

-Geeorde fuut - *Podiceps nigricollis*

Weinig waargenomen, de meeste op 30 mrt bij Schev: 3 tp. Ongedetermineerde 'kleine futen' werden vooral opgemerkt in apr aan de Hbz: 10 apr 14 N.

6.3. Stormvogelachtigen - *Procellariidea*

-Noordse Stormvogel- *Fulmarus glacialis*

In jan werd deze soort tamelijk regelmatig waargenomen langs de Noord- en Zuidhollandse kust, ondermeer op 4 jan 6 Z en 1 N, West-Kap; 8 jan 6 Z, Schev en 8 Z en 1 N Hbz; 15 jan 1 Z en 8 N Hbz. Onder de exemplaren gezien aan de Hbz bevonden zich 5 gekleurde vogels (3 DD en 2 D). Uit de overige maanden is slechts één waarneming vermeldenswaardig: 11 mei Schev 68 N in 2 uren achter een vissersboot, hierbij was één donker exemplaar.

-Gauwe pijlstormvogel - *Puffinus griseus*

07 jan Hbz 1 N

-Noordse pijlstormvogel - *Puffinus puffinus*

Van deze soort werd in jun weer een omvangrijke noordwaartse verplaatsing opgemerkt, (cf. Camphuijsen & van Dijk, 1983) en ook deze keer beperkte dit verschijnsel zich tot de kust van Noord-Holland. Helaas zijn niet alle uurtotaalkaarten van 23 jun ingestuurd, zodat het totaal van die dag te laag is.

22 jun Egmond 7 Z en 7 N in 3 uren

23 jun Hbz 73 N in 9 uren (slechts 1 N bij Castr)

24 jun Castr 4 N in 2 uren

Buiten jun werd de Noordse Pijlstormvogel nog twee maal waargenomen:

12 jan Hbz 1 Z

28 mei Texel 1 N

-Vaal Stormvogeltje - *Oceanodroma leucorhoa*

04 jan West-Kap 1 Z en 1 N (mogelijk hetzelfde ex.)

14 jan Bergen 2 Z

6.4. Jan van Gent - *Sula bassana*

De Jan van Gent werd in jan vooral waargenomen aan de Zuidhollandse en Zeeuwse kust o.m. op:

03 jan Schev 17 Z in 1 uur

West-Kap 13 Z in 3 uren

In de daaropvolgende maanden vlogen aan de Noordhollandse kust de meeste exemplaren langs, maar het duurde tot de laatste week van jun voordat aantallen van betekenis gezien werden:

23 jun Castr 48 N in 2 uren

Hbz 157 N in 13 uren

25 jun Hbz 54 N in 3 uren

Opvallend hierbij was het grote aandeel 1e jaars vogels dat aan de Hbz werd genoteerd, op de 23e was 37,6% 1e jaars, op de 25e zelfs 85,2%.

6.5. Aalscholvers - *Phalacrocoracidae*

-Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*

De meeste Aalscholvers werden weer gezien bij Schev, maar de grootste groepen passeerden ditmaal bij de Hbz: 27 apr 130 Z in 3 uren
Het hoogste uurtotaal bij Schev bedroeg 36 op 25 apr.

-Kuifaalscholver - *Phalacrocorax aristotelis*

05 feb Schev 1 tp.

04 mrt Hbz 1 Z

11 feb IJm 1 tp.

08 mei Schev 1 N

6.6. Reigers en Lepelaars - *Ardeidea* en *Plataleidea*

-Kwak - *Nycticorax nycticorax*

30 apr Schev 1 ad. uit zee

-Blauwe Reiger - *Ardea cinerea*

Doortrek vond vooral plaats bij de posten in Zuid-Holland, met de meeste exx. op 12 maart:
Schev 11 N in 1 uur Katwijk 31 N in 1 uur

-Lepelaar - *Platalea leucorodia*

13 mrt	Schev	2 N	12 mei	Hbz	3 Z
28 apr	Schev	2 N	13 mei	Hbz	1 N
29 apr	Schev	2 N	27 mei	Schev	2 N

6.7. Eendachtigen - *Anatidea*

-Knobbelzwaan - *Cygnus olor*

De meeste waarnemingen kwamen uit mrt en vooral mei, met het hoogste aantal op 31 mei (Hbz 12 Z).

-Wilde Zwaan - *Cygnus cygnus*

11 mrt	Schev	1 Z	25 mrt	Schev	1 Z
12 mrt	Schev	23 N			

-Kleine Zwaan - *Cygnus columbianus bewickii*

Drie jan waarnemingen (o.m. 2 jan Schev 8 Z) één uit feb en vier mrt waarnemingen. Beste dag 25 mrt Texel 22 N.

-Rietgans - *Anser fabalis*

01 feb	Schev	12 N	24 mrt	Schev	5 N
20 mrt	Schev	30 N	14 apr	Schev	75 N

-Kleine Rietgans - *Anser brachyrhynchus*

13 feb Schev 6 Z

-Kolgans - *Anser albifrons*

21 jan	IJm	295 N	10 mrt	Hbz	10 N
17 feb	Schev	10 Z	22 mrt	Schev	12 N

-Gauwe Gans - *Anser anser*

De grootste groepen Gauwe Ganzen werden gezien in feb en mrt:

17 feb	Schev	270 Z in 2 uren
18 feb	Schev	240 N in 1 uur
20 mrt	Schev	67 N in 1 uur
	Castr	49 N in 1 uur

-Indische gans - *Anser indicus*

06 mei Texel 1 N

-Canadese gans - *Branta canadensis*

18 feb	Hbz	22 Z	13 mei	Hbz	1 N
13 mrt/25 apr	Schev	1 tp	23 jun	Schev	1 tp
06 mei	IJm	1 Z			

-Brandgans - *Branta leucopsis*

In jan en feb een drietal grote groepen:
21 jan IJm 360 N 17 feb Schev 50 N
12 feb Schev 130 N
De laatste waarneming werd op 24 apr gedaan te Schev, 13 N.

-Rotgans - *Branta bernicla*

Gedurende jan en feb werden nog maar weinig Rotganzen gezien. Doortrek kwam in mrt langzaam op gang en bereikte zijn hoogtepunt pas eind mrt en in de eerste 2 weken van apr, hetgeen later is dan 1983 toen rond half mrt reeds sterke trek plaats had (Platteeuw, 1984). Opvallend dit voorjaar waren de kleine aantallen Rotganzen welke bij de telposten ten zuiden van IJm werden gezien. De noordwaartse trek was het sterkst op:

31 mrt	Hbz	2248 N in 7 uren
04 apr	Hbz	1308 N in 4 uren
10 apr	Hbz	1680 N in 6 uren

Eind mei en begin jun vond weer de vrijwel jaarlijks vastgestelde trek golf plaats, dit keer waren de aantallen echter aanzienlijk hoger dan gewoonlijk. Langs de hele kust werden groepen Rotganzen gezien:

26 mei	Schev	96 N in 2 uren
31 mei	Hbz	1035 N in 2 uren
01 jun	Texel	86 N in 1 uur
05 jun	Hbz	1296 N tijdens dagtelling

-Nijlgans - *Alopochen aegyptiacus*

Vooraf in apr waargenomen, daarnaast nog 1 mei waarneming. De meeste exemplaren op:

11 apr	Schev	9 Z	28 apr	Hbz	13 N
25 apr	Huisd	5 N			

-Bergeend - *Tadorna tadorna*

Begin jan werd vooral bij Schev een zuidwaartse verplaatsing geregistreerd: 04 jan 203 Z in 4 uren.

Doortrek in noordelijke richting begon rond half feb aan de Noordhollandse kust, in mrt passeerden de meeste Bergeenden. Op Texel en in Zuid-Holland lagen de aantallen veel lager. De beste dagen waren:

10 mrt	Hbz	201 N in 6 uren
12 mrt	Castr	157 N in 2 uren

Tot half mei hield de doortrek aan, in deze periode betrof het vooral onvolwassen vogels:

10 apr	Hbz	74 N in 3 uren
05 mei	Hbz	81 N in 3 uren

Enige ruitrek werd genoteerd in jun, de grootste aantallen vlogen langs op 1 jul:

Schev	39 N in 1 uur; Hbz	85 N in 1 uur;
Huisd	63 N in 1 uur	

-Smient - *Anas penelope*

Aankankelijk vlogen de meeste Smienten nog naar Z:

22 jan	Hbz	81 Z in 2 uren
	Schev	74 Z in 2 uren

In feb was de overheersende vliegrichting alweer noord. Bovendien hield zich op 17 feb bij Schev een groep van 480 Smienten op. Sterke doortrek vond plaats in mrt en apr langs de Hollandse kust:

11 mrt	Hbz	538 N in 7 uren
08 apr	Hbz	357 N in 4 uren
09 apr	Schev	214 N in 3 uren
	Huisd	267 N in 1 uur

10 apr Hbz 519 N in 8 uren

Twee late waarnemingen werden gedaan op 20 mei (1 N) en 8 jun (5 N) aan de Hbz.

-Krakeend - *Anas strepera*

In de periode half mrt-half jun werden regelmatig kleine aantallen Krakeenden voor de kust gezien, het meest tussen 10 en 30 apr. Aan de Noordhollandse kust waren de aantallen het hoogst en hier kwam ook het enige uurtotaal van meer dan 5 exx. vandaan:
14 apr Hbz 20 N

-Wintertaling - *Anas crecca*

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Pijlstaart - *Anas acuta*

Bij Schev vlogen op 17 feb vrij veel Pijlstaarten Z: 121 in 1 uur. Vooraf bij de telposten langs de Noordhollandse kust werd noordwaartse trek vastgesteld, de beste dagen waren:

11 mrt	Hbz	133 N in 7 uren
21 apr	Castr	51 N in 1 uur

-Wilde eend - *Anas platyrhynchos*

De meeste Wilde Eenden werden gezien in mrt en apr, vooral langs de Noordhollandse kust trok de soort regelmatig maar met hooguit enkele tientallen exemplaren per uur noordwaarts.

-Zomertaling - *Anas querquedula*

De eerste waarneming werd gedaan op 12 mrt (5 N, Katwijk) daarna passeerden met zekere regelmaat Zomertalingen, vooral in apr veelal paarsgewijs. De beste dag was echter 1 mei: Hbz 25 N in 6 uren. De verhouding m : v bedroeg 1 : 0,7.

-Slobeend - *Anas clypeata*

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Tafeleend - *Aythya ferina*

Doortrek werd vastgesteld in mrt en apr, maar slechts op één dag werden wat grotere aantallen genoteerd:
09 apr Schev 54 N in 1 uur

-Kuifeend - *Aythya fuligula*

Kuifeenden werden niet veel gezien, slechts twee uur-totalen reikten tot boven de 24 exx.:
11 mrt Texel 25 N 10 apr Schev 28 N

-Toppereend - *Aythya marila*

De meeste Toppereenden trokken langs aan de Hbz in mrt en apr, maar de aantallen bleven laag. De beste dag was 31 mrt met 52 N in 4 uren (Hbz). Vermeldenswaard zijn verder drie jun waarnemingen n.l.:
05 jun Hbz 5 N 24 jun Castr 3 tp
08 jun Egmond 3 N

-Eidereend - *Somateria mollissima*

Bij Texel werden de meeste Eiders waargenomen, tot begin mei verbleven daar flinke groepen ter plaatse, het grootste aantal werd genoteerd op 26 mrt: 192 tp (107 v. en 85 m.). Af en toe traden hier ook zuidwaarts gerichte verplaatsingen op, vooral in mrt:
25 mrt Texel 530 Z (256 v. en 267 m.) in 3 uren
Langs de Hollandse en Zeeuwse kust hielden zich Eiders op bij o.m. Huisd (max 200 tp op 13 apr) en IJm (max 100 tp in jan en feb). Voorts vond met name aan de Noordhollandse kust noordwaartse trek plaats in mrt en apr:
31 mrt Schev 77 N in 4 uren
Hbz 145 N in 5 uren
13 apr Hbz 223 N in 5 uren

-IJseend - *Clangula hyemalis*

In de wintermaanden werden af en toe IJseenden gezien met hooguit twee vogels per waarneming. Enige doortrek werd geregistreerd in apr bij de Hbz (de meeste op 4 apr 6 N) en in mindere mate op Texel. Op 1 apr verbleven bij Schouwen 4 IJseenden ter plaatse. De laatste waarnemingen werden gedaan op 13 mei: IJmuiden 1 tp.

-Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*

Het voorkomen van de Zwarte Zeeëend viel dit voorjaar min of meer uiteen in twee delen. Het begon met tamelijk grote aantallen in jan en feb welke uitsluitend bij Schev werden gezien. In jan hielden zich max 260 Zwarte Zeeëenden op voor deze telpost (op de 14e), in feb namen de aantallen sterk toe, met op de 9e 1500 tp en 2032 N in 3 uren. Hierna was het gedaan met grote aantallen Zwarte Zeeëenden voor de kust van Zuid-Holland, want van voorjaars trek in mrt en apr werd in dit deelgebied nauwelijks iets gemerkt.

Sterke noordwaartse trek werd wel gezien langs de Noordhollandse kust en op Texel, waar de eerste twee maanden maar weinig Zwarte zeeëenden waargenomen waren. Eind mrt kwam de trek goed op gang met op 27 mrt 2107 N in 2 uren op Texel en op 31 mrt 3143 N in 4 uren bij de Hbz. De eerste twee weken van apr gaven de sterkste doortrek te zien:

07 apr Hbz 4191 N in 3 uren
Texel 3654 N in 4 uren
10 apr Hbz 5956 N in 8 uren

Op 12 en 13 apr vlogen aan de Hbz grote aantallen zowel naar zuid als naar noord; op de 13e: 2482 Z en 3236 N in 4 uren. Ook verbleven op deze dag bij Huisd 650 exx. tp en vond bij Texel alleen trek in noordelijke richting plaats (2340 N in 4 uren).

Begin mei volgde nog een klein trek golfje aan de Hbz:
03 mei Hbz 1182 N in 2 uren.
Bij Huisd hielden zich op 11 mei nog 500 exx. op.

-Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*

Evenals bij de Zwarte Zeeëend het geval was werden in de eerste maanden van het jaar ook veel Grote Zeeëenden bij Schev gezien:

17 jan Schev 218 Z en 70 tp in 2 uren
09 feb Schev 143 N en 100 tp in 3 uren

In deze periode vlogen elders langs de kust nauwelijks exemplaren van deze soort voorbij. Doortrek in noordelijke richting vond voornamelijk plaats aan de Hbz in apr, maar de aantallen bleven aan de lange kant (vgl. den Ouden, 1984). De beste dagen waren:
10 apr Hbz 161 N in 2 uren
12 apr Hbz 447 N in 5 uren
Opmerkelijk waren verder de groepen Grote zeeëenden welke in jun bij Egmond verbleven. Op de 8e jun waren daar 93 exx. aanwezig en op de 15e werden daar zelfs 115 vogels geteld.

-Brilduiker - *Bucephala clangula*

Enige noordwaartse trek trad op in mrt en apr bij zowel de Hbz als Schev:
09 mrt Hbz 19 N in 2 uren
18 mrt Schev 13 N in 1 uur
De laatste Brilduiker werd gezien op 3 mei (Hbz 1 N).

-Nonnetje - *Mergus albellus*

05 feb Schev 2 N 20 mrt St.Maartenszee 1 N
18 feb Hbz 42 N 25 mrt Hbz 1 N
19 feb Hbz 4 N

-Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*

Aan de Noordhollandse kust en dan met name de Hbz werd bijzonder sterke doortrek van deze soort vastgesteld. Noord-Holland, alleen noordwaarts vliegende vogels:
jaar 1980 1981 1982 1983 1984
n. 1.989 1.415 3.682 1.980 3.912

In maart begon de trek in noordelijke richting, maar in de eerste twee weken van april passeerden de grootste aantallen. Enkele goede trekdagen waren:

08 apr Hbz 248 N (120 m. en 118 v.) in 7 uren
10 apr Hbz 337 N (85 m. en 113 v.) in 8 uren
12 apr Hbz 385 N (156 m. en 229 v.) in 5 uren

Uit jun kwamen nog 7 meldingen van Middelste Zaagbekken binnen, 3 van de Hbz (2e, 5e en 23e), 2 van Castr (24e en 29e) en 2 van Schev (22e en 24e).

-Grote Zaagebek - *Mergus merganser*

Voornamelijk in mrt langsvliegend in noordwaartse richting, verder was deze soort een schaarse verschijning. Het hoogste uurtotaal was 12 N bij Noordwijk op 7 mrt. De laatste Grote Zaagbekken werden gezien op 29 apr bij IJm (8 tp).

6.8. Steltlopers - *Charadriidae*

-Scholekster - *Haematopus ostralegus*

Dit voorjaar werden zeer veel Scholeksters waargenomen. Echter pas in gegin mrt zette de trek in en dan wel voornamelijk langs de NH-kust.

07 mrt Hbz 4 Z en 282 N in 7 uren
Noordw 177 N in 1 uur
11 mrt Hbz 10 Z en 318 N in 6½ uur
Castr 55 N in 2 uren

Gedurende de hele maand apr werden langs de Hollandse kust redelijke aantallen waargenomen met de grootste aantallen geteld op onderstaande dagen.

22 apr Texel 150 Z en 25 N in 5 uren
Hbz 340 Z en 162 N in 7 uren
IJm 136 Z, 100 N en 11 tp in 3 uren

Tenslotte kon half mei langs Schev nog enige (avond)-trek vastgesteld worden:

13 mei Schev 23 Z en 212 N 17.00-20.00 uur
14 mei Schev 55 Z en 259 N 05.00-11.00 uur

-Kievit - *Vanellus vanellus*

In de laatste week van januari werd in NH enige vorst-trek vastgesteld:

22 jan Huisd 83 Z in 2 uren
Hbz 212 Z in 3 uren

In Schev werd hier nog een restje van gezien, te weten 59 Z in 2 uren. Uitzonderlijke noordwaartse trek vond plaats op 12, 14 en 20 mrt en in mindere mate op 24 mrt,

waarbij vooral in ZH zeer hoge uurtotalen werden genoteerd. De beste uren waren:

12 mrt Schev 151 N 07.00-08.00 uur
Katwijk 3182 N 11.00-12.00 uur

14 mrt Schev 424 N 09.00-11.00 uur

20 mrt Schev 123 N 09.00-10.00 uur

In NH werden op 12 mrt ook in Castr in 2 uren 888 exx. noord gezien. Eind mei/begin jun trokken aan de Hbz redelijke aantallen weer zuidwaarts.

-Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*

Dit voorjaar zijn zeer weinig Bontbekplevieren gezien. De meeste werden dan nog in ZH gezien, waar de piek half mei viel. In NH werden slechts ongeveer de helft van het in ZH waargenomen aantal vogels gezien. Hier viel een kleine piek in mrt en een iets grotere piek eind apr/begin mei. De beste uren waren:

11 mei Katwijk 22 N 08.00-09.00 uur

Schev 31 N 06.00-07.00 uur

14 mei Noordw 65 N 06.00-07.00 uur

Schev 24+24 N 06.00-08.00 uur

28 apr Huisd 28 N 07.00-08.00 uur

01 mei Hbz 22 N 05.00-06.00 uur

-Kleine plevier - *Charadrius dubius*

27 apr Schev 3 N 01 jun Bergen 2 N

10 mei Schev 1 N

-Strandplevier - *Charadrius alexandrinus*

Na de eerste waarneming op 8 apr (2 tp, IJm) werden in apr nog 9 Strandplevieren gezien, voorts nog 3 mei waarnemingen (2 keer N, Schev en 2 tp, Katwijk).

-Zilverplevier - *Pluvialis squatarola*

De trek van de Zilverplevier piekte in de eerste drie weken van mei, met de nadruk op de eerste en de derde week. In ZH werden duidelijk meer vogels waargenomen dan in NH. De beste uren waren:

01 mei Hbz 184 N 05.00-06.00 uur

02 mei Schev 250 N 06.00-07.00 uur

06 mei Schev 111+101 N 06.00-08.00 uur

Noordw 148 N 07.00-08.00 uur

IJm 182 N 07.00-08.00 uur

Hbz 135 N 08.00-09.00 uur

10 mei Schev 173 N 05.00-06.00 uur

11 mei Schev 101 N 07.00-08.00 uur

13 mei Egmond 112 N 10.00-11.00 uur

14 mei Schev 185+67+46+103 N 06.00-10.00 uur

Hbz 220 N 20.00-21.00 uur

15 mei Castr 283 N 18.00-19.00 uur

-Goudplevier - *Pluvialis apricaria*

In de winter kon slechts op één dag vorsttrek van deze soort waargenomen worden, n.l. op:

22 jan Schev 1745 Z 09.00-11.00 uur

Hbz 93 Z 09.00-12.00 uur

Verder kon alleen half mei langs de ZH-kust enige trek genoteerd worden (140 N in 1 uur te Schev, 15 mei).

-Morinel plevier - *Eudromias morinellus*

30 apr Maasvlakte 6 tp. 02 mei Schev 1 N

-Kanoetstrandloper - *Calidris canutus*

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Bonte strandloper - *Calidris alpina*

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Drieteenstrandloper - *Calidris alba*

Ter plaatse aanwezige Drieteenstrandlopers werden alleen in ZH en in het Waddengebied in aantallen van enige betekenis vastgesteld, te weten op 19 jan 68 exx. te Schev, op 25 mrt 38 exx. in Monster, op 11 mrt 149 op Texel en op 13 en 23 apr resp. 137 en 104 exx. op Texel. Vanaf eind apr werden vrijwel geen Drieteentjes meer t.p. gezien. Trek werd vastgesteld in de eerste

helft van mrt (alleen NH) met enkele uren van 20 tot 40 vogels naar N en eind apr/begin mei met enkele tientallen vogels (soms tot meer dan 100) per uur naar N in alle drie de deelgebieden. De beste uren waren:

10 mei Schev 130 N 05.00-06.00 uur

13 mei Noordw 104 N 07.00-08.00 uur

14 mei 110 N Huisd 110 N 06.00-07.00 uur

Eind apr werden op Texel ook tot 60 exx. per uur naar Z waargenomen. De laatste Drieteentjes werden gezien op 21 mei (ZH), 5 jun (NH) en 31 mei (Wadden).

-Kleine Strandloper - *Calidris minuta*

25 apr Schev 2 N

-Krombekstrandloper - *Calidris ferruginea*

30 mei Hbz 1 N

-Paarse Strandloper - *Calidris maritima*

Van deze soort konden vrijwel alleen exemplaren ter plaatse verblijvend genoteerd worden. Opvallend was het aantal van 100 exx. tp op 24 feb te Huisd. Vanaf half apr tot in mei waren continue exemplaren langs de Zuidhollandse kust te vinden, met als maxima 62 tp op 12 mrt te Schev en 30 tp op 3 apr te IJm.

-Kemphaan - *Philomachus pugnax*

Op 22 jan vlogen eerst 8 exx. Z bij de Hbz, maar vrij sterke trek noordwaarts vond plaats in mrt en apr langs de kust van ZH. Enkele goede trekdagen:

14 mrt Schev 64 N 20 mrt Noordw 53 N

20 mrt Schev 37 N 27 apr Schev 23 N

Uit mei kwamen nog 3 waarnemingen, met op 14 mei nog 9 N te Schev en 11 N te Noordw.

-Watersnip - *Gallinago gallinago*

De vorst van 21-22 jan bracht enige Watersnippen boven zee bij de Hbz. Verder vlogen er vooral in mrt af en toe enkele Watersnippen naar het noorden langs de Hollandse kust. Op 24 mrt was er bij de Hbz een opmerkelijke zuidwaartse beweging: 61 Z in 2 uren.

-Houtsnip - *Scolopax rusticola*

22 jan Schev 1 N 25 apr Schev 1 N

09 apr Schev 1 uit zee 26 apr Schev 1 N

-Grutto - *Limosa limosa*

Zoals gebruikelijk

Zoals gebruikelijk werd alleen aan de Zuidhollandse kust iets van echte Grutto trek opgemerkt, en wel tussen 10 en 25 mrt, met als beste dagen 18 mrt met 176 N in 3 uren (Schev); 20, 21 en 24 mrt resp 56, 51 en 56 N (Schev). Op 26 apr vlogen nog 38 exx. langs bij IJm. In de overige deelgebieden kwamen de uurtotalen niet hoger dan 7.

-Rosse Grutto - *Limosa lapponica*

Zoals jaarlijks vastgesteld, werden alleen aantallen van betekenis gedurende eind apr/begin mei waargenomen. Ook van deze steltloperssoort werden vrijwel geen exemplaren vastgesteld langs de Waddenkust. Opvallend is dat deze trek golf veruit de grootste aantallen opleverde voor IJm en de NH-kust.

27 apr Hbz 1287 N 05.00-13.00 uur

28 apr IJm 1142 N 07.00-11.00 uur

Hbz 2139 N 05.00-13.00 uur

Huisd 430 N 07.00-10.00 uur

04 mei Huisd 1154 N 08.00-10.00 uur

06 mei IJm 1209 N 05.00-11.00 uur

Hbz 1165 N 05.00-12.00 uur

-Regenwulp - *Numenius phaeopus*

De eerste exemplaren werden in ZH op 13 apr, in NH op 2 en 19 mrt en in het Waddengebied op 21 apr waargenomen. In ZH werden de laatste weken van apr en de eerste twee van mei flinke aantallen noordwaarts gezien, terwijl in NH de piek wel in dezelfde periode viel, maar veel lager was. De beste uren waren:

21 apr Schev 45 N 06.00-07.00 uur
 25 apr Schev 86 N 07.00-08.00 uur
 Castr 87 N 13.00-14.00 uur
 28 apr Texel 41 N 17.00-18.00 uur
 10 mei Schev 49 N 06.00-07.00 uur
 11 mei Schev 87 N 06.00-07.00 uur
 49 N 13.00-13.30 uur
 12 mei Hbz 48 N 19.00-19.30 uur

-Wulp - *Numenius arquata*

De eerste verplaatsingen van deze soort vonden plaats op 10 en 11 feb, toen noordwaartse trek langs de Hollandse kust werd waargenomen.

10 feb Hbz 130 N in 2 uren
 11 feb Schev 238 N in 2 uren

Hierna kwamen de uurtotalen zelden boven de 20 uit. Alleen in mei werden sporadisch zowel langs de NH als de ZH kust meer dan 10 Wulpen in één uur waargenomen.

-Zwarte Ruiter - *Tringa erythropus*

Zoals gebruikelijk vrijwel niet langstrekkend gezien. In Schev werden op 30 apr van 06.00-07.00 uur 13 exx. naar N gezien, wat een absoluut topuur was.

-Groenpootruiter - *Tringa nebularia*

Deze soort werd alleen in ZH in aantallen van enige betekenis vastgesteld. De waarnemingen waren over de hele maand mei verdeeld, de piek viel in de derde week.

10 mei Schev 17 N 06.00-07.00 uur
 11 mei Schev 15+18 N 06.00-07.00/08.00-09.00 uur
 Katwijk 20 N 08.00-09.00 uur
 12 mei Schev 17 N 06.00-07.00 uur
 13 mei Schev 13+20+15 N 06.00-09.00 uur
 18+18 N 13.00-15.00 uur
 Noordw 14 N 07.00-08.00 uur
 14 mei Schev 28+21+14+27 N 06.00-10.00 uur
 Noordw 26 N 06.00-07.00 uur

-Tureluur - *Tringa totanus*

In vergelijking met vorig jaar werden dit voorjaar vrijwel geen Tureluurs waargenomen. In ZH werden in totaal 1127 vogels naar N gezien, in NH zelfs maar 776 exx. De beste uren waren:

27 apr Hbz 85 N 05.00-06.00 uur
 01 mei Hbz 103 N 05.00-06.00 uur
 14 mei Schev 81 N 06.00-07.00 uur
 Hbz 90 N 20.00-21.00 uur
 20 mei Schev 129 N 06.00-07.00 uur

-Witgatje - *Tringa ochropus*

22 jan Hbz 2 Z 06 mei IJm 1 N
 25 apr Hbz 1 N Hbz 2 N
 28 apr IJm 1 N 17 mei Schev 1 N
 29 apr Schev 1 N

-Bosruiter - *Tringa glareola*

21 apr Huisd 1 N 13 mei Schev 1 Z

-Oeverloper - *Actitis hypoleucos*

Vrijwel niet waargenomen. Aantallen van enige betekenis werden uit ZH gemeld. Op 14 mei werden van 05.00-06.00 uur 33 exx. N en 31 exx. tp waargenomen. De meeste andere waarnemingen kwamen eveneens uit half mei.

-Steenloper - *Arenaria interpres*

In NH verbleven tot eind apr aanzienlijke aantallen Steenlopers tp (tot 175 in Huisd op 2 feb en 458 aan de Hbz op 10 mrt). In ZH werden als maxima in West-K 35, bij Monster 21, in Schev 6 en bij IJm 30 vogels vastgesteld. In het Waddengebied werd de soort niet tp vastgesteld. Doortrek werd vooral geregistreerd in de eerste twee weken van mei. Vooral in ZH ging het hierbij om redelijke aantallen. De beste uren waren:

12 apr Hbz 44+85 N 06.00-08.00 uur
 11 mei Schev 54+33 N 13.00-14.00/18.00-19.00 uur
 12 mei Schev 34 N 06.00-07.00 uur
 Noordw 36 N 06.00-07.00 uur
 Huisd 71 N 06.00-07.00 uur
 14 mei Huisd 70 N 09.00-09.30 uur

-Kluut - *Recurvirostra avosetta*

De eerste Kluten werden gezien op 18 feb te Schev (7 exx. Z). Op 12 mrt kon weer zo'n trek golfje vastgesteld worden met in Schev 37 N, Hbz 47 N en Huisd 30 N. Hierna werden nog regelmatig in kleinere aantallen Kluten gezien tot half mei.

-Bokje - *Lymnocyptus minimus*

08 mrt Hbz 1 N

6.9. Jagers - *Stercorariidae*

-Grote Jager - *Stercorarius skua*

Opvallend veel waarnemingen uit jan, te weten 3x in ZH (1e, 15e en 30e) en 6x in NH (3e, 7e, 14e (2 exx.), 15e en 17e) verder nog in feb (8e, 1 Z Schev), mrt (8e, 1 N Huisd en 1 N Hbz) en jun (24e, 1 Z Castr). De feb waarneming was de tweede in de C.v.Z. historie, de eerste werd in 1983 waargenomen.

-Kleine Jager - *Stercorarius parasiticus*

Nadat in jan tijdens stormachtig weer enkele Kleine Jagers waren gezien (ZH: 2 Z en 1 N; NH: 2 Z, 1 N en 1 tp) duurde het tot 31 mrt (1 Z, Hbz) tot de eerste voorjaarswaarneming werd gedaan. Ook hierna bleef deze soort met name in ZH (slechts 2 meldingen) een schaarse verschijning. Er werd slechts zelden meer dan 1 ex. per dag waargenomen. De beste dag viel in jun: 23 jun Hbz 2 Z, 3 N en 2 tp in 13 uren

6.10. Meeuwen en Sterns - *Laridae*

-Zwartkopmeeuw - *Larus melanocephalus*

In de haven van Schev overwinterde weer een exemplaar, mogelijk hadden vier mrt waarnemingen bij Schev betrekking op deze adulte vogel. In apr en mei werden ook elders Zwartkopmeeuwen opgemerkt. Behalve volwassen exemplaren werden ook 2e en 3e kj. vogels gezien.

Meerdere exx. werden waargenomen op:
 18 apr Schev 2 ad. tp 10 mei Schev 2 ad. N
 22 apr Hbz 2 ad en 1 2ekj tp.
 06 mei Hbz 2 ad. Z 16 mei Schev " ad. N

-Dwergmeeuw - *Larus minutus*

In jan werden langs de hele kust Dwergmeeuwen waargenomen, maar bij West-K vlogen de meeste vogels voorbij (03 jan 45 Z in 4 uren). Doortrek in noordelijke richting begon in de eerste week van apr (04 apr 312 N in 2 uren Hbz) en nam in de loop van de maand geleidelijk toe om in de laatste week van apr zijn hoogtepunt te bereiken. De aantallen aan de Hbz waren aanzienlijk groter dan die bij de telposten elders langs de kust, zoals blijkt uit onderstaand overzicht van de beste trekdagen:

26 apr IJm 404 N in 2 uren
 Hbz 1261 N in 8 uren (1129 adult)
 Huisd 223 N in 1 uur
 28 apr Schev 355 N in 4 uren (338 adult)
 Hbz 913 N in 6 uren (776 adult)
 29 apr Texel 303 N in 6 uren

Onvolwassen vogels kwamen voornamelijk door in mei:

12 mei Hbz 142 N in 4 uren (121 2e kj.)
 13 mei Hbz 168 N in 5 uren (156 2e kj.)
 De laatste trekbeweging werd vastgesteld bij Schev op:
 29 mei 91 N in 1 uur (90 adult)

-Kokmeeuw - *Larus ridibundus*

Enige zuidwzrtse trek van Kokmeeuwen werd op 22 jan geregistreerd aan de Hbz (847 Z in 5 uren). Reeds in feb begon de Kokmeeuw in noordelijke richting te trekken en in mrt was de doortrek op z'n sterkst, met vooral grote aantallen bij de telposten in ZH:

11 mrt Castr 308 N in 2 uren
 24 mrt Schev 2214 N in 1 uur
 Noordw 3200 N in 2 uren (2920 ad. en 280 2e kj)
 Merkwaardig genoeg deed zich in deze periode aan de Hbz en in mindere mate op Texel een zuidwaartse verplaatsing van volwassen vogels voor:
 25 mrt Hbz 599 Z in 3 uren
 Texel 116 Z in 3 uren

In de laatste week van apr vond weer enige noordwaartse trek plaats, waarbij het aandeel onvolwassen vogels aanzienlijk gestegen was in vergelijking tot de voorafgaande perioden.

22 apr Hbz 573 N in 7 uren (276 2e kj.)
Daarentegen hadden bij de laatste goede trekdag op 17 mei de volwassen vogels weer de overhand:
17 mei Hbz 382 N in 2 uren (292 adult)

-Stormmeeuw - *Larus canus*

Langs de Noordhollandse kust waren de aantallen Stormmeeuwen in jan, feb en mrt vrij klein. Bij Noordw verbleven in jan tot 300 exx. tp (07 jan) en vlogen daar op 24 mrt 240 N in 2 uren.

In apr was de doortrek het sterkst bij de Hbz en Castr:
10 apr Hbz 560 N in 5 uren (29 2ekj en 221 adult)
22 apr Hbz 911 N in 10 uren (364 2ekj. en 207 adult)
Waarbij het toenemend aandeel onvolwassen vogels in de loop van apr opvalt. In mei en jun liepen de aantallen Stormmeeuwen weer sterk terug.

-Kleine Mantelmeeuw - *Larus fuscus*

Verschillende jan waarnemingen van de Kleine Mantelmeeuw werden gedaan, waarvan vooral die van 3 jan bij Noordw opviel: 16 Z in 1 uur.

In feb nam het aantal Kleine Mantels langzaam toe, maar het duurde nog tot in mei voordat doortrek van betekenis werd vastgesteld, bovendien werd deze trek zelf alleen bij Schev opgemerkt:

8 mei Schev 38 Z, 494 N en 60 tp in 6 uren
11 mei Schev 146 N in 4 uren

In jun werden langs de hele Hollandse kust soms enkele tientallen vogels per uur genoteerd, bij Schev was geen overheersende vliegrichting aan te wijzen, aan de Hbz vloog het merendeel naar N.

-Zilvermeeuw - *Larus argentatus*

Geen systematische tellingen van uitgevoerd.

-Kleine Burgemeester - *Larus glaucooides*

14/21-2 Hbz 1 2ekj. tp 24 apr Schev 1 3ekj. N
18 apr IJm 1 2ekj. tp 14/15 mei Schev 1 2ekj. tp

-Grote Burgemeester - *Larus hyperboreus*

Enkele 2e kalenderjaar vogels verbleven enige tijd op dezelfde plaats:

03/19 jan Schev 1 tp
11/18 feb Hbz 1 tp
16/26 feb Schev 1 tp

Daarnaast kwamen meldingen van Grote Burgemeesters binnen van West-K (4 jan), Schev (3 en 25 mrt), Texel (20 mrt), Hbz (11 apr), Noordw (29 apr) en Huisd (15 mei).

Eén waarneming betrof een volwassen vogel (8 jan 1 Z, Schev), terwijl op 14 en 29 apr een hybride exemplaar werd gezien bij de Hbz.

-Grote Mantelmeeuw - *Larus marinus*

Alleen in jan en begin feb werden langs de hele kust veel Grote Mantelmeeuwen waargenomen, nadien konden nog maar weinig uren met meer dan 10 exx. genoteerd worden. De meeste Grote Mantelmeeuwen werden gezien op de volgende dagen:

04 jan Schev 100 Z in 3 uren
08 jan Texel 66 Z in 1 uur
15 jan Hbz 47 Z en 144 N in 6 uren
04 feb Huisd 120 tp

-Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*

Voor het zuidelijke deel van onze kust verbleven in het begin van het jaar meer Drieteenmeeuwen dan bij NH en op de Wadden. Met name bij West-K werden grote aantallen waargenomen. Enkele opmerkelijke dagen waren:

04 jan West-K 1400 Z, 450 N en 100 tp in 2 uren
06 jan Schev 384 Z, 11 N en 9 tp in 3 uren
08 jan West-K 1400 Z en 130 N in 2 uren

Midden jan nam ook het aantal Drieteenmeeuwen bij de telposten ten noorden van Schev (behalve op Texel) toe, zoals blijkt uit onderstaande dagtotalen:

14 jan Castr 188 Z en 133 N in 3 uren
Hbz 86 Z en 384 N in 5 uren
15 jan Noordw 187 Z en 24 N in 1 uur
Hbz 192 Z, 291 N en 67 tp in 6 uren

De laatste dag waarop flinke aantallen passeerden was 8 feb, met bij Schev 238 Z in 4 uren. Na deze dag werden langs de hele kust nog weinig Drieteenmeeuwen gezien. Van de op leeftijd gebrachte Drieteenmeeuwen was bij alle drie de deelgebieden het merendeel adult, de percentages 2ekj. vogels voor de drie deelgebieden verschilden niet wezenlijk:
Wadden 34,1 % 2ekj.
Noord-Holland 28,6 % 2ekj.
Zuid-Holland 33,7 % 2ekj.

-Lachstern - *Gelochelidon nilotica* (CDNA)

30 apr Castr 1 N 14 mei Texel 1 N

-Reuzenstern - *Sterna caspia*

01 jun Bergen 3 ad. N

-Grote Stern - *Sterna sandvicensis*

Het voorjaarstotaal van de Grote Stern in 1984 was het laagste sinds 1974, nadat ook al in 1983 in zowel voor-als najaar zeer weinig Grote Sterns waren gezien. Op 11 mrt werd de eerste vogel opgemerkt bij Castr, gevolgd door één bij de Hbz op de 19e. Op 25 mrt werden voor het eerst langs de gehele kust Grote Sterns opgemerkt. Trek in noordwaartse richting vond plaats in de derde decade van april, waarbij de uurgemiddelden in NH belangrijk hoger waren dan in ZH. Ook in het Waddengebied was het uurgemiddelde in deze periode hoog, maar hier werd ook veel richting Z gevlogen. Vanaf half mei zien we het bekende beeld van veel heen- en weer vliegende exemplaren in NH en vooral in het Waddengebied (Texel), waarbij echter in NH wel steeds meer vogels noordwaarts dan zuidwaarts gaan. De beste dagen waren:

25 apr Hbz 174 N in 4 uren
Texel 114 N en 38 Z in 3 uren
26 apr Hbz 329 N in 7 uren
27 apr Texel 315 Z en 56 N in 3 uren
12 jun Texel 113 Z en 17 N in 1 uur
17 jun Hbz 146 N en 33 Z in 3 uren
01 jul Texel 171 Z en 57 N in 1 uur

-Noordse Stern en Visdief - *Sterna hirundo/paradisaea*

Zowel het totaal aantal waargenomen exemplaren als de verdeling ervan over de verschillende deelgebieden is bij de 'noordse dief' de laatste vier jaar opmerkelijk constant. Het totale uurgemiddelde lag iets hoger dan voorgaande jaren.

De eerste 'noordse dieven' werden gezien op 24 mrt en 4 apr bij de Hbz (Visdief), op 6 apr bij Schev (Visdief) en op 7 apr bij Texel. Noordse Sterns werden het eerst opgemerkt op 12 apr bij de Hbz en op 21 en 22 apr bij IJm en Texel. In alledrie de deelgebieden kwam de trek opgang in periode 16 (half apr) en werden de hoogste uurgemiddelden bereikt in periode 17, met name in de periode 25-28 apr. Gedurende de hele maand mei was er vrij sterke dieventrek, waarbij de uurgemiddelden langs de Noordhollandse kust steeds het hoogst waren; na mei namen de aantallen vrij snel af.

In totaal werd 50,8% (n=66.334) van alle waargenomen 'noordse dieven' op soort gedetermineerd; hiervan was 7,2% Noordse Stern. De verhoudingen per deelgebied waren:

deelgebied	n.	% gedetermin.	N.Stern:Visdief
ZH + Zeeland	26.275	81,7	1 : 51,5
NH	35.050	32,1	1 : 5,3
Waddengebied	5.009	20,5	1 : 3,3

De hoogste uurgemiddelden en uurtotalen van de Visdief vielen samen met die van de ongedetermineerde 'noordse dieven', in periode 17. De meeste Noordse Sterns werden gezien in periode 21 en 22 (eind mei/begin jun). De beste dagen waren:

26 apr Hbz 3081 N in 9 uren (504 VD en 47 NS)
IJm 1387 N in 4 uren (107 VD en 112 NS)
Schev 1782 N in 5 uren (1731 VD en 1 NS)
27 apr Schev 1054 N in 4 uren (595 VD en 4 NS)
Hbz 2363 N in 8 uren (179 VD en 5 NS)
28 apr West-K 926 N in 4 uren
Schev 1149 N in 7 uren (1135 VD)
Hbz 2998 N in 10½ uur (790 VD en 189 NS)
11 mei Schev 1155 N in 8½ uur (allen Visdief)
02 jun Hbz 780 N in 2 uren (403 NS)

-Dwergstern - *Sterna albifrons*

Zie hiervoor de bespreking in hoofdstuk 5.

-Zwarte Stern - *Chlidonias niger*

Vergeleken met voorgaande jaren werd dit jaar een iets meer dan gemiddeld aantal Zwarte Sterns gezien. In jaren met veel oostelijke wind worden doorgaans de grootste aantallen gezien. Dit jaar was dat tot ± 15 mei het geval, daarna kwam de wind uit wisselende richtingen, vnl. WZW tot NNW. Dit verklaart waarschijnlijk ook het afwijkende doortrekverloop. Gemiddeld wordt de sterkste doortrek in de tweede en derde decade van mei waargenomen. De sterkste doortrek werd dit jaar eind apr gezien, in de periode met oostenwind, terwijl na half mei nauwelijks meer Zwarte Sterns werden gezien.

Goede dagen waren:

25 apr Schev 75 N in 4 uren
26 apr Schev 76 N in 4 uren
28 apr West-K 59 N in 3 uren
Schev 103 N in 4 uren
15 mei Schev 72 N in 4 uren

-Witvleugelstern - *Chlidonias leucopterus*

29 apr Noordw 1 N

6.11. Alkachtigen - *Alcidae*

-Alk en Zeekoet - *Alca torda/Uria aalge*

Na het zeer goede jaar 1983 vielen de aantallen 'alk/zeekoeten' in het voorjaar van 1984 wat terug, naar een totaal uurgemiddelde van 0,65, wat evengoed nog ruim boven de uurgemiddelden ligt die voor 1980 gebruikelijk waren. Het voorkomen was zoals gebruikelijk hoofdzakelijk beperkt tot de maand jan, waarbij aanzienlijke verschillen tussen de deelgebieden optraden. In ZH werden de meeste 'alk/zeekoeten' gezien op 3, 4, 7 en 8 jan. Het overgrote deel (83%) van de vogels vloog hier Z. In het Waddengebied was 5 jan de beste dag en hier vloog 76% naar ZW. Ook aan de Hbz werden op 3 jan flink wat 'alk/zeekoeten' gezien doch de grootste aantallen passeerden hier op 14 en 15 jan, en bovendien vloog hier 80% van alle vogels noordwaarts. In NH werden tijdens de westenwind periode van eind jun weer wat 'alk/zeekoeten' gezien, maar zelden meer dan 2 per uur. In totaal werd 22% van alle waargenomen vogels op soort gedetermineerd; de verhouding Alk:Zeekoet was hierbij 1 : 13,9 en verschilde nauwelijks tussen de deelgebieden.

De beste dagen waren:

03 jan West-K 18 Z en 1 N in 3 uren
Hbz 1 Z en 38 N in 3 uren
07 jan Schev 63 Z in 2 uren
08 jan West-K 20 Z en 1 N in 2 uren
14 jan Castr 21 N in 3 uren
Hbz 1 Z en 47 N in 4 uren
15 jan Hbz 3 Z, 65 N en 2 tp in 6 uren

-Kleine Alk - *Alle alle*

15 jan Hbz 1 N
16 jan Hbz 1 N
25 jan IJm 1 tp

-Papegaaiduiker - *Fratercula arctica*

07 jan Schev 1 Z
Hbz 1 Z
03 mrt Hbz 1 Z

6.12. Stootvogels en Uilen - *Accipitridae* en *Strigidae*

-Zwarte Wouw - *Milvus migrans*

06 apr Texel 1 N

-Visarend - *Pandion haliaetus*

21 apr Hbz 1 N
25 apr Texel 1 N
29 apr Schev 1 N
Texel 1 N
15 mei Schev 1 N

-Bruine Kiekendief - *Circus aeruginosus*

Eerste waarneming op 22 mrt (1 N, Schev), doortrek vooral eind apr en mei.

26 apr Schev 4 N
30 apr Schev 4 N
14 mei Schev 3 N

-Blauwe Kiekendief - *Circus cyaneus*

01 jan Schev 1 Z
14 mrt Huisd 1 N
30 mrt Hbz 1 Z
30 apr Schev 1 N
Hbz 1 N

-Gauwe Kiekendief - *Circus pygargus*

30 apr IJm 1 N

-Sperwer - *Accipiter nisus*

19 mrt Schev 1 N
24 mrt Schev 1 N

-Buizerd - *Buteo buteo*

22 apr Hbz 1 Z
14 en 15 mei Huisd 1 N

-Ruigpootbuizerd - *Buteo lagopus*

06 apr Texel 1 tp

-Torenvalk - *Falca tinnunculus*

22 apr Schev 1 N

-Smelleken - *Falco columbarius*

Doortrek vastgesteld tussen half mrt en half mei.
17 mrt Hbz 2 N
29 apr IJm 2 N
14 mei Noordw 3 N

-Boomvalk - *Falco subbuteo*

Waargenomen vanaf 24 apr (1 N, Schev), hooguit 2 exx. per waarneming.

-Ransuil - *Asio otus*

08 apr Schev 1 uit zee

-Velduil - *Asio flammeus*

19 mrt Castr 1 N
24 apr Hbz 1 uit zee
30 apr Hbz 1 N

-Bosuil - *Strix aluco*

08 apr Hbz 1 uit zee

6.13 Meerkoet - *Fulica atra*

22 feb Schev 8 tp
In mrt maximaal 8 tp bij Schev.
30 apr Maasvlakte 1 tp

6.14. Zeezoogdieren

-Gewone Zeehond - *Phoca vitulina*

09 mrt Hbz 1 tp
08 apr IJm 1 tp, later N
21 apr Schier 1 tp
22 apr Schier 1 tp

-Beluga - *Delphinapterus leucas*

29 mrt West-K en Wester-en Oosterschelde 1 adult