

1.1. Inleiding

Najaar 1984 was een afwisselend najaar, waarin stormachtige perioden met westelijke winden en kalme, oostelijke stromingen afgewisseld werden met 'saai' zuidelijke stromingen. Voor een aantal soorten leverde dit najaar hoge, soms zelfs ongekende, aantallen op ('duiker', Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Stormvogel, Rotgans, Kievit, Kokmeeuw, 'alk/zeekoet'), terwijl andere groepen in nauwelijks noemenswaardige hoeveelheden werden waargenomen (veel eenden, sterns).

Het aantal waargenomen uren was wat aan de lage kant en dat, terwijl een nieuwe telpost een indrukwekkend aantal uren leverde (Bloemendaal).

De opzet van dit verslag is gelijk aan die van de paar voorgaande verslagen. Een viertal soorten is iets uitgebreider behandeld, al kon door tijdgebrek en andere technische moeilijkheden niet al te diep gespit worden. Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst een ieder, die zich daar toe geroepen voelt of die ideeën heeft over het voorkomen van soorten voor onze kust, in een bepaald najaar of in het algemeen, de gelegenheid moet krijgen bepaalde facetten van de zeetrek in de halfjaarverslagen uit te werken en de uitnodiging hiertoe is hierbij de deur uit.

Soorten die door het CDNA beoordeeld dienen te worden, zijn met (CDNA) aangeduid; soorten, door de CvZ zelf te beoordelen, die zijn afgewezen op grond van een ontbrekende of onvoldoende beschrijving, zijn aangeduid met *, soorten, die nog beoordeeld moeten worden, met **. De auteurs van hoofdstuk 5 zijn onder hun bijdrage vermeld.

Aan dit verslag is verder meegewerkt door J.E. den Ouden, L. Stegeman en C. Winter. De voorplaat is van de hand van F.-J. Maas.

Alkmaar, mei/juni 1986
N.F. van der Ham
J.L. Apperloo