

6. Korte bespreking per soort.

6.1. Duikers-Gaviidae

-Roodkeel- /Parelduiker - *Gavia stellata/arctica*

Zie hoofdstuk 5.1.

-IJsduiker - *Gavia immer* (CDNA)

1 dec WestK 1 Z
30 dec IJm 1 tp.

-Geelsnavelduiker - *Gavia adamsii* (CDNA)

Vanaf 7 dec 1 ad. ter plaatse, Schev.

-IJs- /Geelsnavelduiker - *Gavia immer/adamsii*

27 okt Tex 1 Z
18 nov Hbz 1 Z

6.2. Futen-Podicipedidae

-Dodaars- *Tachybaptus ruficollis*

25 nov Schev 3 tp.
1 dec Schev 1 tp.
26 dec Schev 1 tp.

-Fuut - *Podiceps cristatus*

Met ruim achtduizend getelde Futen was naj.84 niet uitzonderlijk. De meeste exx. werden gezien in ZH:61% (n=8328); in Wd en NH werden resp. 9% en 30% gezien.

In juli en aug werden slechts sporadisch Futen gezien. Ook in sept werd de soort nog onregelmatig waargenomen. Vanaf okt begon de Fuut een regelmatige verschijning te worden. De meeste trek werd waargenomen op 1 en 2 dec en in de derde week van dec. Dit viel samen met koufronten. Beste dagen:

1 dec Hbz(4 uur) 366 Z, 69 N, 7 tp.
Nwijk(2 uur) 276 Z, 18 N, 40 tp.
Schev(5 uur) 784 Z, 30 N
2 dec WestK(2 uur) 309 Z, 8 N
16 dec Schev(4 uur) 407 Z, 36 N, 110 tp.
22 dec Schev(2 uur) 199 Z, 9 N, 2 tp.

De vliegrichting was overwegend Z:Wd(n=761) 80% Z, NH(n=2467) 62% Z, ZH(n=5100) 83% Z. Per deelgebied werd ca. 10% van de Futen ter plaatse genoteerd.

-Roodhalsfuut - *Podiceps grisegena*

Met 128 waargenomen Roodhalsfuten was naj.84 vrij matig vergeleken met voorgaande jaren.

De eerste waarnemingen vielen op 8 juli(Hbz 3Z), 31 juli(Schev 1 Z) en 27 aug(Tex 1 Z).

Vanaf sept werd de soort af en toe gezien, het meest in okt en nov. Er zijn niet meer dan 5 exx. per uur gezien.

-Kuifduiker - *Podiceps auritus*

De Kuifduiker werd zoals gebruikelijk weinig waargenomen. De meeste exx. zijn in Wd gezien, terwijl NH geheel geen waarnemingen opleverde. De eerste waarn. viel op 9 sept(IJm 1 tp.). De overige waarn. waren verspreid over de rest van het najaar.

-Goorde Fuut - *Podiceps nigricollis*

17 nov Hbz 1 Z
Schev 1 tp.
25 nov Schev 1 Z
26 nov Schev 1 Z

-'kleine fuut' - *Podiceps auritus/nigricollis*

Vanaf half sept werden er in ZH, NH en Wd resp. 11, 2 en 7 ongedetermineerde kleine futen gezien.

6.3. Stormvogelachtigen-Procariidae

-stormvogeltje spec. - *Hydrobates pelagicus*/
Oceanodroma leucorhoa

10 sept Schev 1 Z
6 okt Hbz 1 Z
6 okt WestK 1 Z
7 okt Schev 1 Z

-Stormvogeltje - *Hydrobates pelagicus* (CDNA)

11 sept Schev 1 Z
7 okt Hbz 1 tp.

-Vaal Stormvogeltje - *Oceanodroma leucorhoa*

Met 77 exx. was dit een redelijk najaar.

De eerste waarn. viel op 1 sept(Tex 1 Z). De tweede week van sept en het derde weekend in okt leverden de meeste waarn. op:

10 sept Schev(6 uur) 18 Z
11 sept Hbz(2 uur) 1 Z, 3 N
11 sept Tex(3 uur) 6 N
20 okt Hbz(4 uur) 4 Z, 2 N
11 sept Schev(3 uur) 4 Z

-Noordse Stormvogel - *Fulmarus glacialis*

Naj.84 leverde veel Noordse Stormvogels op, al was het seizoenstotaal aanzienlijk lager dan in naj.83 (2509 vs. 11405). In Wd is 15% van de vogels gezien, waarvan 12% naar Z vloog, in NH 60%(5% Z) en in ZH 25%(45% Z).

Er was zowel in Wd als in NH één juli waarn., in aug werd de soort driemaal in Wd vastgesteld(3 exx.), 5 maal in NH(8 exx.) en éénmaal in ZH(1 ex.). De meeste exx. werden echter in sept gezien: 8 sept was voor alle deelgebieden de beste dag, terwijl 9, 10 en 11 sept plaatselijk ook nog redelijke aantallen opleverden. De rest van sept én okt leverden regelmatig waarn. op, maar de aantallen bleven laag. In nov werd de soort slechts éénmaal gezien met 3 exx. in NH, terwijl dec 4 waarn. opleverde: 2 maal 1 ex. in NH en éénmaal 2 exx. in Wd. Beste dagen:

8 sept Tex(3½ uur) 1 Z, 276 N
Hbz(8½ uur) 6 Z, 1190 N
WestK(7 uur) 12 Z, 318 N, 1 tp.
9 sept Hbz(9 uur) 38 Z, 89 N
10 sept Hbz(7½ uur) 3 Z, 48 N
Schev(11 uur) 221 Z, 7 N
11 sept Tex(4 uur) 29 N
Hbz(3 uur) 1 Z, 75 N

-Gauwe Pijlstormvogel - *Puffinus griseus*

De Gauwe Pijl is in naj.84 tamelijk veel gezien. Alleen in naj.78 is een hoger seizoenstotaal bereikt (562 vs. 1140). De aantallen waren zeer gelijkmatig over de deelgebieden verdeeld: Wd 33%, NH 35%, ZH 32%. De vliegrichting was in Wd en ZH overwegend Z(W)(64% Z, n=185 resp. 74% Z, n=178), terwijl, zoals gebruikelijk, in NH de meeste exx. naar N vlogen(34% Z, n=199). De eerste waarn. viel in NH op 15 juli(Hbz 1 N), in ZH op 6 aug(Schev 2 Z) en in Wd op 28 aug(Tex 1 tp.). In sept werd de soort vooral gezien tussen 8 en 11 sept, al bleven de aantallen laag. De meeste exx. werden in okt gezien en wel in het eerste en derde weekend. In nov zijn nog 5 exx. gezien, waarvan 4 exx. op de 25ste. Er was één dec waarn. (9 dec Egmond 4 Z). Beste dagen:

6 okt Tex(7 uur) 3 Z, 52 N
Hbz(9 uur) 2 Z, 63 N
Nwijk(4 uur) 18 N
20 okt Hbz(7 uur) 15 Z, 5 N
Mvl(3½ uur) 36 Z
21 okt Mvl(5 uur) 22 Z
7 okt Tex(5 uur) 85 Z, 6 N

-Noordse Pijlstormvogel - *Puffinus puffinus*

Voor de Noordse Pijl was naj.84 een doorsnee najaar, al kwam het merendeel van alle waarn. uit ZH(75%, n=119). 72% van alle vogels vloog naar Z.

De meeste exx. werden in sept en okt gezien; verder waren er 2 juli-, 3 aug- en geen nov en dec-waarn.. Beste dagen:

1 sept Schev(2 uur) 31 Z, 1 Z
WestK(3 uur) 8 Z
6 okt WestK(4 uur) 12 Z, 5 N

Tweemaal werd een ex. waargenomen dat vermoedelijk tot de ondersoort *P.p.mauretanicus* (CDNA) behoorde: 8 aug Schev 1 tp.
4 sept Hbz 1 Z

-Kleine Pijlstormvogel - *Puffinus assimilis* (CDNA)

Op 12 sept werd vermoedelijk 1 ex. van deze soort naar Z vliegend waargenomen te Nwijk.

-Grote Pijlstormvogel - *Puffinus gravis* (CDNA)

1 sept Hbz 1 Z

-Grote/Kuhl's Pijlstormvogel - *Puffinus gravis*/
Calonectris diomedea

15 juli Hbz 1 N 20 okt Hbz 2 N
1 sept Hbz 1 Z 21 okt Hbz 1 Z
7 okt Hbz 1 N

6.4. Jan van Gent - *Sula bassana*

Met ruim 5800 exx. was naj.84 niet bijzonder; van het totaal (n=5818) is 46% in Wd gezien, 34% in NH en 20% in ZH. De soort is in alle maanden van het najaar gezien, maar zoals gebruikelijk het meest in sept en okt. Met name de eerste en derde week van okt brachten redelijke aantallen onder de kust, hoewel er geen sprake was van topdagen. In Wd vloog 47% naar Z(W) (n=2645), in NH 24 % (n=1988) en in ZH 64% (n=1185).

Aardig waren de waarn. van flinke groepen fouragerende vogels: op 18 sept 120 exx. en op 20 okt 100 exx. beiden te Tersch. Opvallend is dat er veel fourageergedrag in Wd is waargenomen (370 exx., van juli t/m okt), tegen slechts enkelen in NH (10 exx. in sept) en geheel geen in ZH. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat vermoedelijk lang niet alle waarnemers fourageergedrag hebben genoteerd.

In Wd is van 89% van de Jan van Genten het kleed genoteerd (n=2645); hiervan was 26% 1^e jaars, 20% 2^e j., 6% 3^e j., 9% 4^e j. en 39% adult. In NH is dit bij 98% gebeurd (n=1988; 38% 1^e j., 23% 2^e j., 7% 3^e j., 5% 4^e j. en 27% ad.) en in ZH bij 88% (n=1185; 43% 1^e j., 18% 2^e j., 6% 3^e j., 8% 4^e j. en 25% ad.).

Voor het leeftijdsverloop over de maanden, zie fig. 6.4.1.

6.5. Aalscholvers - *Phalacrocoracidae*

-Aalscholver - *Phalacrocorax carbo*

Naj.84 gaf geen buitengewone aantallen Aalscholvers te zien. De meeste exx. zijn in ZH gezien, nl. 60% (n=1127).

In alle maanden van het najaar zijn Aalscholvers gezien, al waren de aantallen in nov en dec zeer laag.

De beste uren vielen in ZH in de ochtenduren van aug:

1 aug Schev (6.00-7.00) 46 Z

11 aug Bloem (6.00-7.00) 71 Z

In Wd werd slechts bij 1% de leeftijd genoteerd (n=307; 3 onv.), in NH 10% (n=147; 9 onv., 6 ad.) en in ZH 1% (n=673; 5 onv.).




Fig.6.4.1. Leeftijdssamenstelling Jan van Gent;
Age composition Gannet during autumn 1984.

-Kuifaalscholver - *Phalacrocorax aritotelis*

5 juli Hbz 1 ad.tp.(later N) 16 nov IJm 1 tp.
18 sept Tex 1 Z 25 nov WestK 1 tp.

6.6. Lepelaars en Reigers - *Plataleidae* & *Ardeidae*

-Lepelaar - *Platalea leucorodia*

23 sept Bloem 31 Z 18 okt Schev 1 N
15 okt 2 Z

-Blauwe Reiger - *Ardea cinerea*

Naj.84 leverde slechts 149 Blauwe Reigers op. Hier van is 61% in ZH gezien, 30% in NH en 9% in Wd. De trek vond gespreid plaats in aug, sept en okt, waarbij 83% naar Z vloog. In Wd is 15% op leeftijd gebracht (n=13; 2 onv.), in NH 4% (n=45; 2 ad.) en in ZH 0% (n=91).

6.7. Eendachtigen - *Anatidae*

-Wilde Eend - *Anas platyrhynchos*

Er zijn 792 Wilde Eenden gezien in naj.84, waarvan 72% in ZH. De meeste trek vond plaats in zuidwaartse richting rond half nov.

In Wd werd 87% gesexed (n=86; v:m=1:0.83), in NH 66% (n=186; v:m=1:0.77) en in ZH 8% (n=700; v:m=1:1).

-Krakeend - *Anas strepera*

De Krakeend is van aug t/m dec onregelmatig waargenomen, het meest in ZH (n=66).

-Wintertaling - *Anas crecca*

Voor de Wintertaling was naj.84 een doorsnee najaar; 11% van de vogels werd in Wd gezien, 58% in NH en 31% in ZH (n=2533).

De eerste helft van nov en de tweede helft van dec gaven de meeste trek te zien, hoofdzakelijk naar Z.

Een aardige dag was: 26 dec Hbz (2 uur) 404 Z, 30 N, 200 tp.

In Wd werd 7% gesexed (n=283; v:m=1:0.73), in NH 2% (n=1477; v:m=1:0.56) en in ZH 3% (n=773; v:m=1:0.83).

-Smient - *Anas penelope*

Over de afgelopen 5 jaar bekeken betrof naj.84 een betrekkelijk goed najaar; echter in vergelijking met de daarvoor liggende periode was dit najaar beneden peil.

6% van de Smienten werd in Wd gezien, 20% in NH en 74% in ZH (n=6047). De meeste trek vond plaats in zuidwaartse richting in nov en in mindere mate in dec. In juli werd de soort niet waargenomen, in aug slechts tweemaal (15 aug Hbz 1 N; 22 aug Schev 1 N), in sept en okt vrij regelmatig. Aardige dagen:

16 sept Schev (5 uur) 403 Z, 3 N

25 nov Schev (4½ uur) 911 Z

26 nov Schev (2 uur) 849 Z, 10 N

15 dec Egmond (1 uur) 230 Z, 5 N

In Wd is 78% gesexed (n=338; v:m=1:0.58), in NH 55% (n=1217; v:m=1:0.75) en in ZH 2% (n=4492; v:m=1:1.04).

-Pijlstaart - *Anas acuta*

Voor de Pijlstaart gaf naj.84 vrij lage aantallen te zien. 56% werd in ZH gezien, 33% in NH en 11% in Wd (n=652). De Pijlstaart werd in juli niet en in aug éénmaal gezien (21 aug Hbz 5 Z). In sept kwam de trek voorzichtig op gang en gedurende de rest van het najaar werd af en toe lichte trek waargenomen, vooral in nov en de derde week van dec. 87% van de vogels vloog naar Z. Aardige dagen:

16 sept WestK (1 uur) 35 Z 22 dec Hbz (2 uur) 73 Z, 8 N

In Wd werd 73% gesexed (n=74; v:m=1:1), in NH 44% (n=212; v:m=1:0.94) en in ZH 7% (n=366; v:m=1:0.41).

-Zomertaling - *Anas querquedula*

28 aug Schev 1 N 5 sept Hbz 1 N
1 sept Schev 1 Z

-Slobeend - *Anas clypeata*

Ook voor de Slobeend was naj.84 aan de magere kant.

3% van de vogels werd in Wd gezien, 30% in NH en 67% in ZH (n=236). Sloeëndentrek vond zeer gespreid plaats over het gehele najaar, zonder een duidelijke voorkeursrichting.

In Wd is 100% gesexed (n=7; v:m=1:0.4), in NH 75% (n=69; v:m=1:0.44) en in ZH 12% (n=159; v:m=1:0.58).

-Toppereend - *Aythya marila*

Naj.84 gaf redelijke aantallen Toppereenden te zien. 63% werd in Wd gezien, 28% in NH en 9% in ZH (n=696). In juli werd de soort op de 24ste bij Egmond gezien (3 N), uit aug zijn geen waarn. binnengekomen. In sept werden af en toe Toppereenden gezien, maar pas vanaf half okt tot begin dec werd de soort regelmatig gezien, terwijl er ook eind dec nog enige trek werd vastgesteld. 82% van de vogels vloog naar Z. Er was één redelijke dag: 30 sept Tersch (2 uur) 217 Z.

In Wd is 17% gesexed (n=437; v:m=1:0.69), in NH 45% (n=194; v:m=1:0.89) en in ZH 14% (n=64; v:m=1:3.5).

-Kuifeend - *Aythya fuligula*

Niet in uitzonderlijke aantallen gezien. 14% in Wd, 41% in NH en 45% in ZH (n=729). Van juli t/m sept werd de soort weinig gezien, maar de Kuifeend was in okt en vooral nov een vrij regelmatige verschijning, terwijl ook dec nog regelmatig Kuifeenden op leverde. 83% vloog naar Z. Aardige dagen:

17 okt Schier (1 uur) 43 Z 10 nov Egmond (3 uur) 87 Z, 1 N
10 nov Hbz (3 uur) 81 Z 1 dec IJm (1 uur) 80 Z, 1 tp.
In Wd werd 26% gesexed (n=102; v:m=1:1.08), in NH 40% (n=302; v:m=1:1.07) en in ZH 7% (n=325; v:m=1:1.75).

-Tafeleend - *Aythya ferina*

Tamelijk weinig gezien. 9% in Wd, 20% in NH en 71% in ZH (n=458). Uit juli en aug kwamen slechts enkele waarn. binnen (echter: 15 juli Schev (1 uur) 20N). Van sept t/m dec werden af en toe Tafelenden gezien, maar de trek concentreerde zich in nov. 70% vloog naar Z. Een redelijke dag: 29 okt Schev (1 uur) 46 Z.

In Wd werd 63% gesexed (n=41; v:m=1:2.25), in NH 49% (n=93; v:m=1:1.09) en in ZH 10% (n=324; v:m=1:0.63).

-Brilduiker - *Bucephala clangula*

Een redelijk Brilduikernajaar. 11% werd in Wd gezien, 31% in NH en 58% in ZH (n=493). Vanaf 16 okt werden regelmatig Brilduikers gezien; de hoofdmoot kwam in nov langs. 92% vloog naar Z. Goede dagen:

10 nov Tex (2 uur) 27 Z 10 nov Schev (3 uur) 84 Z
Hbz (4 uur) 48 Z, 3 N Egm (3 uur) 26 Z
1 dec Schev (4 uur) 31 Z, 2 N, 1 tp.

In Wd werd 89% gesexed (n=56; v:m=1:0.72), in NH 89% (n=150; v:m=1:0.81) en in ZH 25% (n=287; v:m=1:0.41).

-IJseend - *Clangula hyemalis*

Een vrij slecht najaar. 15% werd in Wd gezien, 33% in NH en 52% in ZH (n=27). Een opvallend vroege waarn. viel op 2 juli: Egm lm. zk. N. Verder is de soort slechts af en toe waargenomen van okt t/m dec. In nov werden regelmatig enkele exx. (max. 3) zwemmend te IJm gezien. 30% van de vogels vloog naar Z, 41% werd tp. waargenomen. In Wd is 100% gesexed (n=4; v:m=1:0.33), in NH 89% (n=9; v:m=1:0.33) en in ZH 71% (n=14; v:m=1:0.66).

-Eidereend - *Somateria mollissima*

Ook voor de Eidereend leverde Naj.84 lage totalen op. 41% werd in Wd gezien, 23% in NH en 36% in ZH (n=13469). In juli en aug werd de soort weinig waargenomen, vanaf sept was het een regelmatige verschijning. In Wd werden in de derde week van okt veel Eiders gezien, terwijl nov en dec, ook in NH en ZH, af en toe flinke aantallen te zien gaven. De tweede week van dec gaf voor alle drie de deelgebieden redelijke verplaatsingen te zien. In Wd vloog 71% naar Z (W) en zat 7% tp. (n=5541), in NH 28% Z en 17% tp. (n=3080) en in ZH 25% Z en 59% tp. (n=4848). Aardige dagen:

17 okt Schier (2½ uur) 2077 W, 184 O
18 okt Schier (2 uur) 525 W, 150 O
16 nov IJm 230 tp.

In Wd werd 94% gesexed (n=5541; v:m=1:0.73), in NH 81% (n=3080; v:m=1:0.27) en in ZH 30% (n=4848; v:m=1:0.19).

-Zwarte Zeeëend - *Melanitta nigra*

Numeriek was naj.84 een zeer slecht najaar, maar op uurgemiddelde-basis was naj.83 nog net iets slechter (uurgem. naj.80/83: 40.2; 51.0; 37.7; 28.3 vs. naj.84: 30.5). 37% werd in Wd gezien, 41% in NH en 22% in ZH (n=44319). De Zwarte Zeeëend is in alle deelgebieden het gehele najaar door gezien. Duidelijke verplaatsingen traden op in in NH en Wd in de tweede helft van juli en van okt t/m dec, met name in nov. In ZH trad alleen omstreeks half dec duidelijke trek op. In Wd vloog 68% Z (W) (n=16573), in NH 58% (n=18135) en in ZH 75% (n=9607). Redelijke dagen:

16 sept Schev (4 uur) 1774 Z, 5 N

WestK (3 uur) 1700 Z, 57 N

5 dec Hbz (3 uur) 1199 Z, 9 N

9 dec Hbz (3 uur) 1957 Z, 1 N, 69 tp.

Verder waren er nog een tweetal ongebruikelijke waarn.: 26 sept Hbz 1 albino N

7 okt Hbz lm. met kenmerken van *M.n.americana* tp., later naar N.

In het Wd werd 11% gesexed (n=16573; v:m=1:0.95), in NH 11% (n=18135; v:m=1:1.36) en in ZH 8% (n=9607; v:m=1:1.68).

-Grote Zeeëend - *Melanitta fusca*

Zoals voor de meeste eenden, was naj.84 voor de Grote Zeeëend een vrij matig najaar. In Wd is 36% gezien, in NH 46% en in ZH 18% (n=764). Tot en met sept werd de soort weinig waargenomen (7 maal in juli, 12 maal in aug en 15 maal in sept). Vanaf okt was de soort een vrij regelmatige verschijning; van duidelijke verplaatsingen was alleen sprake rond eind okt/begin nov in Wd en rond eind nov/begin dec in NH. 78% van de vogels vloog naar Z. Van echte topdagen was geen sprake. In Wd werd 27% gesexed (n=273; v:m=1:0.97), in NH 17% (n=349; v:m=1:2.81) en in ZH 33% (n=142; v:m=1:2.36).

-Middelste Zaagbek - *Mergus serrator*

Voor de Middelste Zaagbek was naj.84, i.t.t. de meeste overige eendensoorten, een tamelijk goed najaar (uurgem. naj.80/83: 1.0; 1.6; 1.2; 1.3 vs. naj.84: 1.9). Van het totaal aantal vogels (n=2730) is 17% in Wd gezien, 38% in NH en 45% in ZH. In juli werd de Middelste Zaagbek driemaal waargenomen: 5 juli Hbz 7 N; 15 juli Tex 5 N; Hbz 3 N; in aug tweemaal: 24 aug Tex 1 Z; 26 aug Hbz 2 Z, 1 N. In sept kwam de trek moeizaam op gang. De meeste vogels werden de tweede helft van okt (NH&ZH), begin nov (Wd, NH&ZH) en eind nov (Wd) gezien. Ook in dec werd de soort nog regelmatig waargenomen. In Wd vloog 86% naar Z (W) (n=473), in NH 85% (n=1028) en in ZH 96% (n=1229). Beste dagen:

21 okt Huid (6 uur) 101 Z, 4 N

Hbz (8 uur) 153 Z, 7 N, 2 tp.

Nwijk (5 uur) 106 Z

Schev (7 uur) 186 Z

3 nov Tex (3 uur) 163 Z, 10 N

Schev (2 uur) 92 Z

In Wd werd 88% gesexed (n=473; v:m=1:0.4), in NH 63% (n=1028; v:m=1:0.63) en in ZH 24% (n=1229; v:m=1:0.15).

-Grote Zaagbek - *Mergus merganser*

26 sept Schev 1 Z 21 okt Huid 1 N
Voorts enkele waarn. uit nov en dec.

-Nonnetje - *Mergus albellus*

18 okt Schier 1 Z 30 nov Schev 2 Z
8 nov Schev 2 N 1 dec Nwijk 1 Z

-Bergeend - *Tadorna tadorna*

Naj.84 leverde vrij weinig Bergeenden op. Van het totaal (n=2485) werd 5% in Wd gezien, 54% in NH en 41% in ZH. De Bergeend is in alle maanden in alle deelgebieden waargenomen, echter zowel presentie als aantallen waren doorgaans laag. Alleen in de eerste en derde week van juli werd in NH en ZH ruitrek naar N waargenomen, terwijl in ZH ook in de

-16-

21 okt Schier(4 uur) 309 W,7 O
 Tex(7 uur) 296 Z,31 N,22 tp.
 Huisd(6 uur) 293 Z,9 N,138 tp.
 Hbz(9 uur) 733 Z,16 N
 Schev(6 uur) 265 Z,1 N
 21 dec Schev(5 uur) 331 Z,18 N,21 tp.
 90% van de vogels(n=16648) is op leeftijd gebracht;
 hiervan(n=15000) betrof 15% 1^ekj., 5% 2^e/4^ekj. en
 80% ad.

-Kleine Mantelmeeuw - *Larus fuscus*
 Zie hoofdstuk 5.4.

-Grote Burgemeester - *Larus hyperboreus*

*26 sept Hbz 1 1^ekj.N 1 dec Tex 1 1^ekj.Z
 3 okt Schev 1 ad.N Schev 1 2^ekj.tp.
 13 okt Hbz 1 1^ekj.Z 8 dec Tex 1 2^ekj.Z
 *27 okt Egm 1 ad.Z 21 dec Hbz 1 1^ekj.Z
 31 okt Schev 1 ad.Z Schev 1 1^ekj.Z
 18 nov Schev 1 1^ekj.tp. 29 dec Schev 1 1^ekj tp.

-Stormmeeuw - *Larus canus*

Naj.84 was geen bijzonder najaar voor de Storm-
 meeuw.Van het totaal werd 7% in Wd gezien,58% in
 NH en 35% in ZH(n=7982).Hierbij moet echter be-
 dacht worden dat de soort op lang niet alle pos-
 ten regelmatig en systematisch bijgehouden wordt.
 Zo werden in Schev en WestK totaal geen Storm-
 meeuwen geteld,terwijl ook andere posten aantal-
 len meldden,die in geen verhouding stonden tot
 het aantal teluren.Over het voorkomen in ZH valt
 daardoor weinig zinnigs te zeggen.

In juli en aug werd de soort regelmatig,maar
 niet veel gezien;in sept namen de aantallen al
 toe,maar de meeste Stormmeeuwen werden in okt
 gezien,terwijl ook nov en dec nog redelijke aantal-
 len te zien gaven.71% van de vogels vloog naar Z
 (n=7982).De beste dag was:1 dec Hbz(4 uur) 365 Z,
 10N.86% van de vogels werd op leeftijd gebracht;
 hiervan(n=6893) was 16% 1^ekj.,10% 2^ekj. en 74% ad.

-Kokmeeuw - *Larus ridibundus*

Met ruim 50.000 exx. was naj.84 veruit het beste
 najaar tot nog toe(uurgem.naj.80/83:17.6;15.7;
 28.3;16.6 vs.naj.84:34.7).Hierbij moet echter wel
 rekening gehouden worden met het feit dat de Kok-
 meeuw,voor 1984,in ZH slechts onregelmatig en niet
 systematisch geteld is.De meeste vogels zijn in ZH
 gezien:42%,tegen 36% in NH en22% in Wd(n=50429).
 De soort is in alle maanden van het najaar gezien,
 al was het voorkomen(dan wel het vastleggen daar-
 van) in ZH het onregelmatigst.In sept was het voor-
 komen het minst regelmatig.In iedere maand werden,
 soms per deelgebied verschillende,trekgolven vast-
 gesteld.In juli en begin aug werden in Wd en ZH
 al flinke verplaatsingen opgemerkt.De tweede helft
 van sept,de tweede helft van okt,half nov en begin
 dec leverden langs de gehele kust opvallende ver-
 plaatsingen op.Doorgaans vielen de trekgolven sa-
 men met kalme oostelijke stromingen en/of invallen-
 de koude.De trek was het gehele najaar door sterk
 Z-waarts gericht(96% Z;n=50429).Goede dagen:
 8 juli Nwijk(1 uur) 620 Z 16 okt Tex(2 uur) 2395 Z
 30 juli Tex(2 uur) 735 Z Hbz(4 uur) 1568 Z
 Schev(2 uur) 1071Z 27 okt Hbz(5 uur) 1643 Z
 5 aug Bloem(4 uur) 1271 Z Egm(1 uur) 823 Z
 16 sept Hbz(4 uur) 2288 Z 28 okt Tex(4 uur) 1458 Z
 Bloem(3 uur) 1106 Z Hbz(4 uur) 1762 Z
 Nwijk(1 uur) 750 Z Zandv(1 uur) 971 Z
 28 sept Hbz(3 uur) 1137 Z 4 nov Bloem(4 uur) 930 Z
 29 sept Bloem(8 uur) 1676 Z 9 nov Nwijk(1 uur) 1140 Z
 Tex(2 uur) 754 Z 15 nov Schev(2 uur) 1190 Z
 12,okt Schev(1 uur) 1300 Z 1 dec Hbz(4 uur) 1563 Z
 (N-waarts vliegende vogels zijn boven niet vermeld).
 51% van de kokmeeuwen is op leeftijd gebracht;hier-
 van(n=25966) betrof 10% 1^e/2^ekj. en 90% ad.;deze
 verhouding lag in de drie deelgebieden gelijk.Op-
 vallend was dat tijdens geen enkele trek golf on-
 volwassen vogels in opvallende aantallen zijn waar-
 genomen.

-Zwartkopmeeuw - *Larus melanocephalus*

2 juli Castr 1 2^ekj.tp. 8 juli Schev 1 1^ekj.Z,lad.tp.

15 juli Hbz 1 ad.Z 6 okt IJm 1 2^ekj.tp.
 30 juli Schev 1 3^ekj.Z 14 okt Bloem 1 ad.Z
 *15 sept Schev 1 2^ekj.Z 17 okt Schier 1 2^ekj.Z

-Dwergmeeuw - *Larus minutus*

Voor de Dwergmeeuw was naj.84 niet uitzonder-
 lijk.16% van de vogels werd in Wd gezien,36% in
 NH en 48% in ZH(n=5155).Er zijn 7 juli- en 20
 aug-waarn. binnengekomen.In sept kwam de trek
 enigszins op gang,in okt en nov werd de soort re-
 gelmatig gezien,in dec weer wat minder.80% van
 de vogels vloog naar Z.De trek was,met name in
 okt en nov,regelmatig en nauwelijks gepiekt.Enke-
 le redelijke dagen:
 18 okt WestK(2 uur) 152 Z
 20 okt Cadz(6 uur) 153 Z
 25 nov WestK(2 uur) 190 Z
 28 nov Schev(1 uur) 85 Z,12 N
 In totaal is 82% op leeftijd gebracht;hiervan
 (n=4210) was 14% 1^ekj.,1% 2^ekj. en 85% ad.

-Drieteenmeeuw - *Rissa tridactyla*

Met ruim 23.000 exx. was naj.84 extreem goed
 voor deze soort.Niet alleen numeriek,maar ook
 qua uurgemiddelde was naj.84 het beste najaar
 tot nog toe(uurgem.naj.77/83:8.9;5.1;8.8;6.1;
 3.0;11.5;6.5 vs.naj.84:15.9).Van het totaal
 aantal waargenomen vogels(n=23111) werd 24% in
 Wd gezien,17% in NH en 59% in ZH.De eerste vo-
 gels werden zoals gebruikelijk al in juli ge-
 zien(tweemaal in ZH,driemaal in Wd).Ook aug
 leverde maar enkele waarn. op(2 maal ZH,3 maal
 NH én Wd).Van sept t/m dec is de soort regel-
 matig langs de hele kust waargenomen.Zoals ge-
 woonlijk bij deze soort werden hoge aantallen
 maar op enkele dagen,overigens alle met harde,
 aanlandige wind,waargenomen.De trekgolven vie-
 len dit najaar in de tweede helft van okt en
 nov,voor alle deelgebieden,en in de tweede
 helft van dec voor ZH en Wd.In ZH(n=13693) en
 Wd(n=5600) vloog 97% van de vogels naar Z(W),
 in NH(n=3818) lag dit,zoals gebruikelijk,wat
 lager:79%.Beste dagen:

20 okt Maasvl(5 uur) 1045 Z,4 tp.
 21 okt Tex(8 uur) 1006 Z
 Hbz(10 uur) 607 Z,13 N
 Schev(8 uur) 756 Z
 Maasvl(5 uur) 1822 Z
 WestK(6 uur) 673 Z
 24 nov Hbz(6 uur) 1008 Z,136 N
 Schev(3 uur) 551 Z
 25 nov Schev(4 uur) 932 Z,8 N
 WestK(2 uur) 1377 Z
 26 nov Tex(1 uur) 715 Z
 9 dec Tex(2 uur) 607 Z,3 N
 21 dec Schev(5 uur) 2051 Z

Van het totaal aantal vogels is 50% op leef-
 tijd gebracht;hiervan(n=11522) werd 37% als
 1^ekj. genoteerd,tegen 1% 2^ekj. en 62% ad.

-Vorkstaartmeeuw - *Xema sabini*

10 sept Schev 1 1^ekj.Z 23 nov Hbz 1 1^ekj.N
 20 okt Hbz 1 1^ekj.N,1 1^eZ 25 nov Hbz 1 1^ekj.N
 Schev 1 ad.Z 25&26 nov IJm 1 1^ekj.tp.
 * Maasvl 1 1^ekj.Z **10 dec Schev 1 ad.Z
 *21 okt Maasvl 1 1^ekj. **21 dec Schev 1 1^ekj,
 2 ad Z 1 ad.Z

-Visdief/Noordse Stern - *Sterna hirundo/paradisaea*

Met slechts 53.009 exx. was naj.84 een buitengewoon slecht najaar voor de 'noordse dief'
 (uurgem.naj.80/83:55.6;90.5;59.1;38.7 vs.naj.
 84:36.4).Hiervan is 21 % in Wd gezien 29% in NH
 en 50% in ZH.Van juli t/m sept werd de 'noord-
 se dief' zeer regelmatig gezien;de grootste
 verplaatsingen vielen tussen eind juli en be-
 gin sept.Begin okt werd de 'soort' nog regelm-
 atig waargenomen,maar dat nam snel af met het
 voortschrijden van de maand.Uit nov kwamen nog
 enkele waarn.:4 nov WestK 2 Z(1 V,1 N);486 nov
 IJm 1 V tp.;25 nov Hbz 1 Z;26 nov Nwijk 1 V Z.
 Er was één dec-waarn.:7 dec Huisd 2 Z.66% van
 de vogels vloog naar Z.Enkele goede dagen:

14 aug Tersch(9 uur) 2042 Z,89 N

Schev(3 uur) 245 Z,1294 N(1537 V,2 N)

1 sept Schev(9 uur) 1170 Z(1169 V,1 N)

2 sept Hbz(9 uur) 1931 Z,109 N(358 V,24 N)

8 sept Hbz(9½ uur) 245 Z,1723 N(230 V,1 N)

Schev(7 uur) 2417 Z,63 N(2115 V,8 N)

9 sept Schev(11 uur) 2161 Z,89 N(1804 V,4 N)

In Wd is 2% van de 'noordse dieven' als Noordse Stern gedetermineerd en 15% als Visdief(n=11007), in NH resp.1% en 22%(n=15342) en in ZH resp.½% en 72%(n=26660).Van de Noordse Sterns(n=584) is 51% op leeftijd gebracht;hiervan(n=301) was 28% 1^e kj. en 72% ad.Van de Visdieven is 18% op leeftijd gebracht;hiervan(n=4891) was 33% 1^e kj. en 67% ad. Bovendien zijn er 5 2^e kj.Visdieven gezien.Naarmate het najaar voortschreed nam het aandeel onvolwassen vogels sterk toe.

-Dougall's Stern - *Sterna dougallii*(CDNA)

16 juli Schev 1 1^e kj.tp. 14 aug Schev 1 ad.tp.

11 aug Schev 1 ad.Z 21 okt Hbz 1 1^e kj.Z

-Grote Stern - *Sterna sandvicensis*

Ook voor de Grote Stern gaf naj.84 lage totalen te zien(uurgem.naj.80/83:26.6;45.7;34.5;14.7 vs. naj.84:18.8),des te sterker nog als men het vergelijkt met de periode 74/79.Van het totaal aantal waargenomen vogels(n=27406) is 42% in Wd gezien, 29% in NH en 29% in ZH.Tot en met sept is de Grote Stern zeer regelmatig waargenomen.De verplaatsingen vielen zeer gespreid van juli tot begin sept.In okt nam het aantal Grote Sterns snel af en er waren twee nov-waarn.:20 nov Hbz 1 Z;25 nov Schev 1 Z.59% van de vogels vloog naar Z.Goede dagen:27 juli Schev(1 uur) 369 Z,2 tp.

15 aug Vlie(2 uur) 449 Z,503 N

16 aug Tersch(1 uur) 11 Z,383 N

8 sept Hbz(10 uur) 144 Z,735 N

22% van de vogels is op leeftijd gebracht;hiervan (n=5972) was 10% 1^e kj. en 90% ad.

-Reuzenstern - *Sterna caspia* (CDNA)

29 sept Nwijk 1 ad.Z

-Dwergstern - *Sterna albifrons*

Met slechts 304 exx. was naj.84 een dieptepunt in de CvZ-annalen(uurgem.naj.80/83:1.1;7.6;0.7;0.4 vs. naj.84:0.2).30% werd in Wd gezien,40% in NH en 30% in ZH.Dwergsterns werden in juli, aug,maar vooral in sept gezien.De laatste waarn. vielen op: 3 okt Egm 1 N 8 okt Hbz 4 Z
4 okt Schev 4 Z 28 okt Tex 1 Z
71% van de vogels vloog naar Z.

-Zwarte Stern - *Chlidonias niger*

Ook voor deze soort betrof naj.84 een buitengewoon slecht najaar(uurgem.naj.80/83:0.8;0.6;1.2;0.4 vs.naj.84:0.4).12% van de Zwarte Sterns werd in Wd gezien,23% in NH en 65% in ZH(n=525).De Zwarte Stern werd tot en met sept af en toe gezien,het meest nog in sept.In okt is de soort op 10 dagen waargenomen,in nov tweemaal:4 nov IJm 1 Z;9 nov Schev 2 N.Er was slechts één goede dag:8 sept Schev(5 uur) 146 Z,1 N.74% van de vogels vloog naar Z.

6.11.Steltlopers-Charadriidae

-Scholekster - *Haematopus ostralegus*

3848 exx. was de schamele opbrengst aan Scholeksters van naj.84.14% hiervan werd in Wd gezien,38% in NH en 48% in ZH.De soort is het gehele najaar door waargenomen,zonder duidelijke trekgolven. Slechts één goede dag:

29 juli Schev(2½ uur) 326 Z,1 N.

In Wd(n=528) vloog 54% naar Z(W) en verbleef 38% tp.,in NH(n=1461) resp.22% en 42% en in ZH(n=1875) resp. 82% en 8%.

-Kievit - *Vanellus vanellus*

Voor de Kievit was naj.84 uitzonderlijk goed(n=32559).2% hiervan werd in Wd gezien,31% in NH en 67% in ZH.De tweede week van juli leverde al enige trek op,terwijl ook de laatste week van aug een trek golfje te zien gaf.Zeer sterke trek trad op rond half sept;eind sept en de tweede helft van okt leverden ook nog enige trek op.Voorts werden in de eerste helft van nov en in begin dec wederom indrukwekkende aantallen wegtrekkend waargenomen.Vrijwel alle trekbewegingen vielen samen met ZO-wind en rustig weer,vanaf nov doorgaans ook nog gepaard gaande met invallende koude.Praktisch alle vogels vlogen naar Z(99.9%).Beste dagen: 16 sept Hbz(4 uur) 4609 Z 9 nov Schev(2 uur) 1559 Z
Schev(4 uur) 1660Z 1 dec Hbz(4 uur) 4092 Z
8 nov Schev(2 uur) 1284 Z IJm(1 uur) 2895 Z
9 nov Nwijk(1 uur) 1480 Z Schev(6 uur) 7941 Z

-Zilverplevier - *Pluvialis squatarola*

Er zijn weinig Zilverplevieren gezien(n=454).In NH en ZH is de soort in alle maanden gezien,in Wd t/m okt.Een redelijke dag:9 sept Hbz(1 uur) 40 Z.

-Goudplevier - *Pluvialis apricaria*

De Goudplevier is,in tegenstelling tot enkele andere soorten,die ook typerend zijn voor oostelijke stromingen en cold-rushes,niet opmerkelijk veel gezien(n=1273).86% van de vogels is in ZH gezien, voornamelijk tijdens de invallende koude van begin dec:1 dec Nwijk(2 uur) 142 Z;Schev(5 uur) 667 Z.De soort is overigens in alle maanden van het najaar waargenomen.

-Bontbekplevier - *Charadrius hiaticula*

Met slechts 588 exx. was ook de Bontbekplevier dit najaar zeer spaarzaam vertegenwoordigd.Van juli t/m sept zijn de meeste vogels gezien,met name in sept.Het overgrote deel van de vogels werd in ZH gezien(78%).Een redelijke sept-dag:2 sept Hbz(4 uur) 27 Z;Schev(4 uur) 116 Z;WestK(3 uur) 27 Z. Er waren 7 okt- en één nov-waarn.:10 nov Hbz 1 N.

-Kleine Plevier - *Charadrius dubius*

15 sept Hbz 1 N

-Steenloper - *Arenaria interpres*

Met 2583 exx. was dit een gemiddeld najaar voor deze soort.De Steenloper werd het gehele najaar door gezien,zonder dat er van gerichte trek sprake leek te zijn.De meeste exx. verbleven ter plaatse.In Wd zijn vrijwel geen Steenlopers gezien(n=41); hiervan zat 0% tp.;in NH(n=2026) zat 86% tp. en in ZH(n=516) 74%.Flinke aantallen: 9 aug Hbz 526 tp. 10 nov Hbz 100 tp.
11 okt Huid 134 tp. 1 dec IJm 60 tp.

-Wulp - *Numenius arquata*

Ook de Wulp is weinig gezien in naj.84(n=697).De soort is in iedere maand waargenomen,zonder dat er duidelijke,aanwijsbare trekgolven optraden.89% van de vogels vloog naar Z.Redelijke dagen: 27 okt Hbz(4 uur) 184 Z 11 nov Schev(1 uur) 41 Z

-Regenwulp - *Numenius phaeopus*

Naj.84 leverde slechts 284 Regenwulpen op.Het merendeel van de vogels werd in ZH gezien(77%),met name in juli,maar ook af en toe in aug en sept. Beste dagen:27 juli Nwijk(1 uur) 112 Z
27 juli Schev(1 uur) 15 Z 12 sept Nwijk(1 uur) 15 Z

-Grutto - *Limosa limosa*

Slechts enkele waarn. uit juli en aug.

-Rosse Grutto - *Limosa lapponica*

Er werden slechts 1406 Rosse Grutto's waargenomen in naj.84. De soort werd voornamelijk gezien van juli t/m sept, terwijl Wd nog enkele okt-waarn. leverde. Er waren slechts 5 nov- en geen één dec-waarn. In Wd werd maar liefst 52% (n=597) van de vogels tp. genoteerd.

-Oeverloper - *Actitis hypoleucos*

Met 339 exx. was naj.84 een goed Oeverloper-najaar. 1% hiervan is in Wd gezien, 6% in NH en 93% in ZH. De soort werd van juli t/m sept gezien, met de hoogste aantallen rond eind juli/begin aug én in de derde week van aug. Maar liefst 60% van de Oeverlopers werd ter plaatse waargenomen. Beste dagen:
30 juli Schev (2 uur) 44 Z, 5 tp. 21 aug Schev 35 tp.
8 aug Schev (2 uur) 39 Z, 110 tp. 22 aug Schev 22 tp.

-Tureluur - *Tringa totanus*

Alweer een soort, waarvoor naj.84 lage aantallen te zien gaf (n=545). De Tureluur is in iedere maand waargenomen, maar het meest in de eerste helft van het najaar. Er was geen sprake van opvallende verplaatsingen. Redelijke dagen:
14 juli Nwijk (1 uur) 27 Z 25 aug Hbz (3 uur) 37 N
8 aug Schev (2 uur) 31 Z 2 sept WestK (2 uur) 31 Z
16 aug Hbz (1 uur) 47 Z

-Zwarte Ruiter - *Tringa erythropus*

Met 'maar liefst' 31 exx. gaat naj.84 te boek als een zeer goed Zwarte Ruiter-najaar. Van juli t/m sept is de soort zesmaal in ZH, vijfmaal in NH en niet in Wd gezien. Beste dag: 28 sept Schev (1 uur) 8 Z.

-Groenpootruiter - *Tringa nebularia*

Naj.84 was een gemiddeld Groenpootruiter-najaar (n=109). 32% werd in Wd gezien, 45% in NH en 23% in ZH. De soort werd zeer verspreid waargenomen van juli t/m sept. Slechts één opmerkelijke dag: 9 juli Tex (2 uur) 30 Z.

-Bosruiter - *Tringa glareola*

2 aug Schev 1 Z

-Witgatje - *Tringa ochropus*

8 juli Hbz 2 Z 9 aug Tersch 1 W
8 aug Tersch 1 O 21 aug Hbz 6 Z

-Kemphaan - *Philomachus pugnax*

11 aug Schev 18 N 16 sept Hbz 2 Z
2 sept WestK 1 Z

-Watersnip - *Gallinago gallinago*

Met 1093 exx. was naj.84 een goed najaar voor de Watersnip. Hiervan is 7% in Wd gezien, 66% in NH en 27% in ZH. Er was een enkele juli- en aug-waarn., terwijl met name de tweede helft van sept flinke trek te zien gaf. In okt werd de soort slechts af en toe gezien, in nov en begin dec weer wat regelmatig. De trek van de Watersnip in het najaar langs onze kust vertoont sterke overeenkomst met die van soorten als Kokmeeuw, Kievit en Goudplevier, die met name tijdens rustige oostelijke stromingen en invallende koude hun opwachting langs de kust maken. 91% van de vogels vloog naar Z. Goede dagen:
16 sept Hbz (4 uur) 298 Z 30 sept Hbz (5 uur) 51 Z
29 sept Hbz (4 uur) 202 Z 1 dec Schev (3 uur) 89 Z
Egm (1 uur) 20 Z WestK (1 uur) 27 Z

-Bokje - *Lymnocyptes minimus*

1 dec Schev 3 Z

-Kanoetstrandloper - *Calidris canutus*

Voor de Kanoet was naj.84 een gemiddeld najaar (n=1268). Hoewel de soort in alle maanden is waargenomen, leverden sept en okt de hoogste aantallen op:
2 sept Schev (4 uur) 89 Z 21 okt Schev (4 uur) 219 Z
21 okt Hbz (2 uur) 76 Z 27 okt Schev (1 uur) 95 Z

-Paarse Strandloper - *Calidris maritima*

Met 483 exx. was naj.84 niet uitzonderlijk. Zo-als gebruikelijk verbleven de meeste Paarse Strandlopers ter plaatse (86%). Vanaf aug is de soort maandelijks gezien, met name in nov en dec. In Wd zijn geheel geen Paarse Strandlopers waargenomen. Aardige dagen en aantallen:
22 sept WestK (2½ uur) 16 Z 7 dec Huisd 40 tp.
28 okt Hbz (1 uur) 15 Z 16 dec Schev 40 tp.
16 nov IJm 36 tp. 29 dec Huisd 70 tp.
5 dec Schev 33 tp.

-Bonte Strandloper - *Calidris alpina*

Voor het Bontje was naj.84 een matig najaar (n=2938). De soort is in iedere maand gezien. Met name in sept en okt kon Z-waartse trek waargenomen worden; in nov werd alleen in ZH nog enige noemenswaardige verplaatsing vastgesteld. Aardige dagen:
29 sept Hbz (4 uur) 77 Z 20 okt Castr (4 uur) 113 Z
30 sept Hbz (6 uur) 74 Z 21 okt Hbz (4 uur) 116 Z
16 okt Hbz (2 uur) 60 Z 3 nov Schev (2 uur) 442 Z
18 okt Hbz (2 uur) 76 Z 14 nov Schev (2½ uur) 152 Z

-Krombekstrandloper - *Calidris ferruginea*

26 aug Bloem 3 Z 3 okt Schev 3 Z
11 sept Schev 1 Z 6 okt IJm 1 tp.
16 sept Hbz 1 N 2 nov Schev 3 Z
30 sept Hbz 1 Z

-Kleine Strandloper - *Calidris minuta*

Er waren 1 juli-, 2 aug- en 8 sept-waarn. Verder nog: 20 okt Nwijk 1 Z; 8 nov Schev 1 tp.; 3 nov Schev 2 Z.

-Drieteenstrandloper - *Calidris alba*

De Drieteenstrandloper is dit najaar maar weinig gezien (n=1712). De soort is in alle maanden waargenomen, zonder dat er sprake was van noemenswaardige trekbewegingen. In Wd en ZH zijn de meeste exx. tp. genoteerd. Hoogste aantallen:
11 aug Tersch 81 tp. 24 dec Schev 58 tp.
17 nov Tex 70 tp.

-Rosse Franjepoot - *Phalaropus fulicarius*

*21 okt Maasvl 1 Z 18 nov IJm 1 tp.
28 okt Hbz 1 tp. 10 dec Schev 1 Z
3 nov Schev 1 Z

-franjepoot spec. - *Phalaropus spec.*

27 okt Huisd 1 Z

-Kluut - *Recurvirostra avosetta*

Zoals gebruikelijk in het najaar zijn er nauwelijks Kluten gezien (n=30). In Wd werd de soort zelfs helemaal niet gezien.

6.12. Alkachtigen - *Alcidae*

-Alk/Zeekoet - *Alca torda/Uria aalge*

Naj.84 betrof het beste najaar tot nog toe voor de 'alk/zeekoet' (n=4823; uurgem. naj.80/83:2.4; 0.8; 1.2; 1.3 vs. naj.84:3.3). Hiervan is 12% in Wd gezien, 65% in NH en 23% in ZH. De eerste vogels werden gezien op: 2 juli Castr 1 N; 13/22 aug Schev

1 A tp.;15 aug Schev 1 Z tp.;25 aug Hbz 1 N;28 aug Tex 1 Z Z;28 aug Hbz 1 Z;31 aug Tex 1 Z.Tot okt werd de 'alk/zeekoet' slechts af en toe gezien.In begin okt kwam de 'trek' op gang,met meteen een explosieve verplaatsing op 6(en 7) okt:

6 okt Tex(7 uur) 1 Z,80 N,1 tp.
Hbz(8 uur) 1 Z,2145 N,2 tp.
(resp.8,113,455,687,203,313,252 en 114 N)
Castr(1½ uur) 165 N
Nwijk(3 uur) 139 N,5 tp.
Schev(3 uur) 130 N
WestK(3 uur) 25 N

7 okt Tex(4 uur) 1 Z,150 N

Op 6 okt is aan de Hbz 68% van het NH-totaal(n=3141) gezien,als indicatie van het gepekte voorkomen van de 'soort' dit najaar.In de rest van okt werden nog regelmatig 'alk/zeekoeten' waargenomen, echter doorgaans in kleine aantallen.Ook in nov is de 'soort' regelmatig gezien,vooral in de eerste (NH,ZH) en de derde week(NH).In dec namen de aantallen snel af in NH,in ZH blijft de 'alk/zeekoet' een regelmatige verschijning,terwijl in Wd alleen 1 dec nog aantallen oplevert.In Wd(n=574) vloog 41% naar Z,in NH(n=3141) 6% en in ZH(n=1108) 50%. Overige goede dagen:

27 okt Hbz(4 uur) 30 Z,131 N,6 tp.

2 nov Schev(3 uur) 57 Z,1 N,2 tp.

3 nov Schev(2 uur) 64 Z

4 nov Hbz(3 uur) 8 Z,61 N

Schev(3 uur) 68 Z,7 N,7 tp.

14 nov Schev(2 uur) 52 Z,1 N,1 tp.

24 nov Hbz(6 uur) 20 Z,69 N

1 dec Tex(3 uur) 63 Z,1 N,1 tp.

Van de 4823 waargenomen 'alk/zeekoeten' is in totaal 6% op soort gedetermineerd;hiervan(n=283) was 15% Alk en 85% Zeekoet.In Wd is 7% van de vogels op naam gebracht(n=574;A:Z=1:12.7),in NH 3%(n=3141;A:Z=1:6.7) en in ZH 13%(n=1108;A:Z=1:4.5).

-Kleine Alk - *Alle alle*

6 okt Hbz 1 N 20 nov Tex 2 Z
*20 okt Schier 1 O Hbz 1 N
Hbz 1 N 26 nov IJm 1 Z

-Papegaaiduiker - *Fratercula arctica*

6 okt Hbz 1 N 20 nov Hbz 3 Z,3 N
7 okt Hbz 1 N 24 nov Hbz 1 N
21 okt Hbz 1 N 25 nov Hbz 1 N,1 tp.
27 okt Hbz 1 Z * IJm 1 N
3 nov Hbz 1 Z 7 dec Hbz 1 Z
4 nov Hbz 5 N Schev 1 Z
*11 nov Schev 2 Z

-Zwarte Zeekoet - *Cephus grylle* (CDNA)

20 nov Hbz 1 ad.Z

6.13.Roofvogels en Uilen-Accipitridae&Strigidae

-Visarend - *Pandion haliaetus*

16 sept Schev 1 Z 17 sept Monster 1 Z

-Sperwer - *Accipiter nisus*

De Sperwer is hoofdzakelijk in ZH gezien,van half sept t/m eind dec,met name in eind okt/begin nov. Beste dag:12 nov Schev 13 Z.

-Buizerd - *Buteo buteo*

12 nov Schev 1 Z 15 nov Schev 1 Z

-Ruigpootbuizerd - *Buteo lagopus*

1 dec Hbz 1 Z

-Wespendief - *Pernis apivorus*

9 nov Schev 1 N

-Bruine Kiekendief - *Circus aeruginosus*

Er waren 1 aug- en 6 sept-waarn.

-Blauwe Kiekendief - *Circus cyaneus*

Van half sept t/m eind dec vooral in ZH waargenomen;de meeste exx. werden rond eind okt/begin nov en in begin dec gezien.Beste dag:1 dec Schev 9 Z,1 N.

-Slechtvalk - *Falco peregrinus*

6 okt WestK 1 Z 15 dec Schev 1 Z

-Boomvalk - *Falco subbuteo*

De Boomvalk is vijfmaal in aug en tienmaal in sept gezien,met als max.:16 sept Hbz 1 Z,3 tp. Er was één okt-waarn.:13 okt Schev 1 Z.

-Torenvalk - *Falco tinnunculus*

De Torenvalk is het gehele najaar door gezien; echter het voorkomen was zeer gespreid over de maanden en betrof geen noemenswaardige aantallen.

-Smelleken - *Falco columbarius*

Er waren 9 waarn.,waarvan 4 in sept,3 in okt,1 in nov en 1 in dec.

-Velduil - *Asio flammeus*

10 sept Schev 1 tp. 3 nov Schev 1 tp.
3 nov IJm 1 tp. 15 nov Schev 1 tp.

6.14.Zeezoogdieren

-Gewone Zeehond - *Phoca vitulina*

30 sept Hbz 1 tp. 17 okt Schier 1 tp.
3 okt Tersch 1 tp. 19 okt Schier 1 tp.
7 okt Schev 1 tp. 26 nov IJm 1 tp.

-Bruinvis - *Phocoena phocoena*

22 sept Hbz 1 tp.