

NIEUWE UITGAVEN

boeken

Weidevogels in beeld Het IVN heeft tesamen met de KNNV-uitgeverij een klein boekje laten verschijnen over weidevogels. Behandeld worden 15 soorten weidevogels: hoe zien ze eruit, wat eten ze, hoe gedragen ze zich, waar broeden ze enzovoorts. Het aardige is dat niet alleen geput is uit de 'traditionele weidevogels' als Kievit, Grutto, Slobbeend en Veldleeuwerik, maar ook andere vogels die veel op graslanden te vinden zijn, naar voren zijn gehaald zoals Zwarte kraai en Spreeuw. Leuk voor mensen die voor het eerst met (weide)vogels in aanraking komen, ook door de handige uitklaplaat met vogelafbeeldingen.

Jan van Gelderen 1997. Weidevogels in beeld. KNNV uitgeverij, f 9,95 (f 8,95 voor KNNV- en IVN-leden. ISBN 90 5011 106 8.

Veldgids Libellen Voor het eerst is er een veldgids van libellen in Nederland verschenen met kleurenfoto's als blikvangers voor herkenning. De gids is uitgegeven door de KNNV. Eindelijk een gidsje voor een oppervlakkige insectenwaarnemer als ik. Ik had al wel een 'wetenschappelijk verantwoorde' libellenveldgids met veel gegevens, zwartwit-keningen en Latijnse namen, maar die stimuleerde mij totaal niet om libellen op naam te brengen. Met dit nieuwe gidsje in de hand heb ik vorig najaar toch maar even mooi de Paardenbijter-invasie meegenomen op ons erf en de Houtpantserjuffer en Steenrode heidelibel op naam gebracht. Halleluja! Eindelijk Nederlandse namen. Bijten Paardenbijters paarden? Ik zou het niet weten, maar de naam alleen al stimuleert me. Een schitterende gids die ik iedere veldman en veldvrouw zou aanraden!!!

Frank Bos & Marcel Wasscher 1997. Veldgids Libellen. KNNV uitgeverij. Prijs, f 49,95, voor leden f 42,95. ISBN 90 5011 101 7

rapporten

Vossen in het Fochteloërveen H. Feenstra schreef een verslagje over de vossenbevolking in het Fochteloërveen. In 1996 werden 7 burchten gevonden. De dichtheid van het aantal vossen territoria was 0,4 per 100 ha, in dezelfde orde van grootte als in het onderzoek van Bijlsma en Quist in 1993 en 1994. Het aantal Kieviten-territoria in de periode 1992-1996 daalde niet, van de Wulp wel. Afijn, lees verder zelf maar.

H. Feenstra 1997. Vossen in het Fochteloërveen. Nadere informatie bij de schrijver: Fochteloërveen 10, 8428 RR Fochteloo

Broedvogelmonitoring in de Riperkrite (1992)-1996 Het verslag is afkomstig van Romke Kleefstra. Hij komt met een overzicht van BMP-broedvogelinventarisaties in een aantal Staatsbosbeheer-reservaten in het klei-op-veen gebied de 'Riperkrite': de Warren, de Slûshoeke, de Frieswykpolder en de Tjalleberterkrite. Vooral de Warren blijkt een optimaal weidevogelreservaat waar naast grote aantallen Kieviten en Grutto's ook Watersnippen en een enkele maal de Kempphaan broedt. Het rapport introduceert tevens een voor vrijwilligers niet zo gebruikelijke indeling in 'ecologische vogelgroepen', waarin vogel worden gekoppeld aan landschapstype. Hoewel dit aspect enigszins blijft steken, toch een interessante aanzet.

Romke Kleefstra 1997. Broedvogelmonitoring in de Riperkrite (1992)-1996. Het rapport is vast wel verkrijgbaar bij de schrijver Sinnebuorren 34, 8491 EH Akkrum