

trivitattus heb ik beiden wel eens rond een wijfje zien vliegen, maar zonder de vlinderachtige vlucht zoals *Anasymia lineata* dat doet. Zowel bij *Eristalinus aeneus* als bij *E. sepulchralis* heb ik ook gezien. Het mannetje blijft met zijn hoofd naar het wijfje vliegen, met het achterlijf iets boven het horizontale vlak tussen de vleugels.

Het gedrag binnen het genus *Eristalis* is zeer divers. *Eristalis pertinax*, *E. tenax* en soms *E. horticola* staan vaak hoog te zweven op open plekken en langs bosranden. *E. nemorum* hangt laag boven een vrouwtje, totdat hij een kans krijgt om te paren. Soms zie je wel 3-5 mannetjes boven een vrouwtje.

Wederom, deze lijst is zeker niet uitputtend, en nog veel details moeten een keer goed bekeken worden. Zijn er hoogtes waartussen soorten vliegen, of is de variatie die we waarnemen voornamelijk gerelateerd aan de hoogte waarop we waarnemingen doen?

Willem Renema
Langegracht 73
2312 NW Leiden
Renema@naturalis.nnm.nl

LITERATUUR

- Reemer, M. 1999. Faunistiek en ecologie van het genus *Epistrophe* in Nederland (Diptera, Syrphidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 8: 33-66.
- Renema, W. 1993. *Criorhina*, behaviour and habitat in Limburg (Diptera: Syrphidae). - *Stridula* 17(2): 53-54.
- Stubbs, A.E. en S.J.Falk 1983. British hoverflies. - BENHS, London.
- Zeegers, T. en T. van Haren 2000. Dazen en dazenlarven. - Wetenschappelijke Mededelingen KKNV 225.

Waarnemingenrubriek

Momenteel is het weer nogal zweefvlieg-onvriendelijk. Wel zag Jan Degenaar op 11 december in de tropische kas van de Harense Hortus een mannetje *Eristalis tenax*