

Hulpjes bij het determineren V

Zweefvliegproblemen?

Voor het zweefvliegenproject is het van belang dat determinaties zo betrouwbaar mogelijk gebeuren, en dat bovendien iedereen de soorten op dezelfde manier determineert. Vandaar dat de zweefvliegencommissie in deze rubriek iedere keer aandacht wil geven aan groepen zweefvliegen die niet altijd even makkelijk te determineren zijn. Inmiddels passeerden *Leucozona*, *Eristalis*, *Eupeodes*, *Cheilosia bergenstammi* c.s en *Platycheirus clypeatus/ scambus* de revue. In deel V bespreekt John Smit het genus *Sphegina*.

Voor onopgeloste problemen kunnen je je wenden tot de 'helpdesk': Wouter van Steenis :

(w.vansteen@natuurmonumenten.nl)

of Theo Zeegers (th.zeegers@tref.nl)

Het genus *Sphegina*

John T. Smit

INLEIDING

Tijdens collectiewerk is gebleken dat er toch nog aardig wat fouten worden gemaakt bij de determinatie van soorten van het genus *Sphegina* Meigen, 1822. Dit geldt met name voor de vrouwtjes, maar ook voor mannetjes die niet aan de hand van de genitaliën gecontroleerd zijn.

Doczkal (1995) heeft een goede tabel geschreven voor de vrouwtjes. In onderstaande tabel is vrijwel alleen gebruik gemaakt van structuurkenmerken voor de vrouwtjes en genitaalkenmerken voor de mannetjes. Dit maakt de tabel een stuk moeilijker dan de gemiddelde *Sphegina*-tabel, maar ook een stuk betrouwbaarder.


Dit artikeltje is een verkorte versie van een artikel dat vermoedelijk in Nederlandse Faunistische Mededelingen gepubliceerd gaat worden komend jaar (Smit in prep).

NAAMSVERANDERINGEN

Er zijn vijf soorten van dit genus bekend uit Nederland. Twee van deze soorten zijn, min of meer, recent van naam veranderd. In onderstaande lijst zijn de huidige en oude namen opgenomen, met een verwijzing naar de literatuur.

De Nederlandse soorten van het genus *Sphegina*:

Huidige naam	Synoniem
<i>Sphegina clavata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Sphegina nigra</i> Meigen, 1822
<i>Sphegina clunipes</i> (Fallén, 1817)	
<i>Sphegina elegans</i> (Schummel, 1843)	<i>Sphegina kimakowiczii</i> Strobl, 1897
<i>Sphegina sibirica</i> Stackelberg, 1953	
<i>Sphegina verecunda</i> Collin, 1937	



Figuur 1: Zijkant van het borststuk van *Sphegina elegans*, de onderdelen die in de tabel gebruikt worden zijn hierin aangegeven.

DETERMINATIE

Allereerst moet gezegd worden dat aan kleurkenmerken geen grote waarde gehecht moet worden. Het blijkt namelijk dat naast *Sphegina elegans* ook *S. sibirica* en *S. verecunda* gele schouderknobbels kunnen hebben. Ook de kleur van het gezicht wijkt nogal eens af van hetgeen beschreven staat in de tabellen, zelfs bij *S. clavata* en *S. verecunda* is het gezicht soms lichter op de onderste helft.

Onderstaande tabel is gebaseerd op Doczkal (1995), Van der Goot (1981) en Verlinden (1991).

1a Metasternum achter coxae 3 breed met een licht golvende achterrand, sterniet 1 sterk gereduceerd of helemaal afwezig (zie fig. 3!). Vr: sterniet 3 rechthoekig met evenwijdige zijranden. Mn: genitaal, surstyli naar elkaar toegebogen (fig. 9).

Sphegina (Asiosphegina) sibirica Stackelberg, 1953

Mn & vr: Katepisterniet voor het grootste deel, anepisternum aan de achterrand en anepimeron in het midden, onbestoven. De kleur van deze soort is zeer variabel, van vrijwel geheel geel (var. *flavescens* Stack.) tot geheel zwart, met alle overgangsvormen.

1b Metasternum achter coxae 3 smal met een diepe driehoekige of boogvormige insnijding, sterniet 1 niet gereduceerd en altijd (duidelijk) aanwezig (fig. 2) (bij sommige ex. van *S. elegans* is de kleur van sterniet 1 geel waardoor het soms erg moeilijk te zien is en het soms lijkt alsof het afwezig is, let dan op de vorm van het metasternum, deze heeft een duidelijke boogvormige insnijding).