

Les Blattes en Wallonie (Dictyoptera)

Hendrik Devriese

Les Blattes forment un groupe d'insectes méconnus en Belgique. Jusqu'à présent, même le nombre d'espèces indigènes n'était pas connu. Les espèces importées, qui sont nuisibles dans les maisons et dans les magasins, sont mieux étudiés, mais il manque également un aperçu général des espèces en Belgique. J'ai eu la possibilité d'étudier la collection de la Faculté de Sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, qui contient un nombre assez important d'exemplaires capturés en Belgique, principalement dans la partie sud du pays. Cette collection comporte onze espèces, dont seulement quatre sont indigènes.

Ectobius pallidus (OLIVIER, 1789)

Dispersé dans la partie sud du pays: Givroulle, Hockai, Huy, Landelies, St-Servais.

Ectobius lapponicus (LINNE, 1758)

Cette espèce a été confondue dans le passé avec *E. sylvestris*, de sorte que toutes les données de la littérature sont à vérifier. Dispersé dans le sud du pays: Beauwelz, Heure-en-Famenne, Lustin, Medendorf, Rochefort, Sorinne, Soumagne, Spy.

Ectobius sylvestris (PODA, 1761)

Commun, surtout en Moyenne-Belgique : Baisy-Thy, Betrix, Cornesse, Couvin, Elsenborn, Esneux, Gembloux, Grand-Halleux, Les Epioux, Mont-Gauthier, Ottignies, Our, Tillf, Villers-la-Ville, Wavre. La plupart des exemplaires appartiennent à la forme à pronotum foncé (f. *sylvestris*), mais il existe également quelques exemplaires moins foncés (f. *discrepans*).

Ectobius panzeri STEPHENS, 1835

Cette espèce n'a pas encore été trouvée dans le sud du

pays. Elle est connue de la côte (p. ex. Lombardsijde) et de Campine (p. ex. Opoeteren).

Espèces importées et acclimatées

Blatta orientalis LINNE, 1758

Encore assez commune : Ciney, Gembloux, La Hulpe, Martelange, Namur, Neuville, Rochefort, Soignies, Spa, Vresse, Wavreille.

Periplaneta americana (LINNE, 1758)

Parfois importé : Gembloux.

Periplaneta australasiae (FABRICIUS, 1775)

Parfois importé : Bouge.

Periplaneta sp.

Il y a un exemplaire dans la collection qui n'appartient pas à une des deux espèces citées ci-dessus. Elle a été capturée à Dison.

Blatella germanica (LINNE, 1767)

Très commun dans tout le pays.

Supella longipalpa (FABRICIUS, 1798)

Quelques exemplaires appartiennent à cette espèce qui est devenu nuisible ces dernières années : Etterbeek, Wavre, Woluwe-St-Lambert.

Panchlora sp.

Une blatte de couleur verte, importée avec des bananes.


Samenvatting

Kakkerlakken in Wallonië

De kakkerlakken (Dictyoptera) zijn nog slecht onderzocht in België. De verzameling van de Faculté de Sciences agronomiques de l'Etat te Gembloux werd onderzocht en bleek elf soorten kakkerlakken te bevatten. Vier soorten zijn inheems in België, maar één ervan (*Ectobius panzeri*) werd nog niet buiten de kust en de kempen aangetroffen. De algemeenste soort blijkt *Ectobius sylvestris* te zijn, terwijl ook *Ectobius lapponicus* en *E. pallidus* her en der verspreid voorkomen. Twee soorten ingevoerde kakkerlakken konden niet tot op soort gedetermineerd worden.

adresse de l'auteur:

Institut royal de Sciences naturelles de Belgique
Rue vautier 29, 1040 Bruxelles



Ectobius lapponicus ♀. Uit: Willemse, C. 1917. Orthoptera Nederlandica. Tijdschrift voor Entomologie 60: 1-176.