

Opmerkelijke waarnemingen

Gryllus campestris

Limburg: Meinweg (R. Kleukers, T. Peeters & J. Winkelman 1991)

Metrioptera roeselii

Noord-Brabant: Steenberg (H. Gaasbeek; J. Musters 1991)

Leptophyes punctatissima

Noord-Holland: Texel (E. van de Spek 1990)

De eerste vondst van deze soort op de Waddeneilanden (zie: Bröring, U., R. Niedringhaus & C. Ritzau, 1990. Die Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben der

Ostfriesischen Inseln (Orthopteroidea: Saltatoria, Dermaptera, Blattodea. Abh. Naturw. Verein Bremen 41: 87-96).

Chrysochraon dispar

Noord-Brabant: Liempde (I. Raemakers 1990 & 1991)

De eerste vondst van deze soort in Noord-Brabant, in vochtig populierenbos.

Limburg: Heelderpeel (R. Kleukers 1991)

Utrecht: Botshol (B. Odé 1991)

De eerste vindplaats van de Gouden sprinkhaan in de provincie Utrecht.

Stethophyma grossum

Utrecht: Westbroek (K. Uilhoorn; H. Wolters 1991)

Chorthippus mollis

Zeeland: Hulst (J. Musters 1991)

Gelderland: Bergherbos (J. Musters 1991)

Flevoland: Zuigerplaspark & Houtribhoogte (J. Wieringa 1990)

Stenobothrus stigmaticus

Limburg: Beegderheide e.o. (R. Kleukers; F. & I. Raemakers 1991)

Een zeldzame soort in Noord-en Midden-Limburg; na twintig jaar weer teruggevonden.

R. Kleukers

Oedipoda caerulescens in Oost-Brabant.


In het kader van het sprinkhaneninventarisatie project "sprinkhanen en krekels van Nederland" heb ik afgelo-

pen zomer o.a. delen van Oost-Brabant geïnventariseerd.

Tot mijn verbazing heb ik daarbij op verschillende plaatsen *Oedipoda caerulescens* aangetroffen (zie kaartje). Het biotoop waarin ik de soort vond betreft in enkele gevallen recentelijk geplagde droge hei. Op een plaats is het een stukje hei van slechts 20 bij 40 meter. Echter de meeste vindplaatsen zijn kapvlakten. Een deel hiervan is aangeplant met eik het andere deel bestaat uit kapvlakten met een opslag van berk, braam en hei. In alle gevallen betreft het plaatsen met veel open plekken met kaal zand en strooisel. De open plekken hebben een oppervlakte van minimaal 2 x 2 meter en worden de gehele dag door de zon beschenen.

Omdat ik op deze kapvlakten ook veel andere soorten heb aangetroffen (*Chorthippus biguttulus*, *C. brunneus*, *C. mollis*, *C. parallelus*, *Myrmeleotettix maculatus*, *Omocestus rufipes*, *Metrioptera brachyptera*, *Meconema thalassinum*, *Tettigonia viridissima*) is het zeer de moeite waard ook dit biotoop eens te bezoeken.

Jack Musters



Nieuwe vindplaatsen van *Oedipoda caerulescens* in de Peelstreek