

Verenigingsnieuws

Mijlpaal

Op 5 december 1999 vond Dirk Kuiken tussen Zurich en Harlingen (NSO telling 99.314) een oud kadaver van een niet met olie besmeurde Noordse Stormvogel *Fulmarus glacialis*. Deze vondst, op de 6324ste ingestuurde olieslachtoffertelling, na het afleggen van in totaal 46.370,1 km langs de Nederlandse Noordzee- en Waddenkusten, betrof het 200.000ste kadaver dat in het archief van de *werkgroep Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek van de Nederlandse Zeevogelgroep* (NZG/NSO) werd opgenomen.

Ter vergelijking, het 100.000ste kadaver werd gevonden door Kees Camphuysen op 6 mei 1985 tussen Wijk aan Zee en Castricum (telling 85.099), een oud kadaver van een Zeekoet, voor 5% met olie overdekt, op de 2750ste ingestuurde telling na het afleggen van 21.682.05 km. Van de eerste 100.000 gevonden vogels, dus tot aan de zomer van 1985, was 69.5% met olie besmeurd. Van de 100.000 sindsdien gevonden vogels (1985-1999) was 37.3% met olie besmeurd, bijna een halvering in vergelijking met de eerdere vondsten. Er is inmiddels wel het één en ander veranderd!

C.J. Camphuysen, coördinator NZG/NSO, Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel, 0222 318744, kees.camphuysen@wxs.nl

MEDEDELINGEN

Steller's Eiders *Polysticta stelleri* en warnetten in de Oostzee

Uit Litouwen komt het bericht, dat de zeldzame Steller's Eiders *Polysticta stelleri* daar in toenemende mate in warnetten verdrinken. Het goede nieuws is, dat de aantallen overwinteraars daar toenamen: van 11 in 1969 tot zo'n 2000 overwinteraars in de jaren 90. Tot voor kort zaten de vogels daar in een door Russische militairen bestierde, ontoegankelijke kuststrook. Sinds 1992 heerst echter ook daar de markteconomie, en worden de kustwateren 'ontwikkeld'. Er zijn nu acht privé visserij-ondernemingen die temidden van de eenden met warnetten vissen. Het logische gevolg is, dat steeds meer Steller's Eiders in die netten omkomen, zo laten tellingen van kadavers op de stranden zien. De soort is in Litouwen nog niet beschermd, wel uit de jacht gehaald.

Bron: Zydelis & Skeiveris 1999. Increasing conflict between gill-net fishery and Steller's Eiders wintering along the Lithuanian coast. Wetlands International Seaduck Specialist Group Bulletin 8: 9-11.

Kolonie Jan van Genten *Morus bassanus* op Helgoland blijft groeien

De Jan van Gent blijft het goed doen in de nog jonge kolonie van Helgoland, in de Duitse Bocht.: na 'verkenningen' in 1990 en de vestiging in 1991 (zie Sula 5: 61; 1991) is er langzaam maar zeker een toename in aantallen broedparen geweest tot 38 paar in 1998 en 70 paar in 1999. Een verdere stijging ligt voor de hand: het plafond lijkt nog niet in zicht!

Ommo Hüppop, Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland"