

middelste zaagbek verdrinken er zelfs vier keer zo veel als er ooit worden geteld. Het IJsselmeer als 'sink'! Het rapport biedt ook nog enige hoop op verbetering: door een slimmer ingerichte visserij, andere vistuigen en vooral het sluiten van de meest watervogel-rijke gebieden, kan een sterke verbetering (gesproken wordt van een reductie in sterfte van 70%) worden bereikt. Het rapport is fraai uitgevoerd en een *must* voor iedereen die denkt dat het wel goed zit met de bescherming van de watervogels in Nederland! **MFL**

CONGRESSEN

Op 25 november is er weer de **landelijke dag** van **SOVON**. Deze wordt samen georganiseerd met de VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en Fauna). Locatie: Concertgebouw 'De Vereniging', Keizer Karelplein, Nijmegen. We willen een tafel met NZG-materiaal inrichten. Vanuit het bestuur wil Jan-Andries van Franeker proberen de stand te bemannen, maar hulp van de leden hierbij wordt zeer op prijs gesteld. Dus: ga je naar de SOVON-dag en ben je NZG-lid, neem dan even contact op met:

Jan Andries van Franeker, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild, tel.: 0222-310422.

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN: GERINGDE ZEEVOGELS

Uitwisseling over geringde (zee)vogels via internet

Per 18 augustus 2000 is er een nieuw internetadres 'in de lucht' waarop nieuwtjes over kleurmerken van vogels worden uitgewisseld. Inschrijven kan op: cr-birding@egroups.com. De bedoeling van deze groep is te komen tot uitwisseling van gegevens en waarnemingen omtrent het kleurmerken van vogels, tussen waarnemers en degenen die de kleurmerken aanbrengen.

Jeroen van Waeyenberge. Jeroen.van.waeyenberge@instnat.be

Alk met Schotse ring gevonden

Een alk die in juli 1995 als nestjong op Canna, Schotland, werd geringd, werd op 13 februari 2000 dood teruggevonden op Texel. Als er onder de lezers van de Nieuwsbrief nog anderen zijn die geringde zeevogels hebben gevonden, dan graag even een berichtje hierover naar de redactie. **MFL**

Geringde zeekoet op strand Westenschouwen

Enkele van mijn collega's verwerken gegevens van vogelslachtoffers en andere dieren die door kantonniers worden gevonden op rijkswegen in Zeeland. In de voorlichting rond de registratie hiervan is ook aandacht besteed aan het controleren van vogels op ringen. Dit blijkt nuttig te zijn en ook elders toegepast te worden: van Anno van Dijke van de Dienstkring Deltakust ontvingen wij een ring van een op 10 december 1998 op het strand van Westenschouwen aangetroffen zeekoet. De terugmelding van deze Engelse ring liet meer dan een jaar op zich wachten, maar is wellicht aardig genoeg voor een korte vermelding. De vogel bleek ruim dertien jaar oud te zijn: geringd op 28 juni 1985 te Badbea, Helmsdale, Schotse Hooglanden. In Nederland gevonden zeekoeten zijn vrijwel allemaal afkomstig uit kolonies rond de Noordzee en de Ierse Zee (Speek & Speek 1984, De Wijs 1985). Opvallend is dat De Wijs (1985) tot de conclusie kwam dat in de massastranding van 1980/81 juist relatief veel zeekoeten zijn gevonden uit (onder andere) de regio waar ook de hierboven genoemde vandaan komt. In de winters daarvoor was de verdeling over verschillende regio's gelijkmatiger: tot en met 1981 waren er tien vogels uit dit gebied, waarvan negen uit 1980/81. Was de vogel uit december 1998 soms de voorbode van de massale stranding van zeekoeten in begin 1999 (Camphuysen 1999) en waren daarbij wéér veel Noord-Schotse vogels? Of waren dit keer zeekoeten uit een andere regio het slachtoffer?

Dank aan Anno van Dijke (RWS) en Kees Camphuysen.

Camphuysen C.J. 1999. Sterke opleving olieslachtoffer-onderzoek. Nieuwsbrief NZG 1(1): 6.

De Wijs W.J.R. 1985. Herkomst en leeftijd van zeekoeten *Uria aalge* in Nederland. Limosa 58: 61-64.

Speek B.J. & G. Speek 1984. Thieme's VogeltrekAtlas. Thieme, Zutphen.

Sjoerd Dirksen, Bureau Waardenburg, Postbus 365, 4100 AJ Culemborg