

Het wrak van de Erika is leeg. Probleem opgelost?

De Maltese tanker Erika, die op 12 december 1999 een grote olieramp veroorzaakte op de kusten van Bretagne en wijde omgeving, is inmiddels leeggepompt, dat wil zeggen, vrij van alle nog resterende olie. Het aantal omgekomen vogels is (nog) hoger dan verwacht. De Franse vogelbescherming (Ligue pour la Protection des Oiseaux, LPO) schat, in een oliespecial van L'Oiseau Magazine (december 2000) dat er 63.606 vogels bij de ramp waren betrokken: 33.528 zeekoeten en 22.463 'onbekend'. Van de laatste groep zal een grote meerderheid eveneens zeekoet zijn geweest, zodat ruim 50.000 zeekoeten zijn omgekomen. Andere opmerkelijke cijfers: minimaal 148 roodkeel- en 103 ijsduikers, 1177 jan-van-genten, 373 eiders (dachten we niet dat de Delta zo'n beetje de zuidpunt van de verspreiding was van deze soort?), 2130 zwarte zee-eenden, 148 middelste zaagbekken, 1 slechtvalk, 48 grote jagers, 1496 alken, 17 kleine alken, 350 papegaaiduikers, 3 ijsvogels. Langzaam wordt ook duidelijk wat de effecten op populatieniveau voor de zeekoeten zijn geweest. Chris Mead en Chris Wernham geven in de Seabird Group Newsletter van juni 2000 een eerste en zeer voorlopig overzicht van de Britse ringterugmeldingen. Er werden 60 'Britten' teruggemeld, waarvan de grote meerderheid van de Britse westkusten. Met name in West-Schotland zijn de verliezen groot, want juist van kolonies uit die streken stierven veel broedvogels in de olie. Zuidelijker waren er relatief meer jonge vogels onder de slachtoffers; vermoedelijk waren de adulten uit de kolonies al weer op de terugweg naar hun broedplaatsen ten tijde van de ramp, terwijl de meer noordelijke vogels nog in Frankrijk zaten. Mead & Wernham vermoeden op grond van deze eerste resultaten dat 5% van de broedpopulatie van de West-Schotse kolonies in de olie zal zijn omgekomen.

MFL

Een nieuwe wenkbrauwalbatros gezien

Er zitten wenkbrauwalbatrossen in de Noordzee, maar ondanks ruim 25 jaar intensief zeetrekten en 15 jaren varen in en rond de Nederlandse wateren staat deze soort nog steeds niet op de Nederlandse lijst. Pijnlijk, temeer daar verschillende landen om ons heen de soort wel 'hebben' (zie: Leopold M.F., Renner M. & Drees C., 1994. The Black-browed Albatross *Diomedea melanophris* in the North Sea. Sula 8: 268-272). Er is echter weer nieuwe hoop: op 11 juni 2000 werd een subadult (!) exemplaar gefotografeerd achter een vissersboot in het Kanaal, vijf kilometer ten westen van het eiland Jersey (bron: Birding World 13: 261). Blijven kijken dus!

Sub-adult Black-browed Albatross *Diomedea melanophris* with Lesser Black-backed Gulls *Larus fuscus* and Herring Gulls *L. argentatus*, off Corbière Point, Jersey, Channel Islands, June 2000 (Mike Rothorn).

