

Er waren meer interessante ringmeldingen. Folkert vond ook een juveniele kokmeeuw met groene vleugelmerken met een witte inscriptie ZG. Volgens de coördinator van het ringprogramma van de RUG, Corine Eising, was deze vogel vermoedelijk dezelfde zomer op Griend geringd. De ringers hadden echter nog geen tijd gehad hun veldwerkgegevens te verwerken. In de 'ouwe knarrencompetitie' deed Leendert Ferwerda goed mee door een scholekster te vinden langs de Waddenkust bij Zwarte Haan, die 29 jaar eerder, in 1972, geringd was als volgroeide vogel (minimaal 3e kj) bij Dodemansbol op Vlieland. Daar bleef het niet bij, want op dezelfde plaats lag zilvermeeuw 5020154, geringd als pul in een nest met twee jongen op de Vliehors op 16 juli 1966 35 jaar geleden.

Het jaarverslag 2000/2001 is nog steeds verkrijgbaar voor belangstellenden; gratis voor medewerkers aan het onderzoek. Schroom niet, tel door, binnenkort is het weer winter en gaan we op pad voor het 25e seizoen (1977-2002)!

Kees Camphuysen, NZG/NSO Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel, kees.camphuysen@wxs.nl
Tel./fax 0222 318744; Web page (met alle recente telgegevens actueel on-line):
<http://home.planet.nl/~camphuys/NZGNSO.html>

Noot: Van het Vogeltrekstation kregen we nog twee eerder gevonden 'oudjes' door: Eidereend Arnhem 7071712: geringd als kuiken (man) op 25-6-79 op het wad bij Terschelling, vers dood gevonden op 22-03-00; Eidereend Arnhem 7030282: geringd als vrouw >2 kj op 15-05-74 op het Posthuiswad bij Vlieland, dood (niet vers) gevonden bij Bierum, Groningen, op 29-0599.

MEDEDELINGEN

Verzoek om medewerking aan kleurmerkonderzoek bij steenlopers

In 2000 is aan de Hondsbossche Zeewering gestart met het ringen van steenlopers, wat tot resultaat had dat tot op heden maar liefst 220 steenlopers zijn geringd, waarvan de meesten in de maanden augustus en september.

Het is bekend dat steenlopers in deze periode sterk doortrekken. Niet bekend is hoe lang deze steenlopers op één locatie, zoals de Hondsbossche Zeewering, verblijven en waar ze daarna heengaan. Ook is niet bekend of er in de loop van de herfst verschil is in verblijfstijd. Blijven de eerst aangekomen steenlopers bijvoorbeeld langer dan de latere doortrekkers en welke steenlopers blijven er 's winters?

Zodra de steenlopers vanuit de broedgebieden naar de Hondsbossche Zeewering terugkeren willen we hen voorzien van een kleurmerk. Dit is geen kleurring maar tape dat om de normale Vogeltrekstationring zit. Dit heeft als voordeel dat de vogels slechts één ring dragen. Na verloop van tijd verweert de tape en blijft de ring over. Omdat we om de paar dagen een andere kleur tape gebruiken, kunnen we de doortrek meten. We zullen hierbij zo helder mogelijke kleuren gebruiken, zoals geel, rood, wit en blauw en de combinatie geel/groen.

We zullen zelf de kleurmerken langs de Hondsbossche Zeewering aflezen. Hierbij doen we een oproep voor waarnemingen (vooral in augustus en september) van gekleurmerkte steenlopers elders langs de kust. De volgende gegevens zijn daarbij van belang: datum waarneming, locatie, aantal gekleurmerkte steenlopers en kleur van de tape. Gegevens over het totaal aantal aanwezige steenlopers zijn natuurlijk ook erg belangrijk. De waarnemers zullen worden vermeld in eventuele publicaties of zullen door middel van een rapportage aan het eind van de onderzoeksperiode worden geïnformeerd.

Gegevens zijn welkom bij **Hans Roersma** en **Nelly van Brederode**, Leiweg 2A, 1755 KM Petten, telefoon: 0226-383608, e-mail: vanbrederode@ggd.ior.nl.

Seabird Picture of the Month

Wat hebben, behalve een niet aflatende passie voor zeevogels, Ann Harding, Tim Birkhead, Rob Barrett, Ian Jones, Andy Wood, Gus van Vliet, John Chardine, John Croxall, Bill Sydeman, Christine Abraham, Nicolai Konyukhov, Mark Rauzon, Koji Ono, Max Kaufman, Tom van Pelt and April Nielsen met elkaar gemeen?? Zij hebben allemaal bijgedragen aan "Seabird Picture of the Month"

Zie: <http://www.absc.usgs.gov/research/seabird&foragefish/index.html>

Als jij een *cool* plaatje van een zeevogel hebt, of een *cool* plaatje van zeevogelonderzoekers in actie, schroom niet en e-mail een digitale versie met een korte begeleidende tekst en informatie over de fotograaf naar het onderstaande adres en verwerf een plaatsje in deze fotogalerij. Het is bedoeld ter lering en vermaak; inmiddels hebben al meer dan 10.000 website-bezoekers plaatjes bekeken. We zijn ook geïnteresseerd in *links* naar andere sites met interessant materiaal over zeevogels.

John Piatt; Alaska Biological Science Center, USGS 1011 East Tudor Rd, Anchorage AK 99503
E-mail: john_piatt@usgs.gov of Fratercula@yahoo.com

RECENTE PUBLICATIES

Rasmussen L.M., Dijkse L., Hälterlein B., Koks B., Potel P. & Südbeck P., 2001. The breeding bird season in the Wadden Sea in 2000. Wadden Sea Newsletter 2001-2: 7-9. Opmerkelijk broedvogelnieuws uit de Duitse Waddenzee: De grote mantelmeeuw heeft zich nu definitief als broedvogel gevestigd, onder andere op de Boschplaat op Terschelling. Op het Deense Langli heeft een sierlijke stern *Sterna elegans* een broedpoging gedaan in een kolonie grote sterns. Het geval werd stilgehouden tot de vogels was gevlogen Een dergelijk geval speelde ook in Niedersachsen, waar een dougalls stern neerstreek in de lokale visdiefkolonie. In de Elbe-monding gaat het weer beter met de lachstern: in 2000 broedden daar 49 paren, tegen 20 in 1999. De vogels zitten verspreid over een kwelder. Elders in de Waddenzee is alleen één (mislukt) broedgeval bekend uit het Deense deel.

MFL

CONGRESSEN

De NOU en de NZG organiseren een themadag op 20 oktober 2001 met als lokatie het NIOZ op Texel. We willen de dag combineren met een 'zeetrekweekend' voor de leden en andere belangstellenden. Slaapplaatsen kunnen geregeld worden in 'De Potvis'. Ook zullen er een of meer *workshops* gehouden worden, waarin uiteen zal worden gezet hoe een ieder met de zeetrek- en andere NZG-gegevensbestanden kan leren omgaan. Het weekend zal duren van 19-21 oktober, met opties om gezamenlijk zeetrek te tellen op 20 en 21 oktober in de ochtend (en desnoods later op de dag). Alles wat je ooit wilde weten over je eigen zeetrek en stookpietengetallen ligt dan voor het oprapen! Er zijn excursiemogelijkheden olv Arend Wassink naar de Texelse zeldzaamheden van het moment. **Zie apart convocaat!**

Kees Camphuysen

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN: GERINGDE ZEEVOGELS

De volgende ringterugmeldingen van zeevogels ontvingen we van Gerrit Speek (Vogeltrekstation te Heteren), waarvoor onze hartelijke dank.

Noordse Stormvogel: Reykjavik 328621. Geringd als >2 kj op 24 april 1996 op het eiland Haimaey, IJsland, vers dood gevonden op de Afsluitdijk op 28 februari 1999.

Kokmeeuw: Arnhem 3129942. Geringd als >2 kj op 11 mei 1972 op Vlieland, gevangen en los op Griend op 28 april 2000.

Kokmeeuw: Madrid-Icona 4066301. Geringd als 2 kj op 9 februari 1997 in de buurt van Madrid, Spanje, met telescoop afgelezen bij de sluizen van IJmuiden op 21 augustus 1999. Afgelegde afstand 1485km.

Stormmeeuw: Arnhem 3411615. Geringd als 2 kj op 11 januari 1986 in Surhuisterveen, dood gevonden in Galkino, Kaluga, Russische Federatie, op 12 juni 2000. Afgelegde afstand 1950km.

Geelpootmeeuw: Bologna C0064815. Geringd als pul op 25 mei 1995 in Valle Cavanata, Italië, kleurringen afgelezen op de Punt van Reide, Groningen op 12 juli 1997.

Geelpootmeeuw: Bologna C82614. Geringd als pul op 21 mei 1997 op Sardinië, dood gevonden bij Terneuzen op 5 september 1999. Afgelegde afstand 1203 km.

Grote Stern: London XX85518. Geringd als pul op 18 juni 1970 op het eiland Coquet, vlak boven Newcastle upon Tyne, aan de kust van de Noordzee, afgelezen op Griend op 29 mei 2000.

Noordse Stern: Arnhem K387200. Geringd als pul op 25 juni 1970 op Griend, met telescoop afgelezen op 17 juli 2000, ook op Griend.

Alk: London M24632. Geringd als pul op 4 juli 1977 op Canna, de binnenste Hebriden, Schotland, vers dood gevonden op het strand bij Bergen aan Zee op 2 februari 2000.