

### **Oudste Kokmeeuw van Nederland**

Op 5 mei 2002 las Bob Loos in het centrum van Den Helder een kokmeeuw met kleurring af (links wit-LCA; rechts een metalen ring). Deze vogel bleek voor zover bekend de oudste nog levende kokmeeuw van Nederland te zijn. Hij is in ieder geval al 30 jaar geringd en minimaal 32 jaar oud want hij (zij) werd in 1972 als broedvogel op het nest geringd op Vlieland. Later heeft de meeuw Vlieland voor Griend verruild, waar hij op 28 april 2000 werd teruggevangen op het nest. De vogel werd herringd en de kleurring werd toegevoegd. Ook in 2001 was deze vogel als broedvogel op Griend aanwezig. De kokmeeuw is zowel in 2000 als in 2001 meermalen door de bewakers René Oosterhuis en Klaas van Dijk op Griend afgelezen. De vogel is in 2002 niet gezien op Griend, maar kan natuurlijk makkelijk gemist zijn, temidden van de 25.000 paar kokmeeuwen die daar broedden. We hopen dus op zijn terugkeer in 2003!

**Frank Majoor, Poststraat 18, 6828 EK Arnhem (e-mail: majoor@bos.nl)**

Naschrift: Tijdens de opmaak van deze Nieuwsbrief meldt Anne Rutten de vondst van een bijna 31 jaar oud geworden kokmeeuw (Arnhem 3148964). Geringd op 26 juni 1971 te Oude Bildtpollen (Frl), niet vers dood gevonden op 10 juni 2002 in de Mokbaai op Texel. In al die tijd was deze vogel nooit afgelezen! Voorlopig heeft deze vogel het record-ringdragen, totdat de op Griend afgelezen vogel nogmaals wordt gezien.

### **Drieteenmeeuwen doen het steeds slechter op Shetland**

Op Shetland telt Martin Heubeck jaarlijks de vele broedende zeevogels, met behulp van een rubberboot die hij onder alle klifkusten doorstuurt. Hij doet dit al vele jaren jaar en luidde onlangs de alarmbel over de dramatische achteruitgang van de drieteenmeeuw: een 70% afname over de laatste 20 jaar. Op Fair Isle, dat ook wordt meegeteld, begon de achteruitgang later, maar sinds ongeveer 1990 lopen de aantallen ook daar sterk terug: van 19.340 paar in 1988 naar 8204 in 2001. De reden: voedselgebrek. Drieteenmeeuwen leven vooral van zandspiering. Ze eten meest volwassen zandspiering maar schakelen op een zeker moment in de broedtijd over op vissen die in datzelfde jaar zijn geboren. Helaas voor de vogels lijken deze visjes tegenwoordig een ander gedrag te vertonen: ze zitten meer in het zand of dicht bij de bodem dan aan het oppervlak dan vroeger, waardoor ze voor de meeuwen niet meer te vangen zijn. Ook andere "oppervlaktefoerageerders" hebben daar last van, waaronder de grote jagers. De jagers kunnen steeds minder goed leven van zelfgevangen of van andere vogels afgepakte zandspiering en zijn noodgedwongen overgeschakeld op het eten van vogels. De drieteenmeeuwen zijn de klos: broedende vogels en hun nestjongen worden tegenwoordig veelvuldig door de jagers van de kliffen geplukt.

**Bron: British Birds 95: 118-123**

### **Zeetrektingen maart t/m juli 2002**

Gegevens voor dit overzicht zijn afkomstig van de regelmatig bezette posten Scheveningen (Schev), Camperduin (Hbz) en Huisduinen (Huis), en van de minder regelmatig bezette posten Langevelderslag (LVS) en Bloemendaal (Bloem).

Afgelopen voorjaar werd weer eens leuk eendentrek vastgesteld. Zo werden 20 t/m 22 maart te Huis 7719 smienten en ca 2500 wintertalingen geteld. Beste dag was 22 april: 4271 smient en 1552 wintertaling. Elders waren de aantallen smienten lager: Bloem (22 april 99 Z, 1352 N) en Hbz (20 april 1283 N). Op de laatste post passeerden 17 april 543 middelste zaagbekken, te Huis 209. Voor de kust van Hbz bleef de groep eiders (23 maart 35.000 tp) tot half april hangen. De vogels zaten veelal ver op zee, maar op 7 april werden 46.980 noordwaarts vliegende vogels gezien.

Rotganzen kwamen door in twee perioden, waarbij de trek beperkt was tot de Noord-Hollandse kust: begin maart (max Hbz 10 maart 3823 N) en eind mei (max Huis 20 mei 596 N). Op 28 mei passeerde ook een witbuikrotgans (Hbz). In april werd weer regelmatig trek van brandganzen vastgesteld. Beste dag was de 17 april met te Schev 1507 N, te Hbz 2418 N en te Huis 725 N. Een nieuw fenomeen zijn de verplaatsingen van grote canadese ganzen in juni. Deze beperkten zich vrijwel tot Zuid-Holland. Beste dag was 2 juni: LVS 76 N.

Grottere aantallen roodhalsfuten en kuifduikers werden uitsluitend te Hbz gezien, met name tussen 15 en 18 april. Beste dagen waren respectievelijk 15 april 19 N en 1 tp, en 17 april 29 N. Hbz was ook weer de enige