

Wanneer je een aantal jaren in je tuin of op je vaste route naar vlinders gekeken hebt, blijkt bij diverse vlinderfamilies: smaken verschillen. Nectarplanten, die de meeste bezoekers links laten liggen, staan bij een bepaalde vlinder op het menu. Neem nou bijvoorbeeld dat eigzinnige Boomblauwtje...

koel en wordt het blad, mits de grond humeus genoeg is, niet geel. De *Skimmia* laat zich in de schaduw gemakkelijk stekken. Naast de blauwtjes en de overwinterende Gehakkelde aurelia's reken ik mijzelf, in de ban van de lieflijke Lelietjes van dalengeur, tot de vaste bezoekers.

Boomblauwtjes aan de borrel



Het Boomblauwtje verdwijnt helemaal tussen de bloemen van de Blauwe regen. Drinkt de vlinder nectar of worden er misschien eitjes op de bloemknoppen gelegd?

FOTO: LIESBETH TEN HALLERS

Boomblauwtjes kunnen we in twee, soms drie periodes tussen half mei en begin oktober regelmatig in onze tuin aantreffen. Ongedurig en klein als ze zijn, vind ik ze niet gemakkelijk te observeren. Maar juist daarom verveelt dat nooit. (Ik moet u bekennen dat ik midden in de zomer niet meer achter elk witje aandraaf). In de Atlas van de Nederlandse dagvlinders vindt u bij het Boomblauwtjesportret een breed scala aan waard- en nectarplanten. Hierbij wat typische tuinplanten ter aanvulling.

Skimmia

Als in het begin van de lente de zon onze lunchpauze verlicht, worden de vlinders actief, maar ze beperken zich tot de warme plekken. Daar kan bijvoorbeeld de wintergroene *Skimmia foremanii* 'Rubella' geplant worden, maar wel zodanig, dat de heester 's zomers wat schaduw krijgt van een plant, die weinig hout en veel blad maakt, bijvoorbeeld de in de zomer bloeiende Vlinderstruik (*Buddleja davidii*) of de Lijsterbesspirea (*Sorbaria aitchisonii*). Zo blijft de bodem rond de voet van de *Skimmia*

Blauwe regen

Blauwe regen (*Wisteria floribunda*) 'Issai' bloeit al op jonge leeftijd voor de bladontwikkeling. Deze klimheester plant je liefst op de westkant om de ontluikende bloemtrossen voor de ijsheiligen te behoeden. De tweede generatie Boomblauwtjes profiteert van de nabloei in augustus. Mocht de eerste bloei kapotgevroren zijn, dan is de nabloei uitbundiger en de geur dankzij de inmiddels hogere temperatuur des te zwoeler! De landing van een Boomblauwtje op Blauwe regen lijkt waarachtig op een verdwyntruc, door de overeenkomst in kleur. Na bekendmaking in dit tijdschrift van de Honingboom (*Sophora japonica*) - een familielid - als waardplant, ben ik, en hoopelijk ook u voortaan, extra attent op het Boomblauwtjesgedrag rond de Blauwe regen. Andere dagvlinders zijn niet in deze plant geïnteresseerd, wat ook geldt voor de twee volgende soorten.

Spirea

Op mijn geurige *Spiraea* 'Anthony Waterer' komen ook Boomblauwtjes af. Het is een 80 cm hoge, oersterke heester, die geschikt is voor bakbeplanting. Elk voorjaar flink insnoeien houdt de plant compact. De donkerroze bloei op het jonge hout valt in juni-augustus. Er treedt enige nabloei op.

Rudbeckia

Tenslotte de *Rudbeckia nitida* 'Herbstsonne', een 2 meter hoge vaste plant, die in de nazomer bloeit met sprekende, gele lintbloemen rond een puntig groen hart, die uitgebloeid ook nog aardig in boeketten te verwerken is. Voor 21 juni knip ik de helft van deze plant terug en verleng zo de bloeitijd, wat de Boomblauwtjes weer in de kaart speelt. Verwent u ze eens!

tekst:

Liesbeth ten Hallers