

't Is weer voorbij...

De zomer is weer voorbij. Het schrijven van de rubriek Opmerkelijk is dan altijd erg leuk, omdat in de zomer de meeste waarnemingen binnenkomen. Dat het een opmerkelijk goed jaar was voor de dagvlinders kunt u elders lezen in dit nummer van *Vlinders*, waarin de meest opvallende dagvlinders worden besproken.

Tekst: Soms kan het gebeuren dat de ontwikkeling van een vlinder niet helemaal goed verloopt. Zo meldde Ronald Barto via onze De Vlinderstichtinghyves een dagpauwoog die niet helemaal goed is ontwikkeld. Je kunt op de foto nog delen van de rups herkennen. Dit soort 'mislukte' vlinders wordt maar weinig waargenomen. Meestal zijn de vleugels niet goed ontwikkeld bij het uitkomen van de pop.

Albert Vliegenhart
De Vlinderstichting

Ook zijn er verschillende meldingen binnengekomen van kleurafwijkingen. Doorgaans kan de invloed van overmatige vochtigheid en temperatuur op de ontwikkeling van de pop leiden tot dit soort kleurafwijkingen. Soms is dan lastig te zien om welke soort het gaat. Ben van As meldde dit bruin zandoogje in Vlaardingen.


Libellen

Voor de libellen was het een vrij normaal jaar. Er zijn helaas geen extreme zeldzaamheden gemeld. Wel ook hier wat afwijkende waarnemingen. Zo melde Marcel Groenedaal een extreem donker lantaarntje. Verwarring met een donkere waterjuffer ligt voor de hand. Deze waarneming werd echter in juli gedaan.

Nachtvlinders

Naast de duizenden migrerende oranje luzernevlinders deed ook de kolibrievlinder het goed. Hij werd zelfs gesignaleerd bij een flat op de tiende etage in Wageningen. Ook zuidelijke soorten als de grote worteluil (*Agrotis ipsilon*) en de zeldzame witte-l-uil (*Mythimna l-album*) worden steeds meer gemeld. De vijfde Nationale Nachtvlindernacht van 28 augustus j.l. was een succes, zoals u elders in dit tijdschrift kunt lezen. Tijdens deze avond werden ook enkele bijzondere en aansprekende soorten gevonden, zoals het karmozijnrood weeskind (*Catocala sponsa*) en het zwart weeskind (*Mormo maura*). Dit jaar werden van deze laatste soort zelfs meerdere waarnemingen gedaan, onder andere in Twente en in Zuid-Limburg.

In Limburg werd de zeldzame esdoorndwergspanner (*Eupithecia inturbata*) gevonden op drie verschillende locaties. Deze nieuwe soort voor Limburg was alleen nog bekend uit de duinstreek, waar hij ook zeer zeldzaam is. Dezelfde Limburgse nachtvlinderaars vonden ook nog de drievlekdwergspanner (*Eupithecia trisignaria*) en de eikenorvlinder (*Cymatophorina diluta*).



Bij deze dagpauwoog zijn nog delen van de rups te zien.



(Niet zo heel) bruin zandoogje.



Een extreem donker lantaarntje.



Tijdens de nachtvlindernacht werd het zwart weeskind gezien.