

KLIMAAT VAN DE KRIM.

De wedergesteldheid in de *Krim* is zeer afwisselend. Langdurige droogte en hitte des zomers, wordt des winters menigmaal door koude vervangen. De invloed daarvan op het plantenrijk is opmerkelijk. Eene menigte struiken en boomen, die zelfs in Engeland in de opene lucht groeijen, komen aan de zuidkust der *Krim* niet, of niet dan zeer armoedig voort.

Vreemde tegenstrijdigheden hebben daarbij somwijlen plaats. Terwijl de *oranjeboomen*, zelfs wél bedekt, gewoonlijk bevrozen, en de *Mirt* in de opene lucht slecht wast, heeft hier, volgens K. KOCH, (*die Krim und Odessa* Leipzig 1854, 186—187), een *dadelpalm* (*Phoenix dactylifera*) zeven jaren lang, hoewel 's winters gedekt, het in de opene lucht uitgehouden. Omgekeerd kunnen *Azalea's* en *Rhododendrons*, die bij ons zoo gemakkelijk en zonder beschutting in de opene lucht geteeld worden, het aan de zuidkust van de *Krim* niet wel uithouden. Het zonderlingst is, dat onze gewone Jeneverboom (*Juniperus communis* L.), volgens KOCH, t. a. pl., zoo wel van stek als van zaad gekweekt, aan de zuidkust na 3 of 4 jaren omkomt, en dan steeds na eenen winter.

Wegens de geweldige kracht der stormen, hebben alle boomen aldaar een heesterachtig aanzien. Boomen of heesters, met altoos groene bladen, wassen gewoonlijk slechts van September tot nieuwjaar, en staan gedurende de zomermaanden volkomen stil in hunnen groei. — Moesgewassen gelukken hier veel minder goed dan zelfs in Noordelijk Deutschland.