

Reactie op: 'Over de angeldragers van Meijendel

in Bzzz 10 (nov. 1999)

H. Nieuwenhuijsen

Beste Frank,

Ik heb met erg veel plezier je heldere stuk over 'Meyendel' gelezen. Aangezien ik al jaren inventariseer in de Schoorlse duinen heb ik wat gegevens van 'jouw' 2000 ha grote, kalkrijke terrein gelegd naast die van 'mijn' 1750 ha grote, kalkarme gebied. Jij telt de laatste jaren ongeveer 50 soorten bijen, ik kom op hetzelfde aantal soorten. We moeten in de toekomst maar eens om de tafel, met nog een aantal mensen, dat in de duinen inventariseert om een overzicht te produceren van de aculeatenfauna van deze fysisch-geografische regio. We kunnen dan meteen eens kijken welke soorten zich tot één van beide districten (duin- en renodunaal) beperken.



De spinnendoder *Anoplius viaticus* wordt niet (meer) gevangen in Meyendel. De soort is in Schoorl algemeen. Ik tref hem aan in de zeereep, midden- en binnenduinen. Op de zandpaden door de hei is zij talrijk. Ik heb de indruk dat de soort een voorkeur heeft voor droog grasland, afgewisseld met open zand. *Anoplius infuscatus* ken ik alleen uit de binnenduinen.

Zou verandering van biotoop (vergrassing en toename van struiken) in de kalkrijke duinen oorzaak zijn van het verdwijnen daar van *A. viaticus*?

De beide *Priocnemis*-soorten die je noemt, *P. perturbator* en *P. minuta*, ken ik niet uit Schoorl. Soorten van dit spinnendodergeslacht hebben meestal een voorkeur voor grazige biotopen. En die zijn er in Schoorl nauwelijks. *P. perturbator* ken ik wel van de Westfriese dijk in de polder achter de duinen. *P. minuta* is bekend uit Bergen (N.H.).

Van de genoemde *Arachnospila*-soorten ken ik de zeldzame *A. consobrina* niet uit Schoorl. Frank, je vroeg ook nog biotoopgegevens over een paar soorten. De zeer zeldzame *Arachnospila alvarabnormis* is een soort van zandige steppen. In ons land komt ze voor in de kalkrijke duinen en rivierduinen. Dus op naar de zandige plekken in Meijendel. Dat is ook het biotoop van *Pterocheilus phaleratus*. In Schoorl tref ik deze soort in de middenduinen aan in droog grasland afgewisseld met open plekken.

Liefst nog kaler is het terrein waarin je *Tachysphex fulvitarsis* kunt aantreffen. Ik vond deze soort in Schoorl in het noordelijk deel op de grens van duin en polder in het kale duin twee mannetjes.

Tot slot ga ik voor het stuk chocolade met hazelnoten. In Schoorl vang je *Mellinus arvensis* achter de zeereep, in de met hei begroeide duinvalleien met hier en daar een den. Ze vliegen rond de dennen. Hetzelfde beeld vind je in de middenduinen. Tussen de tegels van mijn school in Schagen nestelen zij en op de zandige stukjes volkstuin bij het Schager station ving ik ze ook. Houden deze beestjes misschien niet van de Haagse Kouwe Kak?