

Oproep: sprekers gezocht

Herhaalde oproep! We raken zo zoetjes aan door onze sprekers heen! Het kost het bestuur moeite om ook de komende workshops van sprekers te voorzien. Vandaar deze oproep. Of het nu gaat om een boeiend verspreidingsonderzoek, een serieuze ecologische studie, dat zelfontwikkelde verzamelgerei of je nieuwste keverdia's: de leden van de sektie willen het graag horen. **Iedereen** die iets te vertellen heeft wordt dan ook aangespoord om dit op een van de komende workshops te doen. Wel van tevoren even aanmelden bij een van de bestuursleden.

De secretaris

Gegevens Lauwersmeer

Het ligt in de bedoeling de gegevens van de weekendexcursie van de Sektie in september 1997 naar het Lauwersmeer-gebied op te nemen in het verslag van de zomerbijeenkomst van de NEV naar Pieterburen (en Lauwersmeer), juni 1998. Graag zo spoedig mogelijk gegevens inzenden naar de secretaris. Aanleveren als computerbestand, liefst in de vorm van Orde export-file of anders als dBase- of txt-file.

De secretaris

Excursieverslag Plasmolen

Oscar Vorst, Jan Cuppen, Barend van Maanen,
Frank van Nunen & Albert Lutjeboer

Op 10 mei 1997 werd door een aantal leden van de sektie de omgeving van de Plasmolen aangedaan. Vergunning was verkregen voor de Sint-Jansberg, De Geuldert (pl) en Rivierduintjes langs de Maas (ri). De Sint-Jansberg en met name De Geuldert, een aan de voet van de heuvel gelegen bronbos, zijn bedekt met afwisselende loofbossen. Door de beheerder, Natuurmonumenten, worden veel dode bomen in het bos gelaten, hierdoor is veel dood hout in allerlei stadia van ontbinding aanwezig. Een groot aantal van de meer bijzondere soorten uit onderstaande lijst zijn dan ook gebonden aan dood (loof)hout en houtbewonende schimmels en paddenstoelen. Zo werden er vier histeriden aangetroffen in een enorme holle beuk: *Plegaderus dissectus*, *Abraeus granulum*, *Gnathoncus nannetensis* en *Paromals flavicornis*. Andere soorten uit de zelfde boomholte: *Quedius brevicornis*, *Atheta pallidicornis* & *Mycetophagus quadriguttatus*.

Zeer bijzonder was ook de keverfauna van een liggende eikenstam te noemen, met maar liefst zes soorten Scydmaenidae, waaronder de zeldzame *Stenichnus godarti*, *S. bicolor* en *Scydmorephes sparshalli*. Van deze laatste soort betreft het de eerste en enige Nederlandse vindplaats. Alle eerdere meldingen van deze soort bleken terug te voeren tot de verwante *S. helvolus* (zie Ent. Ber. 57: 185-196). Daarnaast herbergde de