

Kevers uit mollennesten

Marc Lodewijckx

In de winterperiode levert het bekijken van mollennesten soms mooie kevers op. Tijdens een zonnige februaridag heb ik een nest bovengespit. Het was een nest van gras die ik dan uitgezeefd heb. In het zeefsel zaten veel vlooien, teken en twee kortschildkevers. Het nest zat naast een weipaal, de schrikdraad spande een ondergelopen wei af, waarin 's zomers paarden lopen. De wei lag lager dan de rand met palen. Ze ligt naast een manege in Woensdrecht (Noord-Brabant). De waarneming gebeurde op 14 februari 2001 en de coördinaten zijn UTM 31 U ES94214/98871.

De eerste Staphylinidae die ik zag was een *Achenium humile* (Nicol.). De soort heb ik vroeger nog eens gevangen. Twee exemplaren zijn toen gezeefd uit een mollennest (Lodewijckx & Keukelaar). De waarneming gebeurde nabij het plaatsje Wilhelminadorp in de buurt van Goes (Zeeland) op 22 december 1988. De andere was een *Oxypoda longipes* Muls. & Rey. Het exemplaar is een mannetje, een dissectie van de aedeagus was noodzakelijk voor de determinatie.

Mijn erkenning gaat uit naar Mr. H. Bruge die zorgde voor de determinatie van de twee eerste exemplaren van *A. humile*, zodat ik de exemplaren uit Woensdrecht vergelijkend kon determineren.



Mai

Wir bringen großen Hunger mit!
Wir haben alle Appetit
auf Blätterrippen mit Salat.
Dafür sind wir bekannt.
Und wer die meisten Rippen frißt
und bald der Allerdickste ist,
bekommt den Maienkäferstern
am roten Ordensband!