

## Contributie 2003

De contributie voor het jaar 2003 kun je nu reeds ongestraft overmaken op giro 4058536 van de Sektie Everts te Den Haag. Evenals afgelopen jaar bedraagt de contributie slechts €5.

## Kevercatalogus

Afgelopen winter werd door de bewerkers van de nieuwe Nederlandse kevercatalogus een voorlopige versie bij elkaar gebracht van een deel van de bewerkte families (ruim 2200 soorten). De komende winter ligt het in de bedoeling de resterende delen van deze families in een eerste versie te voltooien. Tezamen met aanvullingen op de eerste versie betreft het dan 3586 soorten. Voor het zo ver is moet er nog veel werk verzet worden! De komende bijeenkomst in Tilburg is natuurlijk bij uitstek een geschikte mogelijkheid om materiaal uit te wisselen.

## Excursieverslag Weurt – 12 mei 2001

Oscar Vorst, Jan Cuppen, Theodoor Heijerman, Frank van Nunen,  
Jan Muilwijk & Hans Huijbregts

Door de mond- en klauwzeercrisis waren we gedwongen van ons geplande excursiedoel, de Plaat van Ewijk, af te zien, aangezien dit terrein begraasd wordt door runderen. Het onderzoeksterrein werd daarom verlegd naar de Waal-uiteerwaarden tussen Beuningen en Weurt (**We**). Hier werd onder andere intensief verzameld op de zandstrandjes langs de Waal, welke een zeer rijke *Bembidion*-fauna bleken te huisvesten, waaronder zeldzame oeverbewoners als *Bembidion striatum* (F.), *B. atrocaeruleum* (Stph.) en *B. fasciolatum* (Duft.). De aanwezige graslanden waren grotendeels pas drooggevallen na recente hoge rivierwaterstanden, hetgeen het verzamelen er niet makkelijker op bleek te maken. Klaarblijkelijk vraagt het meer tijd voordat een dergelijk terrein weer een behoorlijke keverbevolking herbergt. Het spoelen van een kleiige oever van een grote plas in de uiterwaarden leverde nog wel een trits soorten.

Een heel ander terreintype bood het binnendijs gelegen landgoed Doddendaal (**Do**) met omgeving. Hier worden graslanden afgewisseld met gedeeltelijk (zeer) natte loofbossen en waterpartijen. Een zeer rijk biotoop bleek ook het gistende boomsap op een afgezaagde boomstronk, vermoedelijk van een esdoorn. Hier werden 35 soorten kevers verzameld, voornamelijk kortschildkevers en ptiliiden, maar ook de nitidulide *Glischrochilus quadrisignatus* (Say), een recente immigrant.