

<i>Sitona lineatus</i> (L.)	Do	TH			
<i>Sitona suturalis</i> Steph.	Do We	JC TH		<i>Pelenomus comari</i> (Hbst.)	We TH OV
<i>Sitona ononidis</i> Shp.	Do	TH		<i>Pelenomus velaris</i> (Gyll.)	We TH
<i>Sitona lepidus</i> Gyll.	Do	TH		<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Rch)	Do We TH
<i>Sitona hispidulus</i> (F.)	Do	TH		<i>Rhinoncus inconspicuous</i> (Hbst.)	We div
<i>Sitona humeralis</i> Steph.	Do	TH		<i>Rhinoncus pericarpus</i> (L.)	Do We TH
<i>Tanymecus palliatus</i> (F.)	We	TH		<i>Poophagus sisymbrii</i> (F.)	Do TH
<i>Larinus planus</i> (F.)	Do We	TH		<i>Ceutorhynchus constrictus</i> (Msh.)	Do TH
<i>Cossonus linearis</i> (F.)	Do We	TH OV		<i>Ceutorhynchus napi</i> Gyll.	We JC
<i>Bagous collignensis</i> (Hbst.)	We	TH		<i>Ceutorhynchus floralis</i> (Payk.)	Do We div
<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Payk.)	We	JC OV		<i>Parethelcus pollinarius</i> (Forst.)	Do TH
<i>Notaris acridulus</i> (L.)	Do	TH-		<i>Datonychus melanostictus</i> (Msh.)	Do TH
<i>Tychius picirostris</i> (F.)	Do	TH		<i>Mogulones raphani</i> (F.)	Do TH
<i>Anthonomus pedicularius</i> (L.)	Do	JC TH		<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (F.)	Do We TH
<i>Curculio glandium</i> Marsh.	Do We	JC TH		<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (L.)	Do We JC TH
<i>Curculio pyrrhoceras</i> Marsh.	We	JC		<i>Mecinus pyraster</i> (Hbst.)	Do TH
<i>Hypera suspiciosa</i> (Hbst.)	Do	TH		<i>Gymnetron villosulum</i> Gyll.	Do TH
<i>Hypera postica</i> (Gyll.)	Do	TH		<i>Gymnetron veronicae</i> (Germ.)	Do TH
<i>Hypera nigrirostris</i> (F.)	Do	TH			

## Correctie keverboeken in 2000

Door een opeenstapeling van misconcepties verkeerde de recensent van de rubriek 'keverboeken in ....' in de vorige aflevering van de Sektie Everts Info in de onterechte veronderstelling dat *Pseudolucanus barbarossa* een synoniem is van *Lucanus cervus*. Dit is onjuist, hetgeen onverlet laat dat de plaatsing van deze soort in een separaat genus overbodig lijkt.

## Korte mededeling

Net zoals twee jaar geleden (zie Info 47) was ik, in dezelfde periode van het jaar, in Scharendijke. Het was zonnig weer, met een frisse zeebries. Ik heb geen kevers gevangen op het strand, zoals bij mijn eerste bezoek, maar aan een oever van een plas. Deze plas ligt tussen twee evenwijdige duinrichels. Het is een grote, ondiepe plas met oplopende, begroeide oevers. Door het spoelen met water en door treden zijn er enkele kevers verstoord in hun schuilplaats. Zo kon ik ze gemakkelijk vangen. Nu volgen de resultaten van mijn kort bezoek aan dit biotoopje: Coleoptera gevangen op 22.ix.2001, UTM ET56903265, *Notiophilus substriatus* Wtrh. 1 ex, *Bembidion properans* Steph. 1 ex, *Acupalpus dubius* Schilsky 2 exx, *A. flavicollis* Sturm 3 exx, *Bledius dissimilis* Er. 1 ex & *Sitona humeralis* Steph. 1ex.

Marc Lodewyckx, Grote Molenweg 25, B-2940 Stabroek, België