

Vooraankondiging extra excursie Bergerheide zaterdag 23 juni 2007

De extra excursie heeft dit jaar als bestemming de Bergerheide in Noord-Limburg en mogelijk enkele naburige terreinen. Het betreft een gevarieerd gebied met bossen en natte en droge heide, vennen, veentjes en stuifduinen.

Meld je alvast aan bij Jan Cuppen. De deelnemers ontvangen tegen die tijd een convocatie! De convocatie zal ook op onze website www.nev.nl/everts worden geplaatst.

Jan Cuppen, 0318-652039, jan.cuppen@wur.nl

Aanmelden weekendexcursie Serooskerke, Walcheren! 31 augustus tot 2 september 2007

Meld je alvast aan voor de weekendexcursie op Walcheren! Er zal voor een scala aan excursiegebieden vergunning worden aangevraagd, waaronder duinen, schorren, etc. We hoeven ons zeker niet te vervelen. De volledige convocatie zal verschijnen in de Everts Info van augustus (nr. 76) en op de website.

Aanmelding kan vanaf nú door € 45,- over te maken naar de penningmeester, gironummer 4058536 t.n.v. Sektie Everts te Smilde (of Utrecht), onder vermelding van “weekendexcursie 2007” (IBAN: NL47PSTB0004058536, BIC: PSTBNL21).

Verslag extra excursie Castenrayse Vennen (Limburg), 25 juni 2005

Bas Drost, Oscar Vorst, Jan Cuppen, Frank van Nunen

Op 25 juni 2005 werd de extra excursie georganiseerd naar de Castenrayse Vennen. Het is een laaggelegen gebied in het dal van de Lollebeek. Door stagnatie van het regenwater heeft hier eeuwenlang veenvorming plaatsgevonden. In het begin van de vorige eeuw is een groot deel ervan afgegraven, waardoor zeer natte laagten ontstonden. Het natuurgebied bestaat uit twee delen: het Castenrayse Broek, een langgerekt gebied langs de bovenloop van de Lollebeek en De Castenrayse Vennen, een komvormige verbreding van de beek met Elzenbroekbos, zandduintjes en grasland. Tijdens de excursie werden alleen de Castenrayse Vennen bemonsterd. Zoals gebruikelijk sommen we hier een aantal karakteristieke of opmerkelijke soorten op.

Het broekbos, waar overigens na de regenval van de afgelopen weken erg veel muggen actief waren, is door de meesten onderzocht. Op een boomstam, die over een natte greppel lag, groeide zwavelzwammen, die naast veel *Gyrophana*-soorten *Scaphisoma*