

## *Chrysomela saliceti*, een plaagoptreden in Flevoland

Gert van Ee

Op 26 juli 2012 bracht ik een bezoek aan de woonwijk Golfresidentie in het zuidelijke gedeelte van de gemeente Dronten in de provincie Flevoland. Aanleiding was een bericht van een goede kennis die hier woont en mij enkele foto's stuurde van massale vraat aan struiken door een kever. De woonwijk is eind twintigste eeuw aangelegd en verweven met een golfterrein. Op het golfterrein is beplanting aangebracht, waaronder een cultivar van bittere wilg, *Salix purpurea*. Juist deze wilg werd massaal aangetast en in korte tijd over grote lengtes helemaal kaalgevreten (zie foto). Zelfs op deze kale struiken waren op 26 juli nog steeds honderden kevers aanwezig. Determinatie leerde op dat het hier ging om de soort *Chrysomela saliceti* Suffrian.

Overal in deze woonwijk waren vraatsporen te vinden op dit type wilgenstruiken, die soms gedeeltelijk waren aangetast, soms helemaal waren kaal gevreten. Andere wilgen werden (nog) niet aangevreten, hoewel bij een tweede bezoek op 28 juli ook enkele kevers op andere wilgen werden gevonden. Kloppen met een net leverde naast *C. saliceti* nog een ander wilgen bladhaantje op, namelijk het bronzen wilgenhaantje *Phratora vitellinae* (Linnaeus). Verder zoeken op aangeven van Ron Beenen naar *Phratora tibialis* (Suffrian) leverde niet deze soort op, maar alleen meer exemplaren van het bronzen wilgenhaantje.



Kale wilgenstruiken als gevolg van massaal optreden van *Chrysomela saliceti* in Dronten.



*Chrysomela saliceti* in Dronten.

### ***Chrysomela saliceti***

Goede afbeeldingen van *C. saliceti* staan in de recente publicatie over de Franse Chrysomelinae van Winkelman & Debreuil (2008). *Chrysomela saliceti* is de wetenschappelijke naam voor het wilgenhaantje (*Salix* is de Latijnse naam van de wilg). Deze bladkever komt voor van zuidelijk Noord-Europa tot in Zuid-Europa, bijna alleen op wilgen. Hij is voornamelijk te vinden tussen april en oktober. Meestal is de kleur van de dekschilden lichtbruin-oranje, maar soms komen geheel zwarte exemplaren voor. Soorten die lijken op het wilgenhaantje zijn het groot populierenhaantje *Chrysomela populi* Linnaeus en het klein populierenhaantje *Chrysomela tremula* Fabricius.

In ons land is *Chrysomela saliceti* een tamelijk zeldzame soort, die slechts sporadisch wordt verzameld of gemeld. In de afgelopen tien jaar zijn er bij waarneming.nl, de website waar veel waarnemingen van soorten planten en dieren worden genoteerd, maar vijf waarnemingen gedaan, waarvan vier op de Waddeneilanden Ameland en Griend en één op het vaste land van Friesland. In Europa is *C. saliceti* in veel landen aangetroffen. In België is de soort volgens de Palaearctische catalogus (Kippenberg 2010) nog niet aangetroffen.

### **Literatuur**

- WINKELMAN, J. & DEBREUIL, M., 2008. Les Chrysomelinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Rutilans, Supplément 2008: 1-188.
- KIPPENBERG, H., 2010. Chrysomelinae: 390-443. In: Löbl, I. & A. Smetana (eds), Catalogue of the Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup.