

**Nieuwsbrief** is het mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.

ISSN: 1387 - 4470

Verschijnt vier maal per jaar.

Oplage 350 exemplaren

### Kopijsluitingsdatum

NVL-nieuwsbrief 4: 1 december 1998.

### Redactie:

Victor Mensing & KD Dijkstra

### Redactie-adres

K.D. Dijkstra

Oude Rijnsburgerweg 38

2342 BC Oegstgeest

071 - 5170678

e-mail: odonata@stad.dsl.nl

### Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL)

Voorzitter: Vincent Kalkman

Secretaris: Gerard Abbingh

Penningmeester:

Willem-Jan Hoefnagel

Redactievertegenwoordiger:

Klaas-Douwe Dijkstra

Activiteiten-coördinatoren: Kees

Goudsmits & Robert Ketelaar

Bestands-coördinator:

Michiel van der Weide

### Postadres NVL

Gerard Abbingh

Muddegoorn 78

9403 NK Assen

0592 - 347108

### Lidmaatschap NVL


Leden en bibliotheken f25,-

Jongeren (t/m 25 jaar) f15,-

Buiten Nederland f30,-

Genoemde bedragen graag overmaken op giro 76.15.700 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie te Hilversum. (Jongeren)-leden ontvangen

*Brachytron* en *nieuws*



## De Rivierrombout (*Gomphus flavipes*) terug in Nederland

Naar aanleiding van een vondst van een larve aan de Waal (HABRAKEN & CROMBAGHS, 1997) en drie waarnemingen langs de Duitse Rijn (DIJKSTRA & KALKMAN, 1998) ontstond het idee dat zich wellicht een populatie van de Rivierrombout bevond in ons land. Daarom togen KD Dijkstra, Vincent Kalkman, Menno Reemer, Anke Wouters en ondergetekende op 19 juni 1998 naar de Waal bij Nijmegen. De verwachtingen lagen hoog omdat enkele dagen eerder bij Weurt al een mislukt uitgeslopen imago bij zijn huidje was aangetroffen door Roy Kleukers. Op het eerste de beste strandje ten oosten van Nijmegen werd echter, totaal onverwacht, een larvehuidje van de Beekrombout (*Gomphus vulgatissimus*) gevonden. Toen we even later ook een huidje van een Rivierrombout vonden, kon onze dag niet meer stuk. We zochten verder en vonden zo in vier van de vijf onderzochte uurhokken larvehuidjes van beide soorten, in totaal negen van de Rivier- en tien van de Beekrombout. Opvallend was dat alle huidjes tussen het aanspoelsel midden op de onbegroeide strandjes lagen. Verder viel op dat de huidjes van de Rivierrombout een nogal gewelfd achterlijf hadden met een bijna ruitvormige doorsnede, zodat het bij het huidje nog spits en smaller uitziet dan bij de larve (SUHLING & MÜLLER, 1996).

Welnu, de mooiste waarneming is natuurlijk als je doormiddel van een larvehuidje de voortplanting van een libel kunt aantonen, maar voor de deelnemers van deze excursie was het hoogtepunt toch wel het zien van in totaal zes verse imago's in een ruige zoom vlak achter de waterkant, ten oosten van Millingen aan de Rijn. Menigeen werd lyrisch bij het aanschouwen van een libel die na bijna honderd jaar weer terug in Nederland is. Ook werd duidelijk waarom hij zijn naam *flavipes* (= geelpoot) heeft gekregen. Metname de dijen zijn van de meeste kanten gezien geheel geel. Er kwamen ook veel vragen bij ons op. Waar ligt het aan dat de Rivierrombout weer terug is? Is hij verder stroomafwaarts en wellicht in de Nederrijn, Lek en IJssel te vinden? Wat vast staat is dat we weer een reuze interessante libel erbij hebben in Nederland.

Kees Goudsmits

### Laatste nieuws

Na ons zijn door verschillende waarnemers in de omgeving van Nijmegen nog meer exemplaren gezien. Het ging hier echter steeds om enkele individuen. Ook in Duitsland is de Rivierrombout dit jaar op nieuwe plekken gevonden. Dit zijn de Rijn bij Keulen, twee plaatsen aan de Rijn bij Koblenz en aan de zijrivier de Main (schrift. meded. FRANK SUHLING).

### Literatuur

DIJKSTRA, K.D., & V. KALKMAN, 1998. Kleine kansen op grootse daden. N.V.L.-nieuwsbrief 2(2):5

HABRAKEN, J.M.P.M., & B.H.J.M. CROMBAGHS, 1997. Een vondst van de Rivierrombout (*Gomphus flavipes* (Charpentier)) langs de Waal. *Brachytron* 1(1):3-5.

SUHLING, F., & O. MÜLLER, 1996. Die Flussjungfern Europas (Gomphidae). Die Neue Brehm-Bücherei 628:169.