

# LEES-IDEË

John Jagt

In de rubriek 'Van de redactie' van het vorige nummer van Afzettingen werd vermeld dat de in de 'leeslijst' opgenomen titels te vinden waren in de WTKG bibliotheek in Maastricht. Dat is echter niet helemaal juist: opgenomen zijn ook titels van interessante artikelen die aangevraagd (uitleen of als fotokopie) kunnen worden bij de bibliotheek van het Geologisch Buro Heerlen, Postbus 126, 6400 AC Heerlen, tel. 045-763763.

In de toekomst zullen dié artikelen die in onze eigen bibliotheek in Maastricht te vinden zijn, van een \* voorzien worden.

Ray, C.E. (Ed.) - Geology and paleontology of the Lee Creek Mine, North Carolina, II. - Smithson.Contrib.Paleobiol., 61, Washington DC

Hierin zijn de volgende artikelen opgenomen:

- Furnish, W.M. & Glenister, B.F. - Miocene Cephalopods from North Carolina, pp.9-11, 1 fig.
- Wilson, D. - A New Pycnodont Oyster from the Pungo River Formation, and an Annotated List of the Cenozoic Pycnodonts of the Atlantic and Gulf Coastal Plains, pp.13-20, 5 figs.
- Wilson, D. - Species of Ecphora, Including the Subgenus Stenomphalus, in the Pungo River Formation, pp.21-27, 1 fig., 2 pls.
- Gibson, T.G. - Miocene and Pliocene Pectinidae (Bivalvia) from the Lee Creek Mine and Adjacent Areas, pp.31-112, 19 tabs, 25 figs, 31 pls.
- Ward, L.W. & Blackwelder, B.W. - Late Pliocene and Early Pleistocene Mollusca from the James City and Chowan River Formations at the Lee Creek Mine, pp.113-283, 2 tabs, 13 figs, 47 pls.

In Zeitschrift für geologische Wissenschaften (Berlin, DDR), jaargang 15, nummer 3 (1987) zijn oa. de volgende artikelen opgenomen:

- Wiegank, F. - Untersuchungen zur Chronostratigraphie des Mittel- und Jungquartärs der DDR, pp.263-279.
- Erd, K., Palme, H. & Präger, F. - Holsteininterglaziale Ablagerungen von Rossendorf bei Dresden, pp.281-295.
- Erd, K. - Die Uecker-Warmzeit von Röpersdorf bei Prenzlau als neuer Interglazialtyp im Saale-Komplex der DDR, pp.297-313.
- Pietrzeniuk, E. - Süßwasser-Ostrakoden aus pleistozänen Ablagerungen von Röpersdorf bei Prenzlau, pp.315-325, 2 tabs, 1 pl.
- Striegler, R. & Striegler, U. - Schichtenfolge, Fossilführung und Lagerungsverhältnisse im Eem-Profil von Schönfeld, Kreis Calau, (Vorläufige Mitteilung), pp.327-336, 4 figs.
- Weisse, R. - Die glazialgenetischen Einheiten westlich von Potsdam, pp.337-353, 11 figs.

-Heinrich, W.-D. - Neue Ergebnisse zur Evolution und Biostratigraphie von Arvicola (Rodentia, Mammalia) im Quartär Europas, pp.389-406, 9 figs.

-Kahlke, R.-D. - On the occurrence of Hippopotamus (Mammalia, Artiodactyla) in the Pleistocene of Achalkalaki (Gruzniian SSR, Soviet Union) and on the Distribution of the Genus in South-East Europe, pp.407-414, 3 figs, 3 tabs.

- 
- Ludwig, K., 1987 - Mikropaläontologische Hinweise für die autochthone Entstehung der miozänen Braunkohle im Becken von Ternuel-Ademuz (NE-Spanien) - Paläont. Z., 61 (1-2), 17-27, 4 figs. Stuttgart
- Popov, S.V., 1986 - Composite prismatic structure in bivalve shell - Acta palaeont. pol., 31 (1-2), 3-26, 14 pls. Warszawa
- Świdnicki, J., 1986 - Oligocene Zeiformes (Teleostei) from the Polish Carpathians - ibidem, 31 (1-2), 111-135, pls.47-50, 11 figs, 2 tabs.
- Siesser, W.G., Ward, D.J. & Lord, A.R., 1987 - Calcareous nannoplankton biozonation of the Thanetian Stage (Palaeocene) in the type area - Journal of Micropalaeontology, 6 (1), 85-102, 3 pls, 2 tabs, 6 figs. London
- Hopson, P.M. & McC. Bridge, D., 1987 - Middle Pleistocene stratigraphy in the lower Waveney Valley, East Anglia - Proc.Geol.A ss., 98 (2), 171-185, 3 tabs, 8 figs. London
- Yoshida, T., 1987 - A palaeoecological study of molluscan fossil communities of the Takanabe Member, Miyazaki Group, southern Japan - with special reference to community structure - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 60 (3-4), 231-247, 10 figs, 5 tabs. A'dam
- Bonnefille, R., Vincens, A. & Buchet, G., 1987 - Palynology, stratigraphy and palaeoenvironment of a Pliocene hominid site (2.9-3.3 M.Y.) at Hadar, Ethiopia - ibidem, 60 (3-4), 249-281, 15 figs, 3 tabs.
- Groner, U., 1986 - Zur Problematik von umgelagerten Palynomorphen in Glazial- und Spätglazialsedimenten des Schweizer Mittellandes - Ecologiae geol. Helv. 79 (3), 617-639, 3 figs, 1 tab, 5 pls. Basel
- Perch-Nielsen, K., 1986 - New Mesozoic and Paleogene calcareous nannofossils. - ibidem, 79 (3), 835-847, 3 pls.
- Berger, J.-P., 1986 - Biozonation préliminaire des charophytes oligocènes de Suisse occidentale - ibid., 79 (3), 897-912, 3 figs, 1 tab.
- Majima, R., 1987 - Life positions of fossil naticid opercula (Mollusca: Gastropoda) - J.Paleont., 61 (1), 62-65, 4 figs. Tulsa
- Majima, R., 1984 - Observations on occurrences of Japanese Neogene naticids (Gastropoda) bearing calcareous opercula - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, n.s., 134, 361-373, 2 figs, 1 tab, pls.68-70. Tokyo
- Majima, R., 1985 - Intraspecific variation in three species of Glossaulax (Gastropoda: Naticidae) from the late Cenozoic strata in central and south-west Japan - ibidem, 138, 111-137, 10 figs, 2 tabs, pls.17-19

- Miller, K.G. & Katz, M.E., 1987 - Oligocene to Miocene benthic foraminiferal and abyssal circulation changes in the North Atlantic - Micropaleontology, 33 (2), 97-149, 24 figs, 13 pls. New York
- Kaminski, M.A. & Geroch, S., 1987 - Two new species of Phenacophragma from the Paleogene of Trinidad and Poland - *ibidem*, 33 (2), 185-188, 8 figs, 1 pl.
- Klostermann, J. & Dassel, W., 1987 - Quartäre Tektonik und ihre Auswirkungen auf die Erstreckung von Würgeböden und Keilstrukturen - Z.dt.geol.Ges., 138 (1), 33-44, 8 figs. Hannover
- Frydas, D., 1987 - Silicoflagellaten aus dem Messinium von Kreta, Griechenland - *ibidem*, 138 (1), 53-75, 4 figs, 2 tabs, 3 pls.
- Lienau, H.-W. & Schleich, H.H., 1986 - Schildkrötenreste aus dem obereozänen Gohlbergsschichten von Helmstedt bei Braunschweig (Niedersachsen) - Mitt. Geol.Paläont.Inst.Univ.Hamburg, 61 (Ulrich Lehmann Festband), 329-341, 2 pls., 4 figs.
- Weidner, H. & Riou, B., 1986 - Termiten (Isoptera) aus dem Obermiozän von St-Bauzile (Ardèche, Frankreich) - *ibidem*, 61, 343-365, 16 figs.
- Lootens, M., 1987 - Heavy minerals as a stratigraphical tool for the Eemian and Post-Eemian deposits in the Lower Lys valley (Belgium) - Geol. Mijnbouw, 66 (2), 139-145, 5 figs. Dordrecht
- Hottenrott, M., 1987 - Palynologie und Stratigraphie im Tertiär von Mittelhessen und Umgebung - N.Jb.Geol.Paläont., Abh. 175 (1), 65-79, 4 figs.
- Thewissen, J.G.M. & Gingerich, P.D., 1987 - Systematics and evolution of Probathyopsis (Mammalia, Dinocerata) from the Late Paleocene and Early Eocene of western North America - Contr.Mus.Paleont.. Univ. Michigan, 27 (8), 195-219, 10 figs. Ann Arbor
- Gayet, M., De Broin, F. & Rage, J.C., 1987 - Lower Vertebrates from the Early-Middle Eocene Kuldana Formation of Kuhat (Pakistan). Holostei and Teleostei, Chelonia, Squamata - *ibidem*, 27 (7), 151-193, 27 figs, 3 pls, 2 tabs.
- Whittaker, A., Holliday, D.W. & Penn, I.A., 1985 - Geophysical Logs in British Stratigraphy - Geol.Soc.London, Spec.Rep. 18, 74 pp., 44 figs.
- Tanabe, K. & Arimura, E., 1987 - Ecology of four infaunal bivalve species in the Recent intertidal zone, Shikoku, Japan - Palaeogeography, Palaeoclimat., Palaeoecol., 60 (3-4), 219-230, 10 figs. A'dam
- Verbeek, J. W., 1986 - Calcareous nannoplankton at the Cretaceous-Tertiary boundary in the region near Maastricht in the Province of Limburg (the Netherlands) - Proc.Kon.Ned.Akad.Wet., B 89 (4), 357-365, 3 figs. A'dam