

VOGELS VAN ZUIDELIJK FLEVOLAND.

De polder is drooggevallen. Leden van de commissie Zuidelijk Flevoland met vele introducties (leden van onze vogelwerkgroep) hebben het proces mogen volgen. Het is niet mogelijk nu reeds een afgerond overzicht van waarnemingen aan te bieden. Niettemin onderstaand een kort resumé van opmerkelijke feiten.

In de wintermaanden tussen november en maart werden b.v. verrassend veel ijseenden gesignaleerd. Op één dag b.v. wel dertien exemplaren. Andere opmerkelijke soorten eenden waren de grote- en zwarte zeeend en eidereend. In dezelfde periode werden enige koren roodhelsfuten en kuifduikers waargenomen. Langs de dijken fourageerden regelmatig strandleeuweriken, terwijl de sneeuwgorzen tot de zekere ontmoetingen behoorden.

Er trokken enige roofvogels langs de dijken zoals smelleken, kiekendieven, boomvalk, wespandief en visarend. Tot de waargenomen sternsoorten behoren de grote- en dwergstern. Op het slik tegenover de brug bij Muiderberg verbleven enige tijd negen dwergmeeuwen. Interessant was het vaststellen van broedgegeven van de eerste polderzengertjes: Fitis, Tuinfluiter, grasmus, rietzanger en bosrietzanger. Witte en gele kwikstaart, kneu, graspieper en tapuit kwamen tevens als broedvogels op de dijk voor.

Er trad een sterke fluctuatie op in de vogeltrek: enkele weken lang vertoefden er wel een vijftienduizend kempfanen langs de dijk en op het wad om plotseling te verdwijnen en plaats te maken voor grote aantallen tapuiten en zwarte sterns. Bontbekplevieren werden vastgesteld in een aantal van enkele honderden exemplaren. Tientallen strandplevieren vestigden zich langs de dijk -op de schelpenbankjes- en ook de kluut maakte gretig gebruik van de plotdeling geboden mogelijkheden tot familievergroting. Bij het gemaal en de eerste bebouwing vestigden zich tientallen huismussen en een koolmezenpaar.

Er werden duinpiepers gesignaleerd, een dwerggans en....door verschillende waarnemers Temminck strandlopers!!

