

INVENTARISATIE VAN EEN KLEIN SIGRAVELANDS BUITEN.

Er komt schot in het Avifauna onderzoek van het Gooi. Maar er zijn zoals de secretaris elders vermeldt, nog te weinig medewerkers. Leeft er misschien bij velen angst voor teveel werk??

Hierbij een verslag van een jong lid, dat op voortreffelijke wijze zijn gegevens tot een overzicht samenstelde. Het mag als voorbeeld dienen hoe men op betrekkelijk eenvoudige wijze, in weinig tijd(!) toch zijn medewerking kan verlenen.

De Sperwershof (door G. de Hoog)

De waarnemingen zijn verricht op 18, 24, 26 en 30 juni, 24 en 28 mei, en 4 juni, steeds ongeveer van 's morgens 5 tot 6 uur. Zij werden wat bemoeilijkt door veel regen.

Tjiftjaf, 3 paar. Op 18-4 en 4-6 worden "losse" zangers waargenomen, tamelijk dicht bijeen. Broedgeval lijkt me echter onwaarschijnlijk gezien het feit, dat de andere "tjiffen" nogal honkvast waren.

1 op 18-4, 26-4 en 30-4

2 op 26-4, 24-5, 28-5 en 4-6

3 op 18-4, 26-4 en 30-4

Fitis, 2 paar. Eén was een opvallend honkvaste, regelmatige zanger. Op 4-6 nog een fitis, die niet nader bekeken is.

1 op 24-4, 26-4, 30-4 en 24-5

2 op 28-5 en 4-6

Tuinfluitier, 3 paar. Tamelijk onregelmatige zang, vanaf nogal verspreid liggende plaatsen (groot territorium?). Zong vaak vrij laat, tot midden op de dag; daardoor misschien veel zang gemist.

1 op 24-4, 24-5

2 op 26-4, 30-4

3 op 18-4, 30-4

Zwartkop, 2 paar. Zong ook gewoonlijk zeer laat, doch 's morgens vaker en langer dan de vorige soort; daardoor toch regelmatig waargenomen. Losse waarneming op 26-4.

1 op 30-4, 24-5, 28-5


2 op 18-4, 30-4, 28-5

Spotvogel, 1 paar. Waargenomen op 24-5, 28-5 en 4-6

Gekraagde roodstaart, 1 paar.

Behalve dit paar nog waarnemingen (zingend, doch zeer verspreid) op 18-4 en 30-4.

1 op 18-4, 30-4 en 28-5



Heggenmus, 1 paar. Met zekerheid kon 1 broedpaar vastgesteld worden. Vermoedelijk waren het er meer, maar met 18 april als vroegste waarnemingsdatum was daar weinig van te zeggen. De hegemus zong bovendien kort, en onregelmatig. Er werden zeer verspreid nog exx. waargenomen op 18-4, 26-4 en 24-5.

1 op 26-4, 30-4, 28-5


Winterkoning, 7 paar. Deze soort zong regelmatig, en had een klein territorium: hij was dus honkvast. Tweede broedsels waren natuurlijk niet uitgesloten, maar konden in zo'n korte waarnemingsperiode niet vastgesteld worden.

- 1 op 18-4, 24-4, 26-4
- 2 op 26-4, 30-4, 24-5, 28-5, 4-6
- 3 op 18-4, 24-4, 26-4, 24-5
- 4 op 26-4, 24-5
- 5 op 30-4, 24-5, 28-5, 4-6
- 6 op 18-4, 24-4, 30-4, 24-5, 4-6
- 7 op 18-4, 30-4, 24-5, 28-5, 4-6

Roodborst; 3 paar. Misschien een vierde paar bij de gebouwtjes tegen Boekesteyn. Tweemaal gehoord, doch kort en nogal verspreid. Tamelijk honkvast. Hielden allen vrij vroeg op met zingen; 1 wellicht een tweede broedsel, op een iets andere plaats. Bij 3 op 26-4 dichtbij een éénmalige "indringer".

- 1 op 18-4, 24-4, 26-4, 30-4, 28-5
- 2 op 24-4, 26-4
- 3 op 24-4, 26-4

Zanglijster, 4 paar. De zanglijster blijkt een vrij groot territorium te bezitten. Dit is vrij gemakkelijk na te gaan door de verdragende zang, die vaak uitloopt op grensincidenten. Hoewel weinig ter zake doend is een schetsje van de situatie op 24-5 wel interessant:



Op 26-4 een "losse" zanger.

plaatsen waar grensincidenten ontstonden. Vergelijken met het hele territorium steeds opvallend kleine stukjes.

- 1 op 24-5, 28-5, 4-6
- 2 op 30-4, 24-5, 4-6
- 3 op 26-4, 24-5, 4-6
- 4 op 26-4, 24-5, 28-5

Merel, 1 paar. Onverwacht weinig. Misschien te wijten aan het late tijdstip van de waarnemingen: de meeste merels zingen even vóór zonsopgang. Doch bovendien werd elders geen enkele merel (niet zingend) waargenomen.

- 1 op 24-5, 4-6

Vink, 4 paar. Broedsel 1 en 2 zaten nogal dicht bij elkaar, waardoor het niet altijd duidelijk was, welke vink nu aan het zingen was. Dat het slechts één broedsel betrof, is moeilijk aan te nemen. Op 24-5 werd nog een losse vink waargenomen, en elders op 28-5.

- 1 op 18-4, 24-4, 24-5, 4-6
- 2 op 18-4, ? , 28-5
- 3 op 26-4, 24-5, 28-5, 4-6

Groenling, 4 paar. 4 zat in hoge bomen langs de weg, buiten het eigenlijke landgoed.

- 1 op 18-4, 24-5
- 2 op 24-4, 26-4
- 3 op 18-4, 24-4
- 4 op 26-4, 30-4, 24-5, 28-5

Boomkruiper; 2 paar. Beiden in zeer hoge oude beuken en eiken. Een waarneming van een "losse" zingende boomkruiper dateert van 18-4.

- 1 op 26-4, 30-4, 28-5, 4-6
- 2 op 26-4, 24-5, 28-5, 4-6

Koolmees, 3 paar (misschien). Merkwaardig genoeg werden zelden mezen gehoord, hoewel er toch voldoende broedgelegenheid was.

Wellicht heb ik de meeste zang (vroeg in het voorjaar) gemist: let op de vroege zangdata.

- 1 op 24-4, 26-4
- 2 op 24-4, 30-4
- 3 op 18-4, 24-4

Pimpelmees, 1 paar (misschien). Hiervoor geldt hetzelfde als voor de koolmees maar in nog sterkere mate. De pimpelmees werd meer dan eens waargenomen, doch zelden zingend, en op zeer verspreide plaatsen. Op 24-4 2 exx. tegelijk, ver uiteen.

- ? 1 op 26-4, 4-6

Spreeuw, 4 paar. Van 1 en 2 werd het nest gevonden. Uiteraard werden veel meer dan zingende spreeuwen waargenomen. Vermoedelijk wel een aantal broedsels gemist.

- 1 op 24-4
- 2 op 18-4, 26-4, 30-4
- 3 op 18-4, 26-4, 30-4
- 4 op 24-4, 24-5, 4-6

Houtduif, 5 paar. Er werden nog duiven waargenomen op 28-5, (3 exx.), en 4-6.

- 1 op 24-4, 26-4, 30-4, 24-5, 28-5
- 2 op 24-5, 4-6
- 3 op 18-4, 28-5, 4-6
- 4 op 18-4, 24-5, 28-5, 4-6
- 5 op 18-4, 28-5

Grote bonte specht, 1 paar. Werd alleen trommelend gehoord en gezien, steeds wisselend van plaats; was dus vermoedelijk bezig met het afbakenen van zijn territorium.

- 1 op 24-4, 26-4

Kauw, Gaai, Ekster, Volgens de eigenaar van het terrein broedden deze soorten er wel. Vooral de gaai nam ik er regelmatig waar. Ik heb geen nesten kunnen vinden. Dat de ekster er zou broeden, lijkt me onwaarschijnlijk.

Meerkoet, 1 paar. Langs de NO-hoek van het terrein in een sloot.

Overige losse waarnemingen: - Steeds betrof het zingende vogels.
 kneu op 18-4, staartmees op 18-4, wielewaal op 18-4, braamsluiper op 24-4, boomklever op 26-4, wilde eend op 4-6, turkse tortel op 4-6.

+++++