

Nestkasten in Bussums Waterleidingbos (1969)

A: Terrein:

Bussums Waterleidingbos.


Niet toegankelijk.

Ligging: Tussen Hilversum en Bussum, ten westen van spoorlijn naar A'dam.

Grootte: 8 ha, 23 are en 7/4 care.

Landschap: Hoofdbegroeiing bestaat uit dennen waartussen jong loofhout zoals de Amerikaanse vogelkers, beuk, eik. Verder enkele groepjes jonge douglass aanplant. De onderbegroeiing, indien aanwezig bestaat uit mos, gras en verschillende andere lage planten.

B: Controle:



Voor het eerst sinds enkele jaren is dit gebied weer gecontroleerd. De eerste controle was vrij laat (begin mei) waardoor het met de eerste ei data wel eens moeilijk was. Omstreeks half mei werden nog eens vier nieuwe nestkasten opgehangen. In het gebied hangen nu de volgende kasten:

- 16 mezenkasten met vliegopening van 40 tot 47 mm.
- 8 mezenkasten met vliegopening van 30 tot 32 mm.
- 4 berkenkasten.
- 3 bloempotten.
- 1 spechtenkast.
- 1 uilenkast.
- 33 kasten totaal.

Hoogte:

De kasten hangen op een hoogte van 2 tot 3 meter.

De onderlinge afstand varieert van nauwelijks 2 tot 30 meter.

De vliegopeningen hangen naar alle kanten.

Data:

Van begin mei tot half juni werd er wekelijks gecontroleerd.

Overzicht:

	Iste broed	2e broed
koolmees	4	3
ringmus	3	3
pimpelmees	2	0
gekr. roodstaart	5	
spreeuw	1	0

Aantal broedpogingen

koolmees	:	1
ringmus	.	2
gekr. roodstaart:	.	2
spreeuw	:	1

Opm. Onder een broedpoging versta ik een compleet of bijna compleet nest van een vogel waarin geen eieren gelegd zijn.

Eerste ei (alleen 1ste broedsels)

soort	vroegste datum 1ste ei	gem. datum 1ste ei
koolmees	19-4	22-4
ringmus	15-4	21-4
pimpelmees	12-4	14-4
gekr. roodstaart	1-5	25-5
spreeuw	9-4	9-4

Opm. De gekr. roodstaart vertoont een typisch broedseizoen.
De 1ste ei data van de legfels is n.l. zeer verspreid:
1-5, 28-5, 25-5, 3-6, 5-6.

Aantal eieren en jongen van het 1ste broedsel

	eieren	aantal juv.	uitgevlogen
koolmees	32	24	13
ringmus	15	13	7
pimpelmees	21	21	21
gekr. roodstaart	27	19	13
spreeuw	4	3	3

Gemiddelde legfelgrootte en aantal jongen van het 1ste broedsel

	gem. legfelgrootte	gem. aantal jongen
koolmees	8	6
ringmus	5	4,3
pimpelmees	10,5	10,5
gekr. roodstaart	5,4	3,3
spreeuw	4	3

Aantal eieren en jongen van het 2de broedsel

	gem. legfelgrootte	gem. aantal jongen
koolmees	9,3	9,3
ringmus	4,3	3

D: Bijzonderheden:

Op 29-7-'69 werd in een kast een nog levende nachtvliinder aangetroffen.

Op 29-7-'69 werden er in een kast ongeveer 50 schorskevers en ongeveer 30 oorkruipers aangetroffen.

E Conclusie:

Over een voor- of achteruitgang van de broedvogels is niet te spreken omdat ik geen oude verslagen van dit gebied bezit.

Wel is het opmerkelijk dat 7 van de 33 nestkasten bezet waren door de gekr. roodstaart. Dit komt waarschijnlijk door de gunstige biotoop, de grote gaten in de mezenkasten (uitgetikt door de grote bonte specht) en het kleine aantal spreeuwen.

Kast no:	soort:	aantal ei	aantal juv.	aantal uit.juv.	
1a	spreeuw	4	3	3	
16	broedpoging ringmus				
2a	gekr. roodstaart	6	4	4	
3a	gekr. roodstaart	3	3	3	
5a	niets				10-5'69 opgehang. bloempot
4a	niets				
14	broedpoging roodsaart				
10	niets				
10a	nestpoging roodstaart				
10b	pimpelmees	11	11	11	
8	koolmees	8	7	6	
2	gekr. roodstaart	6	1	1	
2c	ringmus	5	5	0	
12	ringmus	6	6	5	
7	niets				
7d	broedpoging ringmus				
11	niets				
11e	niets				
30	niets				
16a	ringmus	4	2	2	
16f	gekr.roodstaart	7	6	0	berkenstam
39	niets				10-5-69 opgehangen
31	niets				10-5-69 opgehangen
33	niets				bloempot
34	niets				bloempot
23	pimpelmees	10	10	10	spechtekast
32	broedpoging b. vliegevang				berkenstam
32h	gekr. roodstaart	5	5	5	10-5-69 opgehangen
4	koolmees	7	7	7	
3	broedpoging koolmees				
4	koolmees	7	0	0	
2f	koolmees	100	10	0	kast van boom gevallen.

uilenkast, niets.

.....

"2de broedsels"

a	ringmus	4	4	2	
12	ringmus	4	0	0	kast v/d boom ge-
11	koolmees	10	10	10	waaid.
30	koolmees	9	9	9	
39	ringmus	5	5	5	
31	koolmees	9	9	9	

R. Moolenbeek.