

Vogels sterven door.....

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN.

Plaats: hoogspanningsleidingen ten zuidwesten van het Naardermeer, lopend van Diemen naar s'Graveland.

Geteld is het gedeelte tussen paal no. 23 en paal no. 30.

Dat is ongeveer $2\frac{1}{2}$ km.

Methode: Dankzij medewerking van de grondeigenaren was het mogelijk per keer met + 8 mensen op één lijn het traject af te zoeken. Gevonden vogels of resten werden ter plaatse gedetermineerd en daarna of meegenomen of begraven. Dit om dubbeltellingen te voorkomen. De tellingen zijn begonnen op 1 augustus 1969 en zullen eens per 14 dagen worden voortgezet ten minste tot 1 mei 1970.

Resultaten: Voor een duidelijk overzicht van de resultaten verwijzen wij naar de tabel.

Het resultaat van twee maanden is 92 vogels, verdeeld over 15 soorten + nog enkele gevallen die niet verder determineerbaar waren.

In het gebied zijn steeds vele kraaien en meeuwen aanwezig.

Deze dieren ruimen veel doodgevlogen vogels vrij snel op. Men vindt meestal slechts wat sterk afgekloven restanten van de dieren.

Meestal borstbeen, vlerken en soms een of twee poten en wat veertjes, heel vaak nog minder.

De genoemde kraaiachtigen en meeuwen zorgen ervoor, dat er minder vogels worden gevonden dan er in werkelijkheid door de draden sneuvelen. Dat dit percentage hoog is moge blijke uit het volledig ontbreken van kleine vogels, die snel worden opgeruimd.

Hoewel de trektijd nog niet begonnen is, vonden we toch al ruim 90 vogels. Het is beslist zeer laag geschat wanneer men stelt, dat er tenminste 750 vogels per jaar op dit kleine stukje van $2\frac{1}{2}$ KM het slachtoffer worden van de hoogspanningsleidingen. Dat hierbij zeldzame soorten als Roerdomp(I), Porceleinhoen(I) sneuvelen, moet worden betreurd.

Veel erger is het, dat in een tijd dat al veel Purperreigers zijn weggetrokken toch nog 7 exemplaren van deze soort werden gevonden. Dit is beslist verontrustend. Gezien de ligging der kolonies moeten er nog twee "oversteekplaatsen" zijn waar Purperreigers tijdens hun vlucht van nest (Naardermeer) naar voedselgebied (Inkevoens en Lortenhoefts plassengebied) de hoogspanningsleiding moeten passeren.

We zullen proberen dat volgend jaar vast te leggen.

Wij schatten, dat enkele tientallen Purperreigers per jaar zo sneuvelen. Dit is op een totaal van 150 broedparen in Nederland zeer hoog!

Conclusies: Het is moeilijk om op grond van de nu verzamelde gegevens reeds duidelijke conclusies te trekken.

Wij verwachten in de echte trektijd voor weidevogels en waterwild, oktober en november, een echte stijging van het aantal slachtoffers.

Gevonden draadslechttoffers.

Soort	<u>Aantal per datum</u>					<u>Totaal</u>
	1/8	16/8	30/8	17/9	28/9	
1. Fuut	1	-	-	-	-	1
2. Purperreiger	4 ⁺	-	3	-	-	7
3. Boerdomp	-	1	-	-	-	1
4. Wilde eend	3	3	2	6	1	15
5. Knobbelzwaan	1	-	-	-	-	1
6. Porceleinhoen	-	-	1	-	-	1
7. Waterhoen	-	1	-	-	-	1
8. Meerkooit	-	-	-	1	-	1
9. Kievit	4	-	4	5	-	13
10. Watersnip	-	-	1	-	-	1
11. Grutto	3	3	1	-	-	7
12. Ropmeeuw	-	4	2	6	-	12
13. Houtduif	-	-	-	1	-	1
14. Zwarte kraai	-	1	-	3	-	4
15. Postduif	4	7	4	1	5	21
16. Eend (spec)	-	1	1	1	-	3
17. Meeuw (spec)	-	-	1	-	-	1
18. Geheel ondetermineerbare resten.	-	-	-	-	1	1
Totaal	20	21	20	24	7	<u>92</u>

⁺ Een van de Purperreigers was geringt en wel als nestjong op 9/6/1964 te Noorden (zuid-Holland)