

Invasie van zwart mezen (Parus ater)

Een zwarte meze in de wijngaard bij, in de buurt van Zuidelijk-Vlevoiland, in de provincie Noord-Holland.

De Amsterdamse Vlieders werden in september reeds zes keer. Op 25 sept. naar de oostelijke oever van de IJmeer, zonder echter de vogel te kunnen ontdekken, in een veld bij de IJ-streek.

Het was in het grote bosgebied van de IJ-streek, van de slagboom bij Naardermeer.

Met ontwaarde ik twee vliegenvangers en een Zilverkopvrouwtje.

Iets verderop bleef de IJ-streek reeds zes maanden lang geheel kwaden twee andere vliegenvangers en vliegenvangeren, vijf veer bij de takjes hangen.

een vliegende plaats voor de IJ-streek op een hooftop, 'overwegend hoogstaand, dient als bos, met bij weerskeer veel spinnen of zilver-sparren' (Vogel).

Bladerend in de boeken werd ik door de volgende passages tegen:

"De trekvlucht van alle mezen. Het is het voor de in het noorden en oosten van Europa (Rusland) populaties, die in de herfst vaak met grote zwermen als een invasie zuidwaarts binnentromen.

Bij de in midden en west-Europa breedende zwaarte mezen is deze trekvlucht niet zo opvallend, en de hier aangevoerde populaties zijn allen min of meer 'zwerfvogels'. (Niettemper en Pakitsch)

"Trekverplichtingen, bij deze soort meer een tijd andere mezen.

Invasie-achtig v.v. heeft in winter 1957" (Sluiters).

"In sommige jaren doortrekker of invasie-achtig in vrij groot aantal van begin september tot in november en van eind februari tot in april" (Avifauna van Nederland)

Ziek dus de deze herfst en winter op de zwart mezen te laten.

Ik heb reeds de volgende waarnemingen: 25-9 2 exx., 4-10 4 exx., 9-10 6, 1/2 en 2 exx., 10-10 1, 2, 4 en 10-15 exx.

Alle waarnemingen van andere mezensoorten of Goulibesentjes.

J.L. B.