


— Ruigpoten - invasie —

(buteo lagopus)

Het ziet er naar uit, dat we mogen spreken van een invasie van de ruigpootbuizerd. Het voorkomen van deze noordelijke roofvogel, krijgt volgens sommige boeken een invasiekarakter wanneer in het broedgebied het specifieke voedsel, de lemming, ontbreekt. Ook in muizenjaren ontstaat er een toevloed van deze buizerd met ruigbevederde poten! Daar er in ons land niet over een muizenjaar kan worden gesproken, moet de invasie dus verband houden met voedselschaarste in het land van de "ruigpoot".

De eerste VWG-waarneming dateert van 12 oktober, toen tijdens het weekend op Texel aan de voet van de duinen, een exemplaar van deze soort werd gesignaleerd. Vervolgens verscheen de vogel in Oostelijk-Flevoland. Op en in de omgeving van de Knardijk, is hij nu nog een gewone verschijning. Wij noteerden op 8 januari liefst elf ruigpootbuizerden in de omgeving van de Knardijk en vooral op de stoppelakkers achter de graansilo aan de weg van Lelystad naar Harderwijk. Op dezelfde akkers verbleven wel eens dertig blauwe kiekendieven! Wij hebben de ruigpootbuizerd wel eens in groepjes van drie boven de berm van de Knardijk zien zweven; een prachtig schouwspel. Waarnemingen van ruigpootbuizerden komen uit het gehele land. Zelf zag ik deze soort in Friesland, langs de Waal en diverse keren langs de Zuiddijk van Zuidelijk-Flevoland; ook in de omgeving van de brug bij Muiderberg.

De ruigpootbuizerd doet wat forser aan dan de gewone buizerd (buteo buteo.) Kenmerkend zijn naast de niet altijd te onderscheiden bevederde poten, de lichte onderzijde met de donkere polsvlekken (in de knik van de vleugels) en de vaak witte staart met donkere eindband. Voorts heeft de ruigpoot een donker borstschild en gevingerde zwarte vleugelpunten. Hij vliegt trager, meer zeilend dan de buizerd en.... hetgeen een zeer belangrijk kenmerk is.... hij staat vaak met langzame vleugelslag te bidden boven het land. Maar verwar hem niet met de licht gekleurde gewone buizerd. Niet verzuimen de waarnemingen in te zenden!



Jl.B.

(vervolg van blz. 18)

Van de heer J.G. Wurster de volgende terugmeldingen :

Koolmees	♀ 1e jaars; 6-11-64 Huizen	13-2-69 Gronau (Osnabrück)
Bosuil	nestjong; 7- 5-67 's-Graveland	22-2-69 Eempolder te Soest
Bosuil	nestjong; 19- 4-67 Huizen	9-4-69 Soesterberg

J. v.d. Geld

In één van de vorige Korhanen heeft het relaas gestaan over de keep, die de weg terug wist te vinden naar de tuin van mevrouw Holzenspies. De vogel was in de winter van 1968 door de heer K. Visser in deze tuin gevangen en geringd. Een jaar later werd hij door de heer Visser teruggevangen. Wat zal zich in dat tussenliggend jaar zoal in dat vogelleventje hebben afgespeeld ? De heer H.T. v.d. Meulen te Joure, die enige tijd geleden voor ons een avond verzorgde over het ganzen vangen en ringen, bemachtigde 7 oktober 1968 een bokje, de kleinste snippesoort. Op 7 oktober 1969 -precies een jaar later - belandde dezelfde vogel op dezelfde plaats op dezelfde tijd in hetzelfde net van de heer Van der Meulen Het bokje broedt in het noorden van de Scandinavische landen en in Rusland. J1.B.