

Waarnemingen uit

Zuidelijk Flevoland.

In onderstaand overzicht ziet u de belangrijkste en meest opvallende waarnemingen van Zuidelijk Flevoland, gedaan in de periode van 3 januari 1970 tot en met 11 april 1970. Helaas konden de tellingen van 11-1, 24-1, 31-1, 7-3 en 21-3 hier nog niet in verwerkt worden.

Zoals bekend werd er steeds geteld, vanuit de auto, op het dijkvak Muiderberg - Eemmond (Gooimeerdijk).

1. Fuut tot 22-2 wegens ijstoestand niet aanwezig, daarna telkens 10-47 ex.; op 16-3 echter 100 ex.
 2. Roodhalsfuut twee waarnemingen van 1 ex. n.l. 14-2 en 15-3
 3. Dodaars slechts één waarneming op 18-1 van 1 ex.
 4. Zomertaling op 15-3 de eerste waarneming, 4 ex. daarna altijd aanwezig tot max. 61 ex. op 28-3.
 5. Smient vierwaarnemingen, op 18-1 160 ex., 28-2 24 ex., 15-3 65 ex. en 16-3 2 ex.
 6. Krooneend drie waarnemingen, op 16-3 21 ex.!, 4-4 4 ex. en 11-4 4 ex.
 7. Kuifeend altijd aanwezig, soms in groot aantal. op 18-1 760 ex., 14-2 80 ex., 22-2 700 ex., 28-2 30.000 ex.!, 15-3 8000 ex., 28-3 10.000 ex., 4-4 ± 10.000 ex., 11-4 11.000 ex.
 8. Tafeleend idem als Kuifeend, maar in geringer aantal. op 18-1 260 ex., 8-2 1.100 ex., 14-2 80 ex., 22-2 + 1350 ex., 28-2 28.500 ex.!, 15-3 8000 ex., 28-3 2000 ex. en 11-4 20 ex.
 9. Grote Zaagbek altijd aanwezig in wisseld aantal, het aantal nam na half maart sterk af. max. 210 ex. op 18-1, op 11-4 nog 4 ex. aanwezig.
 10. Wilde Zwaan één waarneming van 2 ex. op 4-4.
 11. Kleine Zwaan op 28-3 15 ex. in de polder en 24 ex. op het Gooimeer.
 12. Bruine Kiekendief één waarneming van 2 ex. op 28-2.
 13. Blauwe Kiekendief regelmatig waargenomen in gering aantal, max. 5 ex. op 8-2.
 14. Smelleken eenmaal waargenomen n.l. op 16-3 2 ex.
 15. Torenvalk altijd aanwezig. na de voorjaarsstrek neemt het aantal af tot enkele ex. max. 11 ex. op 8-2.
- Opmerking; tot 15-3 geen steltlopers aanwezig, daarna verscheidene soorten in gering aantal.
16. Scholekster vanaf 15-3 altijd aanwezig, max. 22 ex. op 4-4.
 17. Grutto op 15-3 375 ex., 16-3 22 ex., 28-3 17 ex., 4-4 1 ex. en 11-4 46 ex.
 18. Witgatje één waarneming op 11-4 2 ex.
 19. Tureluur op 15-3 11 ex., daarna toenemend tot 26 ex. op 11-4.
 20. Zwarte Ruiter op 11-4 1 ex.
 21. Bonte Strandloper twee waarnemingen, 16-3 2 ex. en 28-3 12 ex.
 22. Kemphaan op 15-3 12 ex., daarna toenemend tot 290 ex. op 11-4.



23. Kluut vanaf 16-3 aanwezig 14 ex., daarna toenemend tot 110 ex. op 11-4.
 24. Velduil drie waarnemingen, op 3-1 2 ex., 28-2 1 ex. en 16-3 6 ex.
 25. Veldleeuwerik enkele waarnemingen, op 3-1 98 ex., 18-1 16 ex., 22-2 2 ex. en 28-3 1 ex.
 26. Oeverpieper één waarneming van 4 ex. op 18-1.
 27. Roodborst slechts éénmaal waargenomen n.l., 3-1 1 ex.
 28. Pimpelmees in wisselend aantal aanwezig, o.a. 3-1 16 ex., 8-2 2 ex., 15-3 30 ex. en 4-4 5 ex.

Opmerking; opvallend is dat er in deze periode geen andere mezen werden waargenomen.

29. Sijs één waarneming van 5 ex. op 18-1.
 30. Zwarte Kraai altijd aanwezig, echter steeds 1 of 2 ex.
 31. Bonte Kraai altijd aanwezig, tijdens voorjaarsstrek max. 49 ex. op 14-2. daarna afnemend tot 2 ex. op 4-4 en 11-4.

J. Harder

R A L R E I G E R .

Op vrijdag 8 mei 1970 om ongeveer 20.00 uur dicht bij de ZW-punt van het Kleine Wasmeer (Hilversums Wasmeer). De Ralreiger stond enkele meters achter het hek van het natuurreservaat in de (russen?-)begroeiing, maar met romp en kop duidelijk waar te nemen.

Dat gebeurde door mijn beide zoons (20 en 14) en mijzelf gelijktijdig door drie kijkers en er was voldoende tijd ter plaatse de "Peterson" te raadplegen en e.e.a. te verifiëren. Later hebben wij thuis nog Sluiter's Vogelgids vergeleken.

Onmiskenbaar waren; het lichtgele oog, de beige-gelige slordige sluier en dito rug, de groen-gelige snavel met donkere punt, het opvallende wit van de vleugels. Dit laatste zagen wij vooral duidelijk bij het opvliegen na enkele minuten, toen hij op reiger-wijze zich verhief en met een boog over het bosje aan de overzijde in richting W tot NW uit het gezicht verdween.

J.M. Reinboud

Mezeninvasie.

Bij de heer K. Visser, Naarderstraat te Huizen wordt in de tuin gedurende de winter, veel aandacht aan vogelvoeding besteed. Op de uitgehangen vetbollen komen in een winterseizoen vele mezen af. In de 3e week van maart echter verschenen er zoveel mezen (voornamelijk koolmezen) dat er wel van een invasie gesproken mocht worden.

Ik neem aan dat er van een sterke mezentrek sprake was. Op twee naast elkaar gehangen vetbollen zaten soms 8 mezen, terwijl in een struikje -waar vetbollen hingen- ook nog zo'n 3-5 mezen zaten. Dit verschijnsel kon vrijwel de gehele dag worden waargenomen.

J.v.d. Geld