

AVIFAUNA VAN NAARDEN

Vanaf 1968 werden gedurende het broedseizoen geregeld tellingen uitgevoerd, zowel 's ochtends als 's avonds. Met de aldus verkregen gegevens werd de broedvogellijst opgemaakt. Door middel van dagboekonderzoek werd van de meeste vogels tegelijkertijd het voorkomen in de andere seizoenen vastgesteld. Hierdoor is niet alleen de avifaunistische status van Naarden voor broedvogels, maar ook die voor trekvogels vastgelegd. De Avifauna moet worden gezien als een waardebeoordeling voor vogels van de gemeente Naarden.

Met een aantal van 7.146 - 7.734 broedparen, verdeeld over 68 soorten, slaat de stad, wat vogelrijkdom betreft, geen gek figuur in de rij van Gooise gemeenten. Zonder Huismus en Spreeuw blijven toch altijd nog 3.096 - 3.634 paren broedvogels over.

De dichtheid van het aantal broedparen is (uitgaande van de reeds gegeven cijfers) 6,4 - 7,5 broedparen per ha.; worden zowel de Huismus als de Spreeuw in de berekeningen ingevoerd, dan springen de cijfers omhoog naar 15,8 - 17 paar per ha. (Hilversum 1970: 23,2 paar per ha.).

Totaal werd een oppervlakte van 484 ha. onderzocht; de begrenzing werd gevormd door:

de gemeentegrens aan de zuidkant, doorlopend tot de oostkant, met een bijna recht lopende lijn naar Fort Ronduit, van waaruit weer een rechte lijn rond het industrieterrein en de bebouwing over de Rijksweg Naarden - Amsterdam naar de Meerweg liep.

Toelichting op de broedvogellijst

De kern van de vesting met zijn zeer dichte bebouwing vormt een bolwerk voor de talrijke Gierzwaluwen, die zich hier voorlopig nog wel zullen handhaven, zulks in tegenstelling tot andere gemeenten, waarvan veelal de kern gesaneerd wordt.

De wallen zijn voor vele vogels een bijzonder gewaardeerd broedterrein, waar weinig of geen verstoring plaats vindt.

Onder de bruggen van de vesting werden nogal eens nesten van Boerenzwaluwen gevonden. Rond de grachten en de sloten en slootjes broeden talrijke Meerkoeten en Waterhoentjes; de Kleine karekieten en Rietzangers zijn op die plaatsen in het riet te vinden.

Een belangrijk element vormen de kwekerijen, waar soorten als Winterkoning en Heggemus veelvuldig worden aangetroffen.

De meest voorkomende broedvogel is - eenieder kan dit op zijn vingers natellen - de Huismus; ongeveer 3.500 paar hebben hun domicilie in deze gemeente. De Spreeuw, anders toch voor geen kleintje vervaard, komt op de tweede plaats met een aantal van 550 - 600 paar. Als goede derde komt onze kultuurvolger, de Merel, met 400 - 450 paar.

Dichtheden

Voer sommige soorten kunnen de dichtheden van het aantal broedparen zeer hoog zijn; dit houdt regelrecht verband met de aantrekkelijkheid van het terrein voor de vogel. Om een voorbeeld te noemen heeft de Merel zo'n hoge dichtheid: per 100 ha. broeden hier gemiddeld 85 paren.

Tinbergen stelde in 1942 vast, dat er in een boomrijk dorp ongeveer 60 paar per 100 ha. voorkwamen.

De Koolmees, die als holenbroeder overal wel een gaatje kan vinden en in Haarden langs de openbare weg zelfs nestkasten tegenkomt, broedt hier met ongeveer 43 paar per 100 ha.